



28,531/B

# TRATTATO

DELLE PRINCIPALI  
E DELLE PIU' FREQUENTI

## MALATTIE

ESTERNE ED INTERNE

AD USO DEGL' INIZIATI IN MEDICINA, DEI CHIRURGO-  
MEDICI E DEI PRATICANTI CHE SUPPLISCONO  
IN MANCANZA DEI MEDICI GRADUATI;  
SICCOME ANCORA PER LE PERSONE ILLUMINATE,  
LE QUALI PER MOTIVI DI BONTA' ESERCITANO  
LA MEDICINA NELLE CAMPAGNE; O CHE POCO A PORTATA  
DI AVERE I SOCCORSI DELL'ARTE, SONO OBBLIGATI  
DI ESSERE I MEDICI DI SE MEDESIMI  
E DI MEDICARE I LORO VICINI

DI GIANFEDRICO  
DE HERRENSCHWAND

SOCIO DI VAR E ACCADEMIE.

GIA' PRIMO MEDICO DEL RE DI POLONIA

ED INTIMO CONSIGLIERE DI S. M.

E DELLA SERENISSIMA CORTE DI SAXEGOTA;

MEDICO CONSULTANTE DELLA CITTA' DI BERNA *ec.*

*Opera tradotta dal francese*

con Note ed aggiunta di nuovi Articoli.

---

*Ex votis cordati esto medici ab incunabulis civibus ac gentibus,  
tandemque posteris pro viribus prodesse.*

---

TOMO PRIMO.



IN MILANO. MDCCLXXXIX.

---

Appresso GIUSEPPE GALEAZZI Regio Stampatore.

CON APPROVAZIONE.

*Di Giuseppe Galeazzi*

WELLS, CLAUDE

127 14 17 1/2

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000





AL . GRANDE . MEDICO .  
GIANPIETRO . FRANK .  
QUESTA . TRADUZIONE .  
COMMENTATA .  
CONSACRA . DONA .  
MICHELE . GHERARDINI .



Digitized by the Internet Archive  
in 2016 with funding from  
Wellcome Library

[https://archive.org/details/b28772106\\_0002](https://archive.org/details/b28772106_0002)

# PREFAZIONE

## DEL TRADUTTORE.

*L*a medicina è sempre mai stata fino dai suoi primi tempi consecrata dagli omaggi dell' universo: onora il medico, dice l' Ecclesiastico, perchè ne hai bisogno, e creollo IDDIO autore d' ogni guarigione. In Egitto i medici, al dire di DIODORO di Sicilia, componevano un ordine augusto dello Stato. I Magi presso i Persiani, e presso i Celti, e i Druidi erano a un tempo decorati del sacerdozio, della giustizia, e dell' esercizio della medicina, e comunemente trattati con una grande stima e colla più alta venerazione (a). E che provano  
Tom. I. \*

---

(a) *Dignior est cunctis medicus mortalibus unus: HOMERUS.* Vedi GALENUS ad Thrac. cap. 3. Henr. LAMPE, *dissert. historico-juridica de honore, privilegiis. Et juribus singularibus medicorum;* e sopra tutto il discorso accademico dell' inarrivabile Gianpietro FRANK, *de civis medici in Republica conditione, arque officiis ex lege præcipue erutis: in Delectus opusculor medicor.* vol. II. Anche i principi si riputavano a somma gloria di esercitare la medicina, persuasi, che chi s'ottenta al maneggio dei popoli, debba aver cura tanto della politica, quanto della corporale salute; e l' ebbe molto a cuore DIONIGI Siciliano, il quale fatto medico molto sperimentato, non istimò vile impiego l' esercitarsi nelle chirurgiche operazioni: *Dionysius sculus medicinae opera navabat, Et ipse curationes, frictions, unctiones, Et reliqua faciebat.* AELIAN: *de var. histor.* lib. II: Io non rammento i TRIMEGISTI, i GIGI, gli ADRIANI, i COSTANTINI, che furono medici di Itima non volgare; solo fra tanti ricordo il famoso re di Ponto, e dell' Armenia, MITRIDATE, il quale si distinse con certa medica composizione, che tuttora tiene il nome di questo re filosofo e medico; la regina ARTEMISIA moglie di MAUSOLO re di Caria, quel raro esempio di fedeltà conjugale, che dopo la morte del marito, tanto svisceratamente amava, come le vivo ancora, che fece beveraggio col vino delle ceneri dell' abbruciato cadavere, e sì le tranquillò, ed eresse sorprendente sepolcro, onde il nome di *mausoleo* a tutti i magnifici edifizj;

questi onori e questo pubblico culto? Se non solamente la brama ed il bisogno d'incoraggiare un' arte, che esige, e suppone un raro complesso di cognizioni (b); quindi è che non si può ricusare un tributo di rispetto e di stima a persone coraggiose, le cui fatiche ci die-

---

CICERO 3. *Tuscul.*; CLEOPATRA, famosa regina dell' Egitto, la quale sapeva molto bene la medicina, ne scrisse molti libri, e fece varie prove sulla più pronta ed efficace azione dei veleni; ELENA tanto celebrata nelle storie, la quale compose il meraviglioso nepente mentovato da OMERO *odissea* 4. ec. ec. Prescindo di parlare degli onori grandi anticamente accordati ai medici dai re ed imperatori, e batti per ogn' altro esempio la lettera di ARTASERSE scritta ad ISCANO suo prefetto in Elefponto, perchè gli mandasse Ippocrate: IL GRANDE ARTASERSE RE DE' REGI AD ISCANO SALUTE. E' ARRIVATA ALL' ORECCHIE NOSTRE LA FAMA D'IPPOCRATE MEDICO. FIGLIO D'ESCULAPIO; OPERA TU, CHE ARRICCHITO D'ORO A SUA VOGLIA A NOI SEN VEN- GHI. SARA' RIPUTATO FRA LI PRIMI DELLA PERSIA; E SE IN EUROPA SARAVVI ALCUN ALTRO ILLUSTRE PER SI' FATTA PROFESSIONE. RENDILO NOSTRO AMOREVOLE, SENZA RISPARMIO DI DANARO ALCUNO. *Suida.*

(b) Fu addomandato, perchè sono rari in medicina i talenti che possano paragonarsi ai BOERHAAVI, agli HALLERI, ec. Io credo non vi sia più acconcia risposta, che quella data da un poeta, a cui fu chiesto, perchè non vi erano più VIRGILJ; questi rispose, perchè non vi sono più MECENATI: *Sunt Mecenates, non deerunt, Flave, Marones.* Quando vi sia chi i letterati protegga, non che le città più colte, e più signorili, ma le ville medesime più neglette germoglieranno i VIRGILJ: *Virgiliumque tibi vel tua rura dabunt.* Sperimentano in se la languidezza del produrre anche gli uomini disingenerati e virtuosi, a' quali, tutto che applauditi mancan le forze per distinguersi cogli studj, quando mancano gli estrinseci impulsi alla virtù. Un medico non assicurato di generose ricompense, è giuoco forza, che tutto abbracci per ispiluccare di che onoratamente sostenerli; ed innocentemente meritarsi di essere compreso da WAN-SWIETEN fra 'l numero di quelli, *qui tota die curitando plurimos vident agros, morbos vero paucos intelligunt;* e ricordarsi giornalmente di ciò che disse OVIDIO (*Trist.* IV. el. 10. v. 21.)

*Sæpe pater dixit: Studium quid inutile tentas?*

*Hippocrates nullas ipse reliquit opes.*

La virtù sola non basta; vi vuole la fortuna, che l'accompagni, cioè almeno persona di alta sfera, e di sublime intendimento, la quale, invece di lasciar assorbire le proprie sostanze dal lusso e dalla dissolutezza, conosca e sollevi l'uomo virtuoso, il quale altrimenti deve giacere occulto e sforzato ad accontentarsi di se medesimo, e coll'ali per così dire tarpate sul secco e sterile suolo miseramente languire.

dero dei lumi nel sublime studio della medicina, pel cui possedimento hanno dovuto scorrere i diversi rami della fisica generale, della storia naturale, della botanica, della chimica, della farmacia, dell'anatomia, ec. Tutti gli oggetti divisati hanno dovuto passare tratto tratto sotto gli occhi dell'amico dell'umanità, che s'impegna di guarire i suoi mali, od almeno ad alleviare i suoi dolori.

La salute dell'uomo non è sempre costante; la struttura del corpo umano, le alterazioni dell'aria egualmente necessaria che inevitabile; le azioni della vita, la natura dei fluidi e dei solidi deggiono produrre le malattie: gli elementi stessi che compongono il corpo, sono altrettanti specchi per rappresentare il decadimento di nostra esistenza: lo stesso soffio che serve a prolungare la vita, contribuisce egualmente ad accorciarla, perchè ad ogni volta, che noi respiriamo, è una diminuzione della nostra sostanza; e l'arte di vivere perpetuamente e di ringiovanire, ideata da' poeti e dagli alchimisti, è una pura chimera (c). Gl'impulsi del

\* \*

(c) L'arte di ringiovanire è celebre appo i poeti, e sorprendente è il ringiovanimento di ESONE operato da MEDEA, come ne riferisce OVIDIO nel lib. VII. delle sue metamorfosi:

..... Æson miratur & olim

Ante quaterdenos hunc se reminiscitur annos.

Diffinilemque animum subiit ætate relicta.

Il vero specifico poi degli alchimisti per operare questo maraviglioso cangiamento è la pietra filosofica, colla quale si sono creduti gli arbitri della vita, e della morte; padroni di ridonare l'esercizio intero di tutte le funzioni dello spirito, del corpo, e nel medesimo tempo la forza, il vigore, la salute.

La transfusione ( la quale consiste nel far passare il sangue dei vasi di un animale immediatamente in quello di un altro, di cui tanto si parlò verso la metà del secolo passato circa il 1664.; e che promosse acerba e clamorosa quistione tra MARTINIERE, e DENIS ) è riputata non solo un rimedio certo contro tutta specie di mali, ma capace ancora di riaccendere le languide fiamme vicine ad estinguerfi nella decrepita vecchiaja.

Pietro CHIESA riferisce nella sua storia del Perù, essere in America una fontana, le cui acque fanno ringiovanire i vecchi: La



*tempo sono inesorabili, e questi ci spingono, nostro malgrado, con sempre nuovo urto alla tomba: testimonj dolenti dell' inevitabile distruzione vediamo rapidamente languire i fiori della gioventù, maturare i frutti della virilità, e quindi cadere, lasciando le reliquie della vita come un tronco secco senza foglie e senza*

---

tintura d' oro ridotta in sale si pretese, che formasse una colla, con cui l' anima veniva talmente collegata ed amalgamata col corpo, che non solo faceva vivere tutto il tempo determinato senza infermità, ma che riparasse ancora alle forze venute meno dalle veglie, dai piaceri, dalle fatiche, e da ogni qualunque siasi eccesso. Tutti gl' Indiani delle Antille, ci dice l' abate RAYNAL, credevano sulla fede di un' antica tradizione, che la natura nascondesse nel continente una fontana, le cui acque avessero la virtù di far ringiovanire tutt' i vecchi. La chimera dell' immortalità fu sempre la passione degli uomini, e la consolazione dell' ultima età. Questa idea incantò l' immaginazione romanzesca degli Spagnuoli. La perdita di molti di essi rimasti vittime della loro credulità non iscoraggiò punto la fiducia degli altri. Invece di sospettare che i primi fossero periti in un viaggio, in cui non si poteva ottenere con sicurezza se non la morte, fu creduto che i medesimi non si lasciassero più vedere, perchè avevano già trovato ed il segreto d' una gioventù perpetua, e quel soggiorno di delizie, che più non volevano abbandonare. Ma queste ed altrettali baje atte sono solamente a sollazzare i gusi e i barbagianni; imperocchè segreti per allontanare le malattie, per vivere lungamente, e per ringiovanire, non ve ne sono: *l' uomo nec revirescere, nec repubescere potest*. Si può dire con COLUMELLA; nè merita riflessione, dice il COCCHI, quanto asserì BOERHAAVE di ASCLEPIADE, male intendendo un passo di quell' antico scrittore, mentre sperando egli di poter conservare la sua sanità per la continenza, e per la perizia dell' arte ch' ei possedeva, può essere, ch' ei qualche volta scherzando, non già da davvero dicesse o scrivesse quel che riporta PLINIO, ch' ei scommetteva colla fortuna tutta la sua fama, se mai in qualunque modo si ammalasse.

Esclusa però dai rimproveri, e dalle ridicolezze è la gerocomia, ossia l' arte di ridonare le forze ai vecchi. Il più antico esempio che noi abbiamo di questa cura, è quello degli Ebrei nel re DAVIDE, allorchè per manimarli gli fu data per compagna una giovane Sunamite; e fu questo infatti l' unico spediente che potesse alcun poco sostenere il languore del vecchio profeta; pratica che rattenuta nei limiti della decenza, e della virtù è giustificata da GALENO, da Paolo EGINETA, da VERULAMIO, da OMERO, poi da BOERHAAVE, da KEILL, ec., ed il precitato Paolo EGINETA disse, essere difficilissimo il ristabilire un uomo, allorchè freddo e secco tutto in un colpo diventa; ma in tal caso uno dei migliori rimedj si è di far riposare sullo stomaco dell' infermo un fanciullo sano, ed alquanto grasso, Vedi MAKENZIE, *Histor. de la Santé*, es.

frutti ricoperto di neve: Ammalato l'uomo, l'istinto medesimo lo sforza macchinalmente a cercare un rimedio: tale è la legge di natura, da cui dependono tutte le principali cagioni: il pensiero di liberarsi dai mali, di sollevarsi dai dolori, di rimettersi nella primiera salute, ha sempre in ogni tempo determinato a cercare i rimedj (d). Conservare la sanità col prevenire o col togliere le malattie, egli è questo il dovere del medico. Ora il mortale capace di rendere nobilmente questo servizio a coloro, che lo implorano, onora lo Stato, e merita giustamente di

Seder tra filosofica famiglia.

---

(d) Avvi taluno, che per ignominare la nobile professione medica, quest' arte sublime di guarire, dice, che Roma scacciò dalla città i medici per vivere più sicura dalle malattie; ma chi così ragiona, ignora la storia de' Romani. Non è la sola medicina, che fu bandita e proscritta, ma le virtù tutte ancora. Sotto il regno di DOMIZIANO, dice TACITO, le virtù erano motivi di morte. Appò i Romani avviliti, la debolezza era un eroismo: si vide sotto quel regno, punire in SENEZIONE, e RUSTICO i panegiristi delle virtù di TRASEA, e di ELVIDIO; trattati questi oratori come rei di delitto di Stato, e le di loro opere abbruciate per pubblica autorità: Si videro celebri scrittori, tali come PLINIO, ridotti a comporre opere gramaticali, perchè ogni genere di lavoro più elevato soggiaceva alla tirannia; ed era sospetto per il suo autore. I saggi chiamati a Roma da AUGUSTO, da VESPASIANO, da ANTONINO e da TRAJANO, sono itati banditi da NERONE, da CALIGOLA, da DOMIZIANO e da CARACALLA: si bandivano i filosofi, si proscrivevano le scienze: questi tiranni volevano annichilare, come dice TACITO, tutto ciò che aveva apparenza di spirito o di virtù: HELVETIUS de l'esprit; anzi è tanto lungi dal vero che i Romani poi spregiassero la medicina, e non si curassero de' medici, che gli accolsero con dimostrazioni di singolare affetto, e di onorevolissima stima; onde nell'anno 525. dalla fondazione di Roma, essendo Consoli L. EMILIO, e M. LIVIO, accettarono un certo ARCHAGATO medico, richiamato dalla Morea confinante colla Grecia, a cui diedero il jus de' Quiriti; e C. GIULIO CESARE fece citra l'ini molti medici (onore grandissimo presso i popoli di quei tempi). acciò di buona voglia dimorassero in Roma. PLINIUS, SVETONIUS, ec., e finalmente per tutta risposta dirò con MOULTRIE (*de febri maligna biliosa*, ec. Edimburgi 1749.): *abque divina hujus scientie medicinae auxilio, vita nostra vel intra limites admodum angustos conservaretur, vel sanitate destituta, morbisque perpetuis implicata, nobis & patriæ prorsus inutilis evaderet; nam ut alimenta sumis corporibus agricultura, sic sanitatem aegris medicina promittit.*

*In questo sublime seggio è degno di essere collocato HERRENSCHWAND, la cui opera a giusto diritto merita la preferenza su tutte le altre dello stesso genere fino ad ora conosciute. E' dessa il frutto de' travagli e di una lunga sperienza di più di 50. anni, esposta in modo di poter essere estremamente utile non solo ai medici graduati, che si mettono nella carriera della pratica; ma a quegli ancora, i quali non dediti per professione allo studio della medicina, per solo impulso di umanità e di beneficenza si determinano ad esercitare quest' arte, dove la lontananza priva le persone dei soccorsi del medico, dei rimedj dello speziale, e dei sollievi che ne potrebbero avere. Persuaso l' esimio Autore, che lo scopo principale della medicina è quello di guarire i mali, e non il farvi su di belle dicerie, è stato lontano dalle astruse dottrine della teoria, ed attaccato solamente ai precetti pratici, ha ordinato in modo la sua opera, che può essere a portata di qualunque persona un po' superiore della volgare ed indotta sfera. Ed in vero noi viviamo in un tempo, in cui ciascuno dei due sessi, senza piccarsi di erudizione, osa pure internarsi nello studio della fisica, nei vortici di DESCARTES, nella sua materia sottile, negli effetti del diamante; e non contento di queste ricerche pretende innalzarsi ai cieli per conoscere le rivoluzioni delle sfere celesti, misurare le loro distanze, e contemplare i loro aspetti; e tutto questo unicamente per soddisfare la curiosità. Ora quelle poche riflessioni, che quì si propongono, saranno elleno superiori alla loro capacità? E perchè negheranno di prestarsi allo studio di qualche riflessione medica, cavata come dal suo proprio fondo, la quale servirà, se non ad altro, a distruggere le prevenzioni, che si hanno per la qualità dei rimedj, i quali più per abitudine che per raziocinio si sogliono amministrare dagl' impostori e dai sedicenti professori dell' arte?*



Scopo principale di HERRENSCHWAND è stato dunque quello di essere facilmente inteso, perchè ognuno possa seguire i passi della natura e tutte le sue operazioni ; vederne l'ordine , l'armonia , ed imparare i mezzi , di provvedere ai suoi disordini senza giammai deviare dalle sue strade . Comincia egli dal premettere un' idea generale sui diversi temperamenti per poter bene rilevare i vizj , ai quali dispone la varia temperatura dell' uomo : parla delle molteplici malattie delle parti costituenti l' economia animale ; quindi dopo un discorso generale sulla febbre discende ai sintomi proprj della febbre medesima , colle quali premesse entra nel dettaglio delle molte e più frequenti malattie interne ed esterne , conchiudendo l' opera coi varj regolamenti necessarij per le diverse malattie , e con un ampio ragionato compendio di ricette medico-chirurgiche esposte in buon ordine , e lontane dal fasto inutile , anzi dannevole delle moltiplicate spezie , senza indicante bisogno ; e siccome l' autore ebbe in mira di provvedere colle sue prescrizioni anche alla classe indigente , così sostituisce alle ricette dispendiose , altre economiche , e non per tanto meno giovevoli .

Nè potrà alcuno dubitare di aver io esagerato del merito di questo libro , quando si saprà , che HERRENSCHWAND è un vecchio medico , il quale ha consacrato la sua vita allo studio ed all' esercizio della medicina ; che nella sua gioventù ha studiato a Strasburgo sotto i celebri SALZMANN , BOECKLER e NICOLAI ; nella università di Saxe sotto WEDEL , HAMBERGER , TEICHMEYER e Fr. HOFFMANN ; e finalmente a Leida sotto BOERHAAVE , ALBINI , GAUBIO e s' GRAVESANDE . Fu in quest' ultima città , ch' egli nel 1737. riportò la laurea ; dopo il qual tempo andò a professare la medicina nelle Fiandre , a Londra , a Parigi , in Germania , in Polonia , in Isvezia con un tale successo , che ottenne dai sovrani , i più distinti e

profittevoli onori; e che finalmente dopo la morte del grande HALLER suo amico, il sovrano di Berna lo richiamò dal fondo del suo ritiro per risiedere in qualità di medico consigliere nella capitale di questo cantone.

Ecco l'opera, che io ho intrapreso a tradurre in lingua italiana, perchè, oltre ad essere così più generalmente intesa, possa essere acquistata con minore dispendio; a cui ho cercato di unire tutto ciò, che dagli scrittori moderni è stato scritto per perfezionare i lumi della diagnosi, e la cura dei mali; come anche vi ho aggiunta la descrizione di qualche malattia da me creduta necessaria a maggiore compimento dell'opera.

Dove parla l'autore dei temperamenti, delle malattie delle parti solide, e fluide in generale, non mi sono esteso nelle annotazioni, perchè la materia era abbastanza trattata, e le note non potevano essere che teoriche, epperò lontane dallo scopo della materia. Avendo HERRENSCHWAND fornito questo trattato pratico di un esteso ricettario medico-chirurgico, colla esatta descrizione dei rimedj, e preparazioni, ho creduto di aggiungere la composizione, e virtù degli altri preparati, stati dall'autore omissi, per cui potere il lettore in questo sol libro ritrovare epilogato quello che viene descritto in moltissime opere.

Qui legis ista, tuam reprehendo, si mea laudas  
Omnia, stultitiam; si nihil, invidiam.

OWEN lib. I. epigr. 2.



# INTRODUZIONE.



'Uomo è sano, quando ha la facoltà di fare debitamente tutte le sue funzioni principali. La malattia suppone il contrario, e la parte pratica della Medicina insegna i mezzi di conservare la salute; di conoscere le malattie, i loro andamenti; quali i sintomi favorevoli o dannosi, e l'arte di guarirli, s'egli è possibile; o per lo meno di sollevare il malato.

Quantunque con tutt' i soccorsi della Medicina, la salute non possa essere propria di tutti gli uomini, dappoichè avviene di così mal costituiti sino dalla nascita, ch' essi non ponno godere che di una salute vacillante; si osserva non pertanto, che il più gran numero degli uomini, i quali sono valetudinarij, sono nati coi vantaggi necessarj per potere portarsi meglio.

Siccome la salute si guasta il più spesso, perchè s'ignora o si trascura i mezzi di rimediare alle indisposizioni, alle quali il temperamento è disposto, questo Trattato avrà principio da uno sbozzo della dottrina dei temperamenti. Dopo avere indicato ciò che in generale è conveniente o contrario alle diverse complessioni, si parlerà dei principali vizj primitivi, che lo stomaco, i solidi, e la massa dei fluidi sono soggetti a contrarre; principalmente quando il metodo di vivere non è adattato al temperamento. Rispetto alle malattie, dopo aver trattato delle principali, le quali sono generali o particolari alle differenti parti del corpo, io parlerò dei mali venerei, con essi dando termine a questo Trattato.

## DEI TEMPERAMENTI IN GENERALE.

**I** Temperamenti, considerati siccome il risultato dell'amalgama dei principj costitutivi dell'uomo, variano talmente fra di loro, che ciascun individuo nasce colla sua personale costituzione, la quale per la proporzione, qualificazione, emodificazione delle diverse parti, delle quali è composto, differisce più o meno da quella di ogni altro individuo. Siccome le più volte si trovano nei temperamenti, delle affinità che si assomigliano, e che la speriienza prova, che queste somiglianze sono costantemente accompagnate da vive relazioni tanto rispetto alle operazioni del corpo e dello spirito, come pure alle malattie ed alle indicazioni per la loro cura; i Medici hanno raccolto ciò che l'aspetto e la ricerca loro hanno somministrato di mezzi per classificare i temperamenti in vista dei principj costitutivi, che è loro sembrato dominare nei diversi individui della specie umana.

Gli antichi Fisici, credendo tutti gli esseri materiali composti elementarmente d'aria, di fuoco, d'acqua, e di terra, ed i Medici dei loro tempi riconoscendo nell'uomo questi quattro principj, dei quali l'uno o l'altro predominava in ciascuno individuo; questa opinione li determinò a formare la prima classe delle complessioni sotto la denominazione dei temperamenti caldo, freddo, secco ed umido. Siccom'essi trovarono delle costituzioni, nelle quali alcuno di questi quattro principj non dominava sensibilmente sopra gli altri, chiamarono tale felice e rara unione, la complessione temperata; ed osservando, che il più spesso nel medesimo individuo due principj predominavano nel medesimo tempo sopra i due altri, formarono da questa complicazione una

seconda classe di temperamenti ; cioè il bilioso , il sanguigno , il flemmatico ed il melancolico .

Il caldo ed il secco sono i principj che dominano congiuntamente nel bilioso .

Il caldo e l'umido prevalgono nel sanguigno .

Il freddo e l'umido predominano nel flemmatico ; ed il freddo e secco nel melancolico .

Nel senso stretto non si ponno fare che queste quattro combinazioni ; stante che il caldo ed il freddo, come il secco e l'umido , non ponno prevalere l'un l'altro nel medesimo individuo ; ma egli è dei temperamenti come dei venti , i quali variano all' infinito , giusta i loro diversi rapporti coi venti cardinali . Chiunque saprà distinguere i quattro temperamenti della prima classe , conoscerà per mezzo di qualche attenzione , e rileverà benissimo l'essenziale delle combinazioni accessorie , per potere adattare convenevolmente i regolamenti , non che gli altri mezzi indicati per diminuire i vizj maggiori di tutte le complessioni , e per avvicinarle quanto più è possibile alla costituzione temperata . Imperocchè egli è impossibile all' arte di cangiare assolutamente il temperamento , col quale l' uomo è nato ; ed egli è molto più difficile di correggere il vizioso della costituzione , che l' uomo porta in nascendo , che di rimediare alle alterazioni di una costituzione , che il cattivo regolamento o le malattie avessero prodotte . Nel resto , uno sbozzo dei temperamenti porrà le persone colte , le quali non sono iniziate nella teoria della Medicina , in istato di rilevare la coerenza di un gran numero delle malattie , alle quali la complessione dispone , non che i rapporti dei precetti della pratica ; in seguito la riflessione farà loro conoscere il ragionevole della Medicina .

Siccome vi sono delle costituzioni inclinate all' obesità , alla magrezza , a un vigore , o ad una

delicatezza eccessive , si parlerà di questi vizj di complessione in seguito alla dottrina dei temperamenti , indicando ancora i mezzi di prevenirne le cattive conseguenze .

## DELLA COMPLESSIONE TEMPERATA .

**L**E persone, nelle quali i principj costitutivi dell' uomo si avvicinano ad un certo equilibrio, soggiacciono meno alle gravi malattie; sopportano meglio diversi eccessi , ma meno però dei temperamenti decisi . Per esempio i refrigeranti loro convengono meno che ai temperamenti caldi e biliosi , ma soffrono meglio ciò che li riscalda . Più si approssimà a questa complessione , avvi più a sperare di vivere lungo tempo in salute . Col mezzo del regolamento e dell' attenzione di accostumarsi saggiamente a sopportare ciò ch'è difficile di sfuggire nella vita, le persone dottate di tale temperamento prolungheranno considerabilmente i loro giorni . Così egli è a questa costituzione, che cercar bisogna di avvicinare gli altri .

## DEI QUATTRO TEMPERAMENTI DELLA PRIMA CLASSE .

*Del temperamento , in cui il caldo chiaramente predomina .*

**L**E persone di questo temperamento hanno ordinariamente la capelliera bruna o nera , e più o meno di calore alla superficie del corpo che non se ne ha comunemente . Elleno sono piuttosto magre che grasse ; la carnagione ferma ; il colore vivo e di un rosso che volge allo scuro ; le caruncule degli occhi e dei labbri sono del medesimo colore ; il



polso è molto frequente; le operazioni del corpo e dell'animo come anche le passioni sono vive e pronte. Quelli che hanno cotesto temperamento, sono pure i più elettrici. Il calore, l'aria secca, i grandi esercizi, le veglie, i vini, e gli alimenti riscaldanti portano loro alterazione, agitazione, sonno inquieto: soggiacciono alla costipazione; e comechè la traspirazione è abbondante, le orine e le altre escrezioni ne sono altrettanto diminuite. I solidi sono disposti all'eccesso della elasticità; la massa umorale inclina alla fibrosa densità, la quale dispone alla infiammazione del sangue, all'inspessimento della bile, ed alla savorra calda delle prime strade ec.

Per approssimare questa complessione alla temperata, le persone di temperamento caldo useranno il regolamento descritto sotto la lettera D., e prenderanno sovente il bagno domestico N.º 2.: manterranno libero il ventre colla polvere N.º 175. o con clisteri d'acqua tepida. In primavera ed in autunno si faranno trarre sangue e prenderanno per sei settimane i brodi N.º 14. od il siero di latte; se nella state, le acque minerali leggiere, proprie a diluire ed a rinfrescare il sangue, tali che quelle di Wyssenbourg nella Svizzera: eviteranno ciò che riscalda ed agita; quelli che potranno vivere in un clima temperato, la cui aria farà più umida che secca, si premuniranno delle malattie, dalle quali sono minacciati.

*Del temperamento, nel quale domina evidentemente il freddo.*

Questo temperamento è più ordinario ai biondi che ai bruni; l'occhio manca di vivacità; il rosso delle caruncule degli occhi e dei labbri è debile, ed il languido colorito delle gote si estingue tosto che



si espone al freddo: la pelle è pallida, e più secca che umida: l'abito del corpo ha poco calore; il polso è piccolo e lento: le operazioni del corpo e dell'animo sono tarde: le persone così costituite sono inoltre indolenti, indifferenti, poco suscettibili di passioni, ma fisse nelle loro idee; inclinate al silenzio ed alla tristezza; ordinariamente grasse: sputano e cavano molta pituita: le loro orine sono pallide, spumose, abbondanti: il ventre o tardo o rilassato; ciò che rinfresca, al momento li pregiudica; il freddo, e ciò che interrompe la traspirazione, loro porta la pelle rugosa e li fa tremare.

Il temperamento freddo è ancora caratterizzato dalla poca elasticità dei solidi: è disposto alla favorra viscida delle prime strade, all'inspessimento mucoso della massa dei fluidi, alla flatulenza, all'ostruzione del basso ventre, all'ipocondria, alle malattie catarrali, alle febbri d'accesso ec.

Si correggerà questo temperamento seguendo il metodo prescritto sotto la lettera C., coll'esercizio giornaliero, e coll'uso delle frizioni fatte mattina e sera su tutta la superficie del corpo. Nella state i bagni delle acque termali di Loesch, Bade, Schinfinach negli Svizzeri, od in loro mancanza i bagni N.º 1. saranno molto salutari. Si purgherà negl'intervalli, tutti i mesi colla decozione num. 31., e prenderà in primavera ed in autunno i brodi amari N.º 10.

*Del temperamento, in cui l'umido predomina evidentemente.*

Questa complessione differisce dalla fredda, in ciò che la pelle è rilassata e floscia; le fibre hanno sì poca elasticità e la massa umorale predomina talmente di sferosità, che, al semplice aspetto, l'abito

del corpo sembra dover essere tumido e cedente al tatto. Il temperamento umido altronde ha molta affinità col freddo: egli dispone alla favorra pituitosa, alle malattie verminose, alle affezioni idropiche esterne ed interne, all'apoplezia e paralizia fierosa ec.

La correzione di questo temperamento esige gli esercizi indicati per la complessione fredda, che si prolungherà fino all'umidità: il regolamento sarà pure il medesimo, interposto da quello descritto sotto la lettera A.: si frequenteranno le purghe col decotto N.º 31.: si userà la polvere marziale N.º 182.: nella state berà le acque marziali, cercando di vivere in un'aria calda e secca; e per assicurare il miglioramento procurato, si osserveranno esattamente i regolamenti prescritti sotto le lettere A. ed I., e si faranno viaggi di lunga corsa nei paesi meridionali.

*Del temperamento, in cui il secco predomina evidentemente.*

Questo temperamento si conosce dalla grande magrezza del corpo; le carni sono ricoperte da una pelle fibrosa elastica; la traspirazione insensibile è copiosissima, le altre escrezioni sono poche e quelle del ventre, compatte e secche. Le persone così costituite sono agili di corpo e di spirito; ma le loro forze cedono facilmente. I vasi sanguigni sono molto apparenti, il polso-è alto e duro, i fluidi densi, la bile spessa; le complessioni secche hanno ancora della disposizione alla favorra atrabile, alla melancolia, alle malattie infiammatorie ec.

Per correggere il temperamento secco, bisogna usare abitualmente i regolamenti indicati sotto le lettere E. F. e G., e preferire gli alimenti farinosi, i sugosi erbaggi ed i frutti fondenti. Si prenderà so-

8 *Dei quattro temperamenti della prima classe.*

vente il bagno prescritto sotto il N.º 2.: si rimedierà alla costipazione coi lavativi d'acqua di seme di lino; viverà in un' aria temperata ed umida; si umetterà abbondantemente col siero di latte, col latte d'amandole, e coll' acqua d'orzo e di riso; prolungando il sonno, esercitandosi moderatamente, ed eccitando i travagli dello spirito, lunghi o penosi.

DEI QUATTRO TEMPERAMENTI MISTI,  
CHE FORMANO LA SECONDA CLASSE.

**P**ER distinguerli si cercherà immediatamente di conoscere i due principj della prima classe, che dominano sui due altri, e combinandone i lumi dati sui temperamenti semplici, si saprà, se è il caldo od il secco, che prevale nel bilioso; il caldo o l'umido nel sanguigno; il freddo o l'umido nel flemmatico, ed il freddo o 'l secco nel melancolico. Con cotesta disamina si arriverà a conoscere il temperamento di ciascun individuo.

Per correggere questi temperamenti misti, si comincerà dall' usare ciò che è stato raccomandato per moderare il principio predominante nelle costituzioni di prima classe: inseguito di che si occuperà più particolarmente del secondo principio, che prevale sui due altri, osservando sempre di modificare talmente i mezzi, che si arrivi ad avvicinare i temperamenti della seconda classe alla complessione temperata; e ciò solamente quanto basterà per preservare questi quattro temperamenti dalle malattie maggiori, dalle quali sono minacciati. Queste sono, appo i biliosi, nei quali il caldo ed il secco dominano, la disposizione all' inspessimento della bile e del sangue; la savorra e la febbre intestinale biliosa; le malattie acute con o senza infiammazione; le congestioni



ostinate nel sistema dei vasi del basso ventre, che riportano il sangue al cuore per la vena porta; l'emorroidi secche, l'ostruzione delle viscere addominali; l'ipocondria, le affezioni coleriche ed atrabiliari ec.

Al contrario il temperamento sanguigno in cui l'umido è associato al caldo, dispone alla soprabbondanza del sangue e della bile. La bile è soggetta a contrarre troppa fluidità, ed un'acrimoniosa putrescenza, la quale accagiona una simile savorra nello stomaco, e le febbri intestinali della medesima natura facilmente degeneranti in febbri biliose putride. Questa costituzione dispone ancora all'emorragie, all'emorroidi fluenti, a congestioni locali più o meno infiammatorie, a febbri continue ed intermittenti, ed a febbri catarrali, maligne od elantematiche, come pure alla disenteria, quando la materia della perspirazione venghi a retrocedere.

Quanto alla complessione flemmatica ed alla melancolica, si distingueranno facilmente questi due temperamenti, coi riscontri dati nella descrizione delle costituzioni fredde, secche, ed umide. La flemmatica essendo predominata dal freddo ed umido, dispone alla soverchia sferosità, alla savorra pituitosa delle prime strade, alle affezioni catarrali ed alle flussioni fredde, alle infeltrazioni acquose nel tessuto cellulare, agli spandimenti d'acqua che formano le differenti idropisie, alle affezioni verminose, alle varie malattie della pelle ec.

Nel temperamento melancolico, in cui il secco ed il freddo prevalgono congiuntamente, la fibra è più elastica che nelle persone flemmatiche; i fluidi e soprattutto la linfa peccano di un viscido inspessimento e glutinoso; il polso è pieno ed inceppato, ed a questo stato nasce la pigrizia di tutte le operazioni del corpo e dell'animo. Le persone di una

tale costituzione sono silenziose, pallide, macilente, occupate sempre del medesimo oggetto; perdono il sonno, sono sospettose e di difficile società; divengono ostinate ed ancora indomabili.

Fralle complessioni più complicate e quelle che partecipano dei temperamenti della seconda classe, il sanguigno-bilioso, ed il sanguigno-flemmatico sono i più ordinarj e i più desiderati. Il bilioso temperato dalla flemma è la complessione più vantaggiosa per le grandi operazioni dello spirito: Per correggere questi diversi temperamenti si seguirà il metodo che indicheremo; e siccome si tratterà particolarmente della maggior parte delle malattie, alle quali il temperamento dispone, questo sbozzo basterà per far distinguere le affinità dei mali colle varie costituzioni del corpo umano, e conoscere l'essenziale di ciò, che convien fare, per isfuggire i grandi scogli, nei quali il temperamento conduce l'uomo.

## DELLA COSTITUZIONE ECCESSIVAMENTE FORTE.

**L**A forza del temperamento si manifesta principalmente da una struttura atletica; la pelle è piuttosto fosca che bianca; le carni sono ferme e dure; le spalle larghe, il petto ampio, i membri muscolosi e del pari che il ventre piuttosto carnosi che grassi: tutto questo ed il vigore sostenuto dal polso e da tutte le funzioni animali e vitali, sono segni non equivoci della costituzione forte.

I giorni delle persone forti sono molto meno assicurati ch'essi non credono generalmente: oltrechè il temperamento li porta a diversi eccessi, e ch'essi sono esenti da quei piccoli mali, che obbligano a dei ritegni; la costituzione forte conduce



naturalmente ed in modo insensibile all' efficàmento dei piccoli vasi : a misura che crescono in vigore , divengono sempre più soggetti a malattie acute infiammatorie .

Si preverrà l' accrescimento della elasticità dei solidi non che l' inspessimento caldo del sangue e le malattie , alle quali dispone questo temperamento , mercè l' uso dei regolamenti sotto le lettere D. F. e G. , frapposti dagli alimenti del regolamento sotto la lettera A. Si rimedierà alla pletora col salasso , si prenderà spesso qualche bagno di acqua crusca tiepida ; e nella primavera e nell' autunno il siero di latte , di cui si continuerà l' uso per lo spazio di più settimane : si potranno prendere ancora i brodi N.<sup>o</sup> 14. Si sfuggiranno le bevande spiritose ; nei pasti si berà ordinariamente molt' acqua pura o vin bianco leggiero diluito con acqua ; e nell' intervallo dei pasti , acqua d' orzo , orzata • limonea leggerissima .

*Della costituzione delicata .*

Le persone che sono di costituzione delicata , hanno comunemente la pelle bianca sottile e marezzata di vene di un azzurro chiaro : il colore delle gote e dei labbri è ordinariamente vivo ; le ossa sono gracili ; la tessitura del corpo è fina ; il petto stretto , il polso frequente , e lo spirito vivo . Sono molto agili ma prontamente oppresse ed insofferenti d' ogni eccesso : sono egualmente incomodate dal caldo e dal freddo ; il loro stomaco ed il loro petto sono siffattamente deboli che poca cosa porta loro o indigestione o flusso di ventre : soggiacciono ad una tosse secca , a sputo di sangue , all' emorragie di naso ; hanno un' anima sensibile ; le parti irritabili del corpo s' increspano facilmente , ed il sesso soprattutto

così costituito è molto inclinato alle spasmodie convulsive e vaporose: le fibre nelle persone di tale temperamento sono gracili e sottili, ed il sangue ha un difetto di consistenza, che produce incomodi analoghi all'acrimonia. L'equilibrio che dipende dall'azione e dalla reazione reciproca dei solidi e dei fluidi, non persiste molto; gli spiriti si portano nelle parti irritate, e le funzioni dell'economia animale del pari che le operazioni dell'anima si fanno con irregolarità.

Fino a che la delicatezza del temperamento sarà accompagnata da molta magrezza e debolezza, non si potrà meglio fare che di usare il regolamento prescritto sotto la lettera G. sino a che tutto l'abito del corpo appaja meglio nutrito; e nel caso che lo stomaco fosse molto debile, si comincerà dal latte di donna o di asina. Si faranno nel medesimo tempo mattina e sera frizioni leggiere su tutto il corpo; si faranno frequenti passeggiate, avvertendo di scansare la fatica, e tutto ciò che debilita, e si viverà per quanto è possibile, senz' affannarsi, o senza molestarli con cose disagiataevoli. Si farà succedere a questo regolamento quello indicato sotto la lettera B.: si dilungheranno le frizioni, si accresceranno gli esercizi. L'ammalato cavalcherà; ed acquistato qualche vigore, il vero mezzo di accrescerlo, farà di esporli insensibilmente alle ingiurie del tempo, di condurre una vita campestre, di mangiare tutta specie d'alimenti, e cibi freddi piuttosto che caldi; di preferire un nutrimento compatto ad uno leggiere; di fare lunghi viaggi, e lunghe navigazioni; di lavarsi il corpo coll'acqua fresca, e di tuffarsi due volte la settimana, e principalmente colla testa, non vi restando che un momento; ed affine di accostumarvisi insensibilmente, si prenderanno le prime bagnature alcun poco tiepide.

### *Della costituzione magra.*

Le persone nelle quali la magrezza proviene unicamente dal temperamento; e che d'altronde sono sane, rifaranno insensibilmente carne col mezzo della dieta lattea, o con il lungo uso dei regolamenti prescritti sotto le lettere F. ed H. In autunno mangeranno tanta uva bianca e ben matura, quanta ne potranno sopportare, senz' avere uscite di corpo; dormiranno molto, prenderanno spesso alcune bagnature tiepide; eviteranno il calore, la secchezza, tutti gli esercizi un po' violenti, i grandi travagli dello spirito, gli spaventi, come anche le vive passioni dell' animo. Beranno molt' acqua di riso o di orzo, pura o ridotta in emulsione con qualche pistacchio, con amandole dolci, e preferentemente con pinocchj.

Allorchè le persone, che sono di tale costituzione, avranno acquistato sufficiente buon abito di corpo, si getteranno all' uso del regolamento sotto la lettera A., preferendo gli alimenti farinosi; e prenderanno il latte di capra in primavera ed in autunno.

### *Della costituzione inclinante all' obesità.*

Si cercherà di arrestare i progressi dell' obesità mediante una vita dura e laboriosa; trattenendo lo spirito in affari difficili, o che accendono le passioni; il sonno farà corto; si eviteranno le vivande succose, i cibi farinosi grassi o abbondanti di parti butirrose e nutrienti: si mangierà poco; il pane ordinario farà impastato con tritello e ben cotto; gli alimenti faranno conditi con gli stimolanti aromatici indicati al regolamento sotto la lettera G. Si preferirà il pesce alla carne; i cibi freddi duri e compatti ai caldi; i frutti e gli erbaggi acerbetti e

di un gusto aspro ai dolci e di polpa farinosa. Si asterrà dalle zuppe, dalle false, dalle gelatine, dai piccatiglj, dalle uova, dalla pasticceria, dal latticino, dalle birre spesse, dal vin rosso, dai vini dolci, midollofi, densi, nutrienti o stomatici; si starà in dieta di tempo in tempo; si berà a digiuno e nell' ora del riposo alcune tazze d'acqua di sorgente leggiera e fredda, astenendosi dal thè e dalle altre bevande fatte con acqua calda.

## DELLE INDISPOSIZIONI PRIMITIVE.

*Alle quali il temperamento dispone, e che facilmente si contrae con un regolamento di vivere contrario, come pure a motivo degli errori e degli eccessi, che si commettono il più frequentemente nel corso della vita.*

**L**E indisposizioni primitive, alle quali il temperamento dispone, o che si contraggono con un genere di vivere generalmente pregiudicevole alla salute, o contrario alla costituzione del corpo, provengono da alcuni vizj, che si formano insensibilmente nello stomaco e nelle prime strade, e che alterano il sistema dei solidi o la massa umorale.

Rispetto allo stomaco i suoi principali vizj che si acquistano col metodo di vivere, sono le favorire od ammassi di crudità fredde, calde od atrabilari.

I solidi soggiacciono a contrarre eccessi o difetti nella loro elasticità, e per ciò che riguarda la massa dei fluidi, la soprabbondanza od il difetto, l'eccesso di vivacità, od impoverimento del sangue, diversi vizj di consistenza e differenti acrimonie sparse in tutta la massa umorale, o che alterano particolarmente la linfa; tali sono i vizj generali e primitivi, dei quali si parlerà.



## DELLE DIFFERENTI SAVORRE DELLE PRIME STRADE .

**S**I chiama favorra, gli ammassi d'umori nelle prime strade, che si formano insensibilmente, e che soggiacciono a rinnovarsi, sino a che il fomite non ne sia assolutamente distrutto, Questo vizio è frequente, e cagiona una infinità di malattie da esso derivanti. Quantunque gli umori ed i fermenti che costituiscono questo ammasso nelle prime vie, siano di diversa qualità, basterà distinguerle in favorre o crudità fredde, calde, ed atrabiliari.

### *Della favorra fredda .*

Il temperamento freddo umido ed il rilasciamento dei solidi dispongono alla favorra fredda. Ella è prodotta dagli alimenti farinosi, grossolani ed indigestibili; dal latticinio, dai legumi, dai frutti acquosi viscidì od acidi; dal thè o dall'acqua calda prese all'eccesso; finalmente dai vini e birre poco spiritose e di fredda qualità.

Gli umori che costituiscono la favorra fredda, sono più o meno catarrosi, viscidì, glutinosi e pituitosi. Questa favorra è sovente accompagnata da un fermento acido nello stomaco; e le persone, le cui prime strade sono viziate da fredde crudità (a meno che il fermento acido non predomini assai fortemente per eccitare l'appetito) provano avversione; la loro lingua è bianca e ricoperta da lordura; hanno la bocca pastosa e la saliva viscida, peso o sentimento di pienezza allo stomaco. Questi sintomi sono accompagnati da una sensazione di freddo alla forcilla del petto, allorchè la favorra è semplicemente pituitosa; ed i malati si lamentano

di una specie di ardore, quando lo stomaco è nel medesimo tempo sopraccaricato da un fermento acido. Le persone che sono in questo caso, sono inoltre soggette a sputacchiare molta pituita, ed avere dei rigurgiti e flati insipidi inodori; qualche volta hanno sentore acido. Il ventre è ordinariamente tardo; le fecce glutinose, di colore che volge al bianco od al verde; le urine spumose e chiare, o che depongono un sedimento limaccioso e bianco; la testa, il corpo, e lo spirito sono pesanti e turgidi, principalmente dopo i pasti; la digestione è lenta, penosa, e cattiva; e quando l'ammasso delle crudità fredde è considerabile, si congiunge a questi sintomi l'intermittenza del polso, la nausea, il vomito bavoso, la colica, la diarrea.

La favorra fredda produce insensibilmente l'ispessimento freddo, e l'acrimonia fredda della massa umorale, come pure le varie malattie croniche, che ne dependono: ella dispone ancora alla verminazione.

Se questo vizio è recente, si svuoteranno le prime strade colla polvere d'ipecacuanna N.º 192.: questa è la strada più spediente, la quale senza veri contro indicanti è sempre la preferibile. Questa evacuazione farassi, se conviene a diverse riprese, prendendo nell'intervallo la polvere digestiva N.º 176.: si purgherà all'indomane col decotto lassativo N.º 31. Il cibo sarà per alcune settimane degli alimenti più leggieri, del metodo indicato sotto la lettera C.; si mangerà poco per volta; si farà dell'esercizio, e si prenderà al fine dei pasti l'elifire N.º 58., il quale, riescendo inefficace, si sostituirà quello del N.º 56.; e nel caso la bile del malato sia inerte, si preferirà l'elifire N.º 57.

Quando la favorra fredda sarà inveterata od ostinata, si adopreranno successivamente in seguito ai rimedj suddetti, quelli comendati per la cachessia.

*Della*

*Della favorra calda.*

Il temperamento caldo e bilioso dispone alla favorra calda; ella è prodotta dalle uova, dal butirro, dagli alimenti grassi ed oleosi; dai pesci e dagli alimenti tutti che si corrompono e si alcalizzano facilmente, come pure dalle acque stagnanti e che tendono alla corruzione.

Le persone che sono affette da questo vizio nelle prime strade, non appetiscono che alimenti acidi o bruschetti; ripugnano di mangiare la carne; sono alterate, soggette ad avere dei rigurgiti di gusto e d'odore putridi quali di uovo infracidato; la bocca è amara o infetta da un sapore di corruzione, e la lingua spalmata da una materia gialla. Quelli che hanno una favorra calda nello stomaco, soggiacciono ad un calore alla forcilla del petto, a rimettere materie puzzolente, biliose, acri, o sopra o sotto. Se questa favorra è inveterata, ordinariamente resta accompagnata dai sintomi, che dinotano l'acrimonia calda della massa del sangue.

Se la favorra è recente, basterà sbarazzare lo stomaco colla polvere vomitiva d'ipecacuana N.º 192., e di purgarsi un pajo di volte colla pozione minorativa N.º 168.; osservando in seguito per quindici giorni il regolamento sotto la lettera D., e prendendo l'elisire N.º 59.

Quando al contrario la favorra calda sarà inveterata, si ripeteranno le suddette evacuazioni secondo il bisogno, che si rileverà: si prolungherà l'uso del regolamento e dell'elisire indicati, fino a che i sintomi di tale indisposizione sieno affatto tolti; e che la massa del sangue sia sgombra dai fermenti, che vi si erano introdotti.



*Della favorra atrabilare.*

Il temperamento secco e caldo come pure il melancolico dispongono alla favorra atrabilare. Ella è prodotta dai timori, dalle vive o lunghe affezioni dell'animo, dalle profonde meditazioni, dalle veglie, dai continui travagli dello spirito, come pure da un regolamento caldo e secco. Gli umori che costituiscono questo genere di favorra, sono una bile acre spesso ricotta e tenace al segno che egli è difficile di diluirla, di fiaccarla, e di evacuarla. Le persone che vi sono soggette, hanno gl' ipocondri tesi, ed il più sovente questa regione è irritata, increspata, od affetta da un sentimento di calore; hanno la bocca secca amara; sono soggette alla costipazione che molto le incomoda; ed il loro corpo non che il loro spirito risentono i diversi sintomi famigliari agl' ipocondriaci ed ai melancolici.

Non si trascurerà questa favorra, stante che conduce precipitosamente alle affezioni ipocondriache e melancoliche: Affine di rimediarvi si comincerà dall'emetico N.º 178.; si diluiranno in seguito gli umori atrabilari, bevendo a questo effetto tutte le mattine per cinque o sei giorni tre o quattro libbre di siero di latte leggermente melato, od altrettanto d'acqua d'orzo mischiata con tre o quattr' once d'osimele semplice. Al fine di questo termine si purgherà colla pozione emetica N.º 165. Dopo tale purgazione si ritornerà ai diluenti raccomandati, prendendo ciascuna sera il lavativo N.º 108. replicando ad ogni otto o dieci giorni la stessa bevanda, avvertendo che nel caso il malato sia pletorico, di salaffarlo innanzi la prima purga.

Se dopo la seconda evacuazione, i sintomi della favorra atrabilare non siano dissipati, la persona af-



fetta prenderà per quindici giorni la mattina al suo svegliarsi un mezzo bagno di acqua-crusca tiepida , e berà dopo essersi di bel nuovo evacuato , per lo spazio di tre settimane , le acque termali purgative indicate sotto il N.° 3. , osservando il regolamento prescritto sotto la lettera E. : in seguito assicurerà la sua guarigione coll' esercizio del cavallo , e l' uso dell' acque minerali ferruginee , aperitive e leggiermente purgative riferite sotto il medesimo numero .

## DEI VIZJ GENERALI DEI SOLIDI.

### *Del difetto di elasticità nei solidi .*

**I**L temperamento freddo ed umido , come pure la costituzione molto carnosaf dispongono al difetto di elasticità . La vita molle , l' aria umida , gli alimenti grassi ed acquosi , l' uso smoderato del thè , e dell' altre bevande acquose e calde , le malattie ed i travagli opprimenti dello spirito , ne sono le cagioni ordinarie .

A misura che i solidi si rilassano , la pelle prende un colore più pallido e s' ammolisce insensibilmente : il rossore delle labbra e delle caruncole degli occhi si estingue ; si diviene pesante e sensibile al freddo ; la digestione opprime e dopo i pasti provasi un senso di pienezza e di mal essere ; la forza e l' agilità del corpo diminuiscono , il polso diviene molle e piccolo ; il sonno aggrava e non ripara alle forze ; le fecce sono glutinose e non collegate ; le orine pallide ed abbondanti ; esercitandosi si provoca piuttosto il sudore che la traspirazione insensibile , ed a misura che il rilassamento dei solidi cresce , la vivacità dello spirito manca .

Le malattie che seguono il rilassamento dei solidi , sono l' inspessimento freddo del sangue e della linfa , i catarri freddi , la cacochimia , la ca-

chessia , l'edema , e le ostruzioni tanto delle ghiandole che delle viscere del ventre inferiore .

Egl' importa di osservare particolarmente alla cagione del rilasciamento ed al grado di debolezza dell' ammalato . Coloro che avranno contratto il difetto di elasticità per un semplice raffinamento , e che faranno nel medesimo tempo molto deboli , impiegheranno successivamente ciò che è stato raccomandato per fortificare la costituzione delicata . Dacchè faranno arrivati a potere far uso del regolamento sotto la lettera C. , cominceranno a prendere la tintura di Marte o l' elettuario corroborante N.º 201. , e 54.

Al contrario quando la debolezza sarà mediocre , o che il rilasciamento dei solidi sarà prodotto da un metodo di vivere rilasciante , o da una vita molle , si nutrirà principalmente di polli bianchi , di vitella o di castrato arrostiti , evitandone di mangiare il grasso ; si farà uso dei frutti astringenti , tali che la mela cotogna , la nespola , il cinorrodon , i capperi ; si eviteranno gli alimenti farinosi , acquosi , grassi , come pure l'acqua calda , e tutto ciò che è indigestibile . Si berà poco , e coloro che non beranno se non acqua , faranno estinguere nella loro bevanda un pezzo d' acciaio o di ferro rovente ; quello che berà vino , preferirà il vino rosso grosso ed aspro , puro o mischiato con acqua ferrata .

Inoltre userà la fregagione generale mattina e sera con una secca flanella , prolungando insensibilmente la fregagione , e prendendo gradatamente altrettanto esercizio quanto potrà sopportare senza indebolirsi . Rispetto ai medicamenti , nel caso che il rilasciamento dei solidi sia evidentemente accompagnato da soprabbondanza di sierosità , si purgherà giusta il bisogno col decotto lassativo N.º 31. , continuando a fare tutto ciò che si è prescritto sino a

che i sintomi caratteristici dei difetti di elasticità sieno spariti; e se si desidera di accrescere l'elasticità dei solidi, vi si arriverà coll'uso dei bagni freddi, col regolamento sotto la lettera I., colle acque fredde ferrate, riputate corroboranti, coi lunghi viaggi o con un genere di vivere contadinesco.

*Dell'eccessiva elasticità dei solidi.*

L'eccessiva elasticità dei solidi è direttamente opposta al vizio precedente. A misura che l'elasticità cresce, la pelle e le carni divengono più resistenti al tatto; i labbri e le caruncole degli occhi acquistano un rosso fosco; il vigore cresce; l'abito del corpo e le orine diminuiscono; la traspirazione insensibile diviene più abbondante; il ventre è costipato; il polso duro e forte. Le persone le cui fibre sono troppo elastiche, hanno molto calore naturale, e tutto ciò che essicca e riscalda, le porta incomodo.

Questo vizio dispone all'acrimonia alcalina, all'inspessimento caldo del sangue, alle infiammazioni, alle febbri continue, ed alle malattie acute.

Si comincerà dal rimediare alla pienezza del sangue col salasso: si offerverà il regolamento prescritto sotto le lettere D. ed H. avvertendo nel medesimo tempo di usare moderatamente gli acidi non austeri. Si berà molt'acqua d'orzo, latte di mandorle dolci, od orzata leggiera, e si prenderà spesso qualche bagno tiepiduccio, in cui vi siano bolliti due pugni di crusca di frumento.

Dopo aver usato di queste bevande, si passerà al fiero vaccino da prendersi tiepido e mediocrementemente chiarito, e da raddolcirsi con siroppo di viole. Se ne prenderà tutte le mattine per alcune settimane due libbre; e le persone che non lo sopportano, gli sostituiranno il brodo di pollo, unito alla crema



d'orzo. Nelle stagioni dei frutti, mangieranno molte cerase bruschette o dolci, ma ben mature, uve bianche turgide di un sugo, che non sia molto spiritoso e non pertanto ben mature, delle fragole, dei fichi, dei meloni, e delle pesche, delle pere fondenti, od altri frutti emollienti e raddolcenti, crudi e cotti. I loro esercizi di corpo saranno moderatissimi, sfuggendo i travagli dello spirito non che le violente passioni. Questo regolamento farà continuato fino a che il ventre sia lubrico, il sonno piacevole, e che la forza dei solidi trovissi sufficientemente diminuita.

### DEI VIZJ GENERALI DELLA MASSA DEL SANGUE.

**L**A massa del sangue è un aggregato di differenti fluidi distinguibili all'occhio, e di diversi principj separabili col mezzo delle chimiche operazioni. Questi fluidi sono perfetti, quando tutta la massa è proporzionata alla capacità dei vasi; che non ve ne ha più o meno del bisogno per conservare la libera circolazione; e che la parte rossa, mucosa, sierosa e linfatica, i sali, i zolfi, la terra, l'acqua e gli spiriti componenti il sangue, sono di buona qualità, e nella giusta proporzione per la dovuta consistenza di tutta la massa, per il buon esito delle secrezioni, non che delle azioni vitali, animali ec. che ne dipendono.

#### *Della plethora.*

La soprabbondanza del sangue che si chiama plethora, si manifesta comunemente da un gonfiamento elevato delle vene, e da una sorte di rilasciatezza o di abbattimento, e d'indolenza nelle membra.



Le persone pletoriche restano riscaldate o stancate per piccoli esercizi; e siccome il sangue si porta ordinariamente alla testa; il rossore del volto ne rimane accresciuto. Soggiacciono ancora ad avere offuscamenti di vista, mali di testa, stordimenti, sopore; il loro sonno è sovente duro e profondo, ed il polso pieno o imbarazzato.

Le conseguenze più ordinarie della pletora sono le vertigini, la febbre efimera, e le congestioni del sangue, da cui ne risultano malattie infiammatorie, l'apoplessia sanguigna ec.

Si rimedia immediatamente alla pletora col mezzo di un salasso proporzionato alla pienezza dei vasi: ma siccome il solo salasso dispone comunemente alla recidiva, si avvertirà, dopo avere svuotati i vasi, d'intraprendere esercizi proprj ad accrescere la traspirazione. Si vivrà di cibi poco nutrienti; si starà in dieta; si berà molt'acqua di sorgente leggiera e fredda; si eviterà la vita molle; si dormirà poco, e nel caso che si sia molto disposto alle indisposizioni enunciate, si prenderà, dopo il salasso, per otto giorni mattina e sera, la polvere di cremore di tartaro N.º 175.

Osserverò ancora, che quelli soggetti all'emorragie da naso, allo sputo di sangue, al flusso emorroidale, come pure le donne che avranno lasciata la loro menstruazione, non ponno senza molto pericolo, essersi dal salasso, allorchè dopo avere perdute quest'evacuazioni naturali, elleno diventano pletoriche. Convien ancora a que' tali accostumati al salasso per precauzione in primavera ed in autunno, allorchè vorranno disvezzarsene, di fare in modo che diminuiscano subito soltanto la quantità del sangue solite a farsi levare, poi di sospendere il salasso dell'autunno, continuando ancora per alcuni anni quello di primavera. Rispetto alle persone che temono il

salaffo , vi suppliranno colle ventose, coll' applicazione delle sanguisughe alle braccia , alle mani , od alle gambe , o finalmente colla dieta .

*Della mancanza del sangue .*

Il temperamento freddo e flemmatico dispone alla mancanza del sangue . La dieta , l' uso dei cibi poco sostanziosi , una vita laboriosa , le lunghe malattie , le grandi evacuazioni o di lunga durata , producono questo incomodo : Si conosce la mancanza del sangue dalla debolezza del polso , dal pallore del volto e della pelle ; conseguenze degli effetti nominati . Questi sintomi sono accompagnati da debolezza e da una specie di languore nelle funzioni sì del corpo che dello spirito .

La mancanza del sangue dispone alla consunzione , all' idrope anasarca , alla febbre lenta ec.

Si userà a proporzione del grado di debolezza , in cui si sarà caduto ciò , che è stato raccomandato per fortificare le costituzioni delicate , e si prenderà nei momenti di debilità la mestura cordiale N.<sup>o</sup> 124. , od un cucchiajo d' eccellente vino prelibato .

*Della sottigliezza viziosa del sangue .*

Quelli che inclinano alla sottigliezza viziosa del sangue , hanno la massa umorale spogliata di parti balsamiche e mucilagginee , le quali danno al sangue la consistenza necessaria , e legano i diversi principj , dei quali la massa è composta . Le persone che si trovano in questo caso , hanno il colorito assai vermiglio , tutto che in realtà siano deboli : sono vivi ed agili di corpo e di spirito , ma assai facilmente oppressi ed indeboliti : soggiacciono al sudore , all' emorragie , alla diarrea , al flusso d' orina , ai

ribollimenti ed alle flussioni; il loro polso è vivo e frequente, il sonno inquieto, il sangue che loro si cava, è di un rosso vivo, e prende poca consistenza, quand'è raffreddito.

Cotal vizio dispone alle infiammazioni esterne, alle congestioni reumatiche, allo sbocco di sangue, alla tifezza, alla febbre lenta ed alle febbri esantematiche rosse.

Si rimedierà insensibilmente alla sottigliezza viziosa del sangue coll'uso del latte vaccino, e col regolamento prescritto sotto la lettera F. Affine di prevenire gli accidenti, che ne risultano, non si lascerà di fare piccole cacciate di sangue in autunno ed in primavera sino all'età dei 30. anni. Si eviteranno pure le veglie, e tutto ciò che agita il sangue.

*Della soprabbondante sferosità del sangue.*

Il temperamento umido, flemmatico, come pure la mancanza di forza dei solidi, dispongono alla soverchia sferosità nella massa umorale; ed a ciò contribuiscono gli alimenti acquosi, gli eccessi del tè o di altre bevande di acqua calda, siccome ancora il difetto di esercizio, che ne sono le principali cagioni.

Le persone che ne sono affette, sono incomodate da differenti sintomi, i quali caratterizzano il temperamento umido; elleno soggiacciono ai catarrhi freddi e pituitosi, alla gonfiezza, all'edematose enfagioni ed hanno molta disposizione all'idrope.

Allorchè la soprabbondante sferosità è soltanto una conseguenza del temperamento, vi si rimedierà col regolamento e rimedj prescritti per correggere le costituzioni umide e flemmatiche: si replicheranno i purganti prescritti per questo temperamento,

fino a che i soprabbondanti umori sieno evacuati. In seguito si prenderà, per assicurare meglio l'acquisto, l'elettuario marziale N.º 52. per quindici giorni ed anche più, se ciò è necessario.

Quando al contrario la dissoluzione del sangue avvenga in conseguenza di una lunga malattia o di un'abbondante evacuazione, senza ch'egli sia presumibile, che nasca da un'altra cagione fuori che da un impoverimento e rilasciamento generale dei solidi, si asterrà in tal caso dai purganti, dai diuretici, e dagli stimolanti: si nutrirà con buoni brodi e minestre, con carni e polli bianchi piuttosto rostiti che lessati, e d'altri alimenti succosi, nutrienti, facili a smaltirsi, presi poco per volta ma di spesso; si berà poco e preferirassi il vino rosso al bianco; si farà fregagione mattina e sera per tutto il corpo con flanella secca; si prenderà l'elettuario corroborante N.º 54.; si passerà poco a poco ai grandi esercizi, continuando a condursi per tal modo fino alla dissipazione delle soprabbondanti sferosità, e fino al ristabilimento dei solidi.

#### *Del riscaldamento abituale del sangue.*

La costituzione calda e mediocrementemente umida, il buon alimento, come ancora le veglie, le bevande riscaldanti, ed una vita fregolata, producono questo vizio del sangue. Cosiffatte persone hanno il colore acceso, il corpo e lo spirito pronti nelle loro operazioni, le passioni vive, il sonno corto, leggero ed accompagnato da torbidi sogni; il calore, il vino, tutto ciò che riscalda, o che anima la circolazione, loro porta mali di testa, veglie, palpitazioni, agitazioni.

In questi casi i diversi principj costitutivi il sangue, sono esaltati od affottigliati, gli spiriti ab-



bondano nella massa del sangue, i solidi sono elastici, il genere nervoso teso; e suscettibile d'irritazione. Cotal vizio dispone ai ribollimenti, all'emorragie, come anche alle malattie infiammatorie ed acute.

Si correggerà insensibilmente questo vizio del sangue, con una vita sobria, coll'uso degli alimenti farinosi e rinfrescanti e coi regolamenti prescritti sotto le lettere D. ed H. unitamente alla quiete dello spirito. Si asterrà dal vino, dai liquori spiritosi, dai cibi sucosi, dalle drogherie, dalle uova, dal cioccolato, dal caffè, e da tutto ciò, che è caldo ed aromatico: si prenderanno i bagni di acqua tiepida ed i brodi rinfrescanti N.º 14. per alcune settimane consecutive; e si calmerà, al bisogno, l'orgasmo del sangue coll'uso della polvere temperante N.º 190. In questi casi pressanti si ricorrerà al salasso, ed il malato berà in ventiquattr'ore sei tazze di acqua fresca resa acidetta, con cinque o sei gocce dello spirito di vitriuolo e due cucchiaj da caffè di siroppo di limone per ciascuna tazza.

*Dell'impoverimento del sangue.*

L'impoverimento del sangue è ordinario alle persone, che sono mal nutrite, spollate dal travaglio, dalle subitanee ed abbondanti evacuazioni, o dalle lunghe malattie. La complessione secca e fredda come pure quella umida e fredda dispongono di più a un tale incomodo, il quale non pertanto nasce indipendentemente da queste cagioni. Coloro il cui sangue è impoverito, hanno il polso piccolo e debile; il colore del volto e della pelle è pallido, giallo, verdognolo; gli occhi languidi; le operazioni dell'animo e del corpo tarde e deboli; sono snerpati, indifferenti, freddi, e non ponno sostenere lungo tempo gli esercizi del corpo e meno ancora

i travagli dello spirito : la digestione li opprime , ed una cattiva notte li snerva come una buona li ristora . Cotal vizio del sangue dispone alle ostruzioni , all' ipocondria , alla tifezza , alla febbre lenta ec. I principj della massa umorale sono mal proporzionati, mal legati ; il sangue è spoglio di spirito , i solidi privi di forza .

Quelli di costituzione secca vi rimedieranno , a motivo del loro indebolimento , ed all' impoverimento del sangue , col latte da donna , di asina , di capra o di vacca , tagliato colle acque minerali , marziali , stomatiche e non purgative siccome quelle di Spaa ec. Vivranno alla campagna sgombri dai fastidj , dalle brighe ; e cercheranno di passare il loro tempo in una piacevole dissipazione , sino a che provino un miglioramento sensibile nel loro stato . Allora passeranno successivamente ai regolamenti prescritti sotto le lettere B. ed A.

Rispetto alle persone di costituzione umida , prenderanno per animare la massa dei fluidi , i brodi di vipera , od in loro vece quelli prescritti sotto il N.º 12. Faranno fregagioni per tutto il corpo mattina e sera , evitando del pari l' inazione e la fatica : si nutriranno principalmente di buone minestre , di carni e polli bianchi , ed arrostiti ; mangeranno poco per volta ma spesso ; beranno ai pasti buon vin rosso non troppo annacquato , e prenderanno negli intervalli un po' di vino prelibato o della mestura cordiale N.º 124. Se il loro stomaco avesse bisogno di essere fortificato , si daranno 20. grani di chinacchina polverata , nei loro due pasti , nel primo cucchiajo di zuppa .

*Della viscosità o condensamento freddo del sangue .*

La viscosità del sangue è ordinaria alle persone

di costituzione fredda, ed i di cui solidi peccano per difetto di elasticità. Ella è sovente preceduta ed accompagnata dai sintomi, che caratterizzano la savorra fredda delle prime strade. Il colore della pelle diviene insensibilmente cattivo; quello del volto è di un pallido che volge al giallo; la saliva è vischiosa; le orine spumose, spesso con sedimento bianco catarroso; il vigore del corpo diminuisce, e lo spirito s'intormentisce ad un colpo forte. Quelli di sangue viscido sono pigri, pesanti, freddi e soggetti ad avere nel risvegliarli delle spoffatezze che non si dissipano se non a poco a poco col favore dell'azione e di qualche esercizio; il loro sangue è grossolano e mal depurato; la parte mucosa che vi domina, ed i principj terrei tartarei e salini sono mal lavorati. La diminuzione delle principali escrezioni, l'adunamento delle materie tartaree e saline, i frequenti risentimenti di fredda savorra nelle prime vie, la cachessia, l'inzuppamento delle glandole, l'ostruzione delle viscere, le malattie cutanee ed altre malattie croniche, sono la comune conseguenza della vischiosità del sangue.

Coloro che ne sono affetti, devono nutrirsi di carni bianche, come pure di frutti ed erbaggi raccomandati pei regolamenti descritti sotto le lettere A. e B.; eviteranno la replezione: masticheranno a dovere le carni, e beranno buon vin bianco vecchio, leggiermente annacquato, e cercando di passare la loro vita in un clima secco e caldo.

Rispetto ai rimedj, si purgheranno ogni otto dì col decotto lassativo N.º 31.; prenderanno negl'intervali delle purghe l'elettuario N.º 52., ed immediatamente dopo, i brodi amari N.º 10. Per assicurare in seguito la loro guarigione, prenderanno per un considerevol tempo l'elisire bilioso N.º 57., esercitandosi altrettanto che potranno sopportare senza



indebolirsi. Se finalmente, dopo aver preso per qualche tempo quest' ultimo rimedio, i sintomi di un sangue viscido non sono dissipati ancora, si ricorrerà alle acque termali, dissolventi, attenuative degli umori, leggermente purgative: monteranno giornalmente a cavallo a stomaco vuoto, ed useranno di una generale fregagione mattina e sera.

*Della flogistica densità, o condensamento caldo della massa del sangue.*

Il temperamento caldo e secco, l' eccesso di elasticità nei solidi, non che la favorra calda delle prime vie dispongono al condensamento caldo del sangue. L' uso degli alimenti riscaldanti ed aromatici, le veglie, l' astinenza dalle bevande acquose, l' uso dei liquori spiritosi, i travaglji e gli esercizi che muovono molta traspirazione, ne sono le cagioni ordinarie.

Il condensamento caldo del sangue si riconosce dal calore della pelle, dalla durezza del polso e dai diversi sintomi, che dichiarano l' eccesso di elasticità nei solidi.

Le parti rosse della massa del sangue abbondano più che non dovrebbero; la sierosità manca; il sangue si coagula prontamente nella mestola. Quando l' inspessimento è flogistico, a misura che il sangue si raffredda, si cuopre di una tela o cotena biancastra che volge al grigio od al verde e di consistenza tenace. Questo inspessimento dispone all' infiammazione del sangue, all' acrimonia calda, ai reumatismi gottosi, come anche ai mali infiammatorj ed acuti.

Vi si rimedierà col regolamento e rimedj indicati per l' eccessiva elasticità dei solidi, aggiugnendo, all' emulsioni raccomandate, due grani di nitro per



ogni tazza; e l'acqua d'orzo sarà ridotta in giulebbe coll'osimele semplice o col siroppo d'aceto (a).

*Della tenacità atrabile della massa del sangue.*

I segni della tenacità atrabile del sangue sono i medesimi di quelli che indicano la favorra atrabile. Cotal vizio nelle prime strade precede ed accompagna il condensamento atrabile del sangue.

I principj che lo costituiscono, ritengono l'aspetto di una bile resinosa ed acre; ed i sintomi dei vapori e della malincolia nera, che vi sono congiunti, indicano, a qual grado è arrivato.

Si rimedierà immediatamente alla favorra atrabile coi rimedj da noi indicati; si prenderà in seguito quindici bagni domestici, beendo per sei settimane il siero di latte chiarito; poi le acque minerali ferruginee e fredde. Il malato cercherà di distrarsi; cavalcherà soventi; e s'è disposto alle morroidi, cercherà di farle gettar sangue coi rimedj raccomandati per la cura delle morroidi. Dacchè sarà ristabilito, manterrà libero il ventre colla polvere di cremore di tartaro N.º 175.; e dacchè saranno sbarazzate le prime strade, prenderà il siero di latte in primavera ed in autunno. Nella state userà frequenti bagni tiepidi domestici e le acque marziali fredde lassative.

---

(a) Gli osimele, ed i sciloppi si uniscono alle bevande in sufficiente quantità, secondo le diverse indicazioni.

L'osimele semplice è composto con once otto di mele bianco, ed once quattro d'aceto bianco: cuocesi a lento fuoco a consistenza di sciloppo: al primo bollire se ne leva la schiuma, e si ritira.

Il siroppo d'aceto è fatto con sei libbre d'aceto bianco feltrato, ed undici libbre di zucchero, cotti a lento fuoco;

Gli altri sciloppi semplici sono quasi tutti composti con una quantità d'acqua qualunque, il doppio del suo peso di zucchero fino, colla giunta della pianta, o frutto, da cui ne prende poi il nome: *Il Traduttore.*

## DEI VIZJ DELLA MASSA DEI FLUIDI

*Difficili a conoscersi dapprincipio, e che degenerano in cacochimia.*

**Q**Uando lunghe malattie, un cattivo metodo di vivere, cattive digestioni, hanno alterato la massa dei fluidi, le secrezioni, l'escrezioni ec. in generale o più particolarmente l'una o l'altra, al segno che le funzioni dell'economia animale malamente si eseguiscano; che la faccia si scolora, e che si manifestano sintomi indicanti la cattiva consistenza ed acrimonia dei fluidi; questo stato è chiamato cacochimia. Siccome non si è ancora parlato della mala qualità degli umori bianchi e delle acrimonie del sangue, egl'importa di quì farne parola, per instruire il lettore a distinguere le cagioni della cacochimia, ed a combattere efficacemente un male molto conosciuto, il quale è la sorgente di molti altri.

*Dei sintomi generali dell'acrimonia del sangue.*

I sintomi generali indicanti l'acrimonia della massa umorale, sono sensi di bruciore, di pizzicore, di pungimento, d'inquietudine che si risentono nelle diverse parti del corpo. Il sudore, le orine, e le lagrime pungono ed abbruciano. Le flussioni acri, le differenti pulsazioni, eruzioni e malattie della pelle, sono altrettanti indicj, i quali assicurano l'acrimonia della massa generale dei fluidi o della linfa in particolare. Quantunque vi siano più specie d'acrimonia, differenti più o meno le une dalle altre, egli basta nella pratica di distinguere quelle del sangue, che sono spontanee, e che si contraggono insensibilmente con un metodo di vivere opposto al  
tem-

temperamento , in acrimonie calde , fredde , muriatriche o false , ed in acrimonie scorbutiche .

*Dell' acrimonia fredda , inerte .*

Il temperamento freddo ed umido , la favorra fredda delle prime strade , come pure la viscosità del sangue , dispongono all'acrimonia inerte . Gli alimenti grossolani di qualità acida , aspra , astringente , come pure quelli terrei e farinosi , indigestibili , e la diminuzione dell' escrezioni , sono le cagioni che la producono . I fermenti che costituiscono quest' acrimonia , sono sali e principj grossolani uniti a viscosità . Si conosce che questa specie d'acrimonia domina nella massa dei fluidi , allor quando dopo avere sofferto della favorra fredda nelle prime strade , si prova alcuno dei sintomi , che indicano l'acrimonia del sangue in generale .

Le persone che ne sono incomodate , dimagran , perdono l'appetito , divengono pallide e fredde ; il sudore e gli escrementi hanno un odore acido , ed alcun poco le orine , le quali sono anche crude , chiare , spumose ; e quand' esse sono cariche , locchè succede comunemente dopo essersi esercitato , depongono un sedimento biancastro , e catarroso .

L'acrimonia fredda dispone alla renella , al reumatismo , all'inzuppamento delle glandole , alle serpigini superficiali con croste bianche , mucose , o secche e farinose : dispone pure all' ostruzione delle viscere del ventre inferiore , all' ipocondria , ed a diversi altri mali cronici .

Con tale indisposizione del sangue , gli acri si trovano strettamente uniti al viscido , e non si possono raggiungerli , correggerli ed evacuarli , se non dopo avere spezzati e divisi i loro legami : Non si può arrivar meglio a ciò ottenere , che coi bagni



naturalmente caldi, e colla bevanda delle acque minerali fondenti, e leggermente purgative, riportate sotto il N.° 3. Si nutrisce con carni bianche e cogli erbaggi del regolamento indicato sotto le lettere A. e C.: si berà ai pasti buon vin vecchio ed annacquato; e puossi sostituire ai sudetti bagni, quelli N.° 1., i quali terminati, si purgherà ogni otto giorni col decotto lassativo N.° 31. Frammezzo alle purgazioni, si prenderanno a digiuno i brodi amari N.° 10., e nel coricarsi a letto, un presa delle pillole di sapone N.° 159., esercitandosi molto e continuando questo regolamento per più settimane. Nel caso che i sintomi di cotale acrimonia non si dissipassero, si darà per lo spazio di un mese, il decotto dei legni coll' acqua di calce N.° 26. Per distruggere interamente gli acri sviluppati colla distruzione delle vischiosità, converranno per alcune settimane le acque acidette ferruginee nominate sotto il N.° 3.; o qualche altro diluente, il quale non sia nè rilassante, nè rinfrescante, e che passi bene; esercitandosi molto e facendo fregagione mattina e sera generale con una flanella.

*Dell' acrimonia calda biliosa.*

Il temperamento caldo e bilioso dispone all' acrimonia biliosa. Ella è prodotta dagli alimenti grassi, fucosi, aromatici, riscaldanti, o di qualità alcalina.

I fermenti che costituiscono l' acrimonia calda, sono biliosi, alcalescenti, o tendenti alla corruzione.

La massa dei fluidi pecca comunemente di quest' acrimonia, quando i sintomi generali dell' acrimonia del sangue sono stati preceduti od accompagnati dalla favorra calda delle prime strade. Le persone che ne sono incomodate, ripugnano la carne ed amano gli alimenti acidi: dimagrano, sono riscaldate, fog-



gette ad avere la bocca secca: il loro sonno è inquieto, le orine rosse assai odorose; il polso è frequente, vivo, lo spirito altiero; il calore e tutto ciò che riscalda, accresce sul momento l'azione e l'impressione degli acri fermenti.

Cotal vizio del sangue dispone ai movimenti febbrili, all'espulsioni, alle serpigini che si estendono, s'infiammano, e gettano acre sierosità, che trafora la pelle; e se dessa è considerabile, allo scorbutico caldo, al prurito al podice, ed al perineo, il quale diviene mordace e tramanda un'acqua saniosa. Quest'acrimonia dispone ancora alle febbri infiammatorie e putride.

Si provvede immediatamente all'abbondanza soverchia del sangue col salasso, cogli erbaggi, e i cibi farinosi, i frutti acidetti, e le carni bianche, e stando ai regolamenti indicati sotto le lettere D. ed F.: si deve bere molt'acqua d'orzo resa acida col siroppo d'aceto, limonea, giulebbi composti coll'acqua e siroppo d'agresto, di melagranato o colla conserva di ribes.

Rispetto ai rimedj, si comincia dopo un premezzo salasso, a prendere per più giorni il siero di latte tamarindato N.º 148. affine di sbarazzare le prime strade; dopo di che si prende tutte le mattine due libbre di siero vaccino puro o di latte spannato, da cui si sarà perfettamente tratto il butirro; oppure i brodi rinfrescanti N.º 14. ; ed ogni due giorni il bagno d'acqua crusca tiepida. Bisognerà continuare questo regolamento, sino a che i sintomi dell'acrimonia calda siano dissipati. Allora si cercherà di correggere il sangue coll'uso di un'acqua minerale leggiera e rinfrescante.

*Dell' acrimonia muriatica o falsa.*

La tenacità del sangue, la soppressione della traspirazione e dell' altre principali escrezioni, dispongono a quest' acrimonia, come l' uso del cacio, delle carni, dei pesci e degli altri alimenti salsi lo producono prontamente nelle persone di vita sedentaria.

Si potrà conchiudere, che quest' acrimonia è sparsa nella massa umorale; dacchè i sintomi generali dell' acrimonia succedono alle cagioni indicate. La saliva, il sudore, le lagrime sono salate; le urine sono inodore, e quelle del mattino si trovano soventi coperte da una pellicola variegata, formata dalla unione delle particelle saline colle vischiose.

Le persone incomodate da questo vizio del sangue sono alterate e soggette a calori interni, che non si manifestano esternamente: dimagrano, quantunque l' appetito e la digestione sieno buoni: soffrono ardori d' orina, espulsioni biancastre, vescicolari e piene di un' acqua salata, o veramente asfe od erpeti superficiali. A misura che quest' acrimonia cresce, a cotali sintomi succedono insensibilmente quelli caratteristici dell' acrimonia scorbutica, ed un cotal vizio d' umori produce lo scorbuto muriatico o falso.

Per rimediarvi, convengono gli alimenti più dolci e i più leggieri del metodo prescritto sotto la lettera A., salando meno che sia possibile i cibi da usarsi; si prende tutte le mattine un bagno tiepido. Per dividere e scomporre nel medesimo tempo i sali muriatici, dassi la mattina, di tre in tre ore, quattro o sei once della second' acqua di calce N.º 38. imbianchita col latte: si continua per sei settimane l' uso di siffatti rimedj, avvertendo di purgarsi al

principio ed al fine della cura colla polvere N.º 186., dopo di che i brodi antiscorbutici N.º 9., non lasciando di bere molt' acqua pura e di esercitarsi per mantenere un' abbondante traspirazione. Si persevererà in così fatta maniera, sino a che gli accidenti e i sintomi di un cotal vizio del sangue sieno spariti.

*Dell' acrimonia scorbutica.*

Quando le acrimonie del sangue, delle quali si è parlato, si esaltano e s'inaspriscono al segno, che il sistema dei solidi, e tutta l'economia del corpo ne sono sensibilmente alterati, queste acrimonie sono degenerate in acrimonia scorbutica. Insensibilmente si diviene pigro; l'estremità ed i lombi sono incomodati da una specie di dolore simile a quello che produce la fatica. Gli altri sintomi variano giusta la varia specie dello scorbutico: i più ordinarj sono il languore delle funzioni del corpo, i frequenti insulti di dolori vaghi, ed i pungimenti, accresciuti dal calore del letto. I malati nello svegliarsi si trovano rotti e stanchi; le urine depongono spesso un sedimento mattonoso, e sono coperte d'una pelli-cola mucosa e colorata.

I fomiti scorbutici si sviluppano sempre più: sopravvengono delle macchie di un rosso che volge all'azzurro, le quali appajono e spariscono, ed invadano più comunemente le braccia e le gambe: le gengive si gonfiano e s'infiammano; si esulcerano e si consumano a poco a poco, al segno che i denti scarnati e vacillanti s'intarlano e rendono l'alito puzzolente. I malati soggiacciono a sputar sangue, a soffrire dolori reumatici; le macchie scorbutiche si moltiplicano, diventano permanenti, nerastre; e quando il male ha preso possesso, vengono le varici



sotto la lingua, l'emorragie, l'eruzioni cutanee facili a degenerare in ulcere roficchianti, puzzolente ed inclinevoli a gangrenarsi. A questi sintomi si uniscono insulti febbrili più o meno vivi, come pure altri diversi accidenti dannosi e mortali.

Siccome i fomiri scorbutici sono di natura diversa, per arrivare a distruggerli, si distinguerà bene la specie dello scorbutico, da cui sarà incomodato l'ammalato. A questo effetto si osserverà, se sono i sintomi dell'acrimonia calda del sangue, o quelli dell'acrimonia fredda o falsa, che hanno preceduto lo scorbutico.

L'umore scorbutico congiunto alla prima di cotali acrimonie, produce lo scorbutico caldo; congiunto alla seconda, genera lo scorbutico freddo; unito alla terza, forma lo scorbutico falso.

Rispetto allo scorbutico caldo, egli è comune alle persone che fanno lunghi viaggi nei climi caldi; ai soldati ed ai marinari, i quali sono costretti a bere le acque corrotte, ed a vivere di alimenti di qualità putrida ed alcalescente.

I progressi di tale specie di scorbutico sono pronti; ma si guariscono facilmente col regolamento e coi suffeguenti medicamenti.

Si osserverà il regolamento della lettera D.: si purgherà ogni otto giorni coll'elettuario lenitivo N.º 51.; si dà nell'intervallo delle purghe, il siero di latte antiscorbutico N.º 146., in mancanza del quale, molta limonea od acqua d'orzo raddolcita coll'offimele semplice, e l'elisire di vitriuolo composto N.º 59. Se le gengive sono viziate, si lava la bocca due volte al giorno col gargarismo antiscorbutico refrigerante N.º 34.; del quale potrassi servire egualmente per bagnare le macchie scorbutiche.

Si continua un tale regolamento in luogo



d'aria salubre fino a che i sintomi di tale specie di scorbutico sieno dissipati. Quei malati che potranno prendere le acque minerali acidette, ne uferanno per assicurare la loro guarigione.

Rispetto allo scorbutico freddo, egli è ordinario alle persone, le quali abitano in luoghi sotterranei, umidi e pantanosi, come per quelle di stomaco infievolito, sia per l'uso smoderato del thè o per altre ~~confimili~~ bevande acquose. Ella è ancor propria tale malattia dei miserabili astretti alla vita sedentaria, o che si nutriscono con cibi grossolani, indigestibili, e farinosi.

Si osserverà, per lo scorbutico freddo, il metodo prescritto sotto la lettera C. purgandosi ogni sei giorni colle pillole purgative N.º 156.; e la mattina, nell' interspazio delle purghe, di due in due ore, 20. gocce dell' elisir attenuante N.º 56., e nel coricarsi, due dramme della polvere digestiva N.º 176. Si continua un tale regolamento, fino a che i principali accidenti cominciano a sminuire. In allora conviene il regolamento prescritto sotto le lettere B. ed A. La bevanda ordinaria farà vino bianco, in cui vi sia stato infuso il ranuncolo silvestre grattugiato, in proporzione di un' oncia per due libbre di vino, e contemporaneamente l'elettuario antiscorbutico N.º 46., rimediando ai vizj delle gengive col gargarismo antiscorbutico spiritoso N.º 85.: si assicurerà la guarigione con un buon metodo di vivere, coll' esercizio del corpo e coll' uso dell' elettuario marziale N.º 52., e si abiterà in aria sana ed in una stanza asciutta.

Rispetto allo scorbutico falso e muriatico si distingue, si tratta, e si guarisce nel medesimo modo, che l'acrimonia muriatica; osservando sempre di prolungare, giusta il bisogno, i mezzi indicati, fino a che i principali sintomi sieno tolti

In allora si userà, come anche sul finire della cura della specie fredda, per uno spazio di tempo necessario, il vino antiscorbutico N. 221., e nell'abbandonare questo rimedio, si getterà alla dieta lattea per un sufficiente tempo, affine di rinnovare la massa dei fluidi.

Gli scorbutici deboli e stenuati cominceranno dal prendere una dramma di conserva di coclearia soprabbevendo due tazze di latte, il quale, con pane quanto basta, servirà loro di nutrimento. Continueranno un cotal metodo fino a che siano nello stato di fare la cura quì sopra enunciata.

## DEI VIZJ GENERALI DELLA LINF.

### *Dell' inspessimento della linfa.*

**I**L temperamento freddo e flemmatico, la mancanza elasticità dei solidi, l'ammasso degli umori analoghi alla favorra fredda nelle prime strade, e l'inspessimento freddo del sangue, dispongono a questa malattia. Un lungo uso dei latticinj, gli alimenti farinosi, vischiosi, pastosi o tenaci, e glutinosi, le acque dure e rozze, la mancanza dell'esercizio, il gran freddo e la soppressa traspirazione sono le cagioni che la producono.

Si conoscerà, che ciò è la linfa, la quale è principalmente condensata, quando i sintomi del freddo condensamento del sangue faranno accompagnati da gonfiamento od inzuppamento di qualche parte del corpo, dove vi siano molte glandole, siccome il collo e sotto al mento. Cotesto vizio di linfa non è equivoco, allorchè l'ammalato è stato annodato nella sua infanzia, che è soggetto alle flussioni od ai tumori freddi, o ch'egli è affetto da' sintomi indicanti ostruzione del mesenterio.

Il semplice condensamento della linfa, dispone principalmente ai catarri e reumi putuitosi, all'inzuppamento delle glandole linfatiche, ai tubercoli polmonali, alla tenacità dell'umor bronchiale, a quello delle glandole gutturali, e bronchiali, al gozzo ec. Siccome questo vizio della linfa produce la scarfezza della traspirazione e delle altre escrescenze, è in seguito accompagnato dall'acrimonia della massa linfatica; e s'è il malato ha delle disposizioni alla gotta, alla renella, alle scrofole ec.; questi fomiiti essendo esaltati dalla linfa acrimoniosa, cotali malattie si manifestano più prontamente.

La semplice tenacità della linfa è molto più ordinaria ai fanciulli che alle persone adulte: Queste vi rimedieranno col regolamento e rimedj indicati pel freddo condensamento del sangue, evitando il freddo, l'umidità, l'inazione, e si vestiranno grevemente.

Rispetto ai fanciulli si farà loro prendere il latte di donna, di asina o di capra, quest'ultimo tagliato con metà d'acqua di Selz. Mangeranno poco per una volta; si nutriranno con brodi fatti di vecchio pollo magro, col quale si farà zuppa, o panate con pane ben fermentato, ben cotto e raffermo: si concederà di succhiare soltanto qualche po' di carne bianca; si darà un uovo fresco, un biscotto, una mela appivola, od una pera buoncristiana cotta sotto le ceneri e con un po' di zucchero e di cannella. Si potrà dar loro altri consimili alimenti. Se sono in età di poter bere vino, se ne darà al fine del pranzo, qualche poco, e del migliore, avendo somma attenzione alla proprietà del corpo, a collocarli in una stanza asciutta, a vestirli con abiti gravi ben asciutti e perfumati con bacche di ginepro o con carabe. Si faranno fregagioni generali mattina e sera con flanella riscaldata e perfumata degli stessi



vapori che gli abiti, concedendo tutta specie di esercizio proprio della loro età . Rispetto ai rimedj , si purgheranno ogni dieci giorni con siroppo di rabarbaro (a), e negl' intervalli , dieci gocce circa dell' elisir N.º 56. in un cucchiajo da caffè di siroppo di capelvenere ; e dacchè si può credere , che la linfa è assottigliata , per assicurare la guarigione , si prescrive la tintura di Marte N.º 201. Si bagnano due volte la settimana in un' acqua un po' più calda che tiepida , in cui si avrà fatto cuocere per un poco alcuni manipoli di origano o di serpillio , continuandoli per lo spazio di sei settimane . La continuazione del regolamento , delle precauzioni e degli esercizi raccomandati , presi in un' aria sana , guerentirà dal ritorno della tenacità della linfa , la quale venendo ad ingorgare le glandole , nelle quali si lavorano i fluidi i più sottili , e si prepara e faffi l' opera importante di tutte le secrezioni , diverrà la sorgente di molte calamità e di molte malattie .

*Dell' acrimonia della linfa .*

I sintomi che caratterizzano l' acrimonia della linfa , variano a ragguaglio della natura ed abbondanza delle parti acri , che vi sono sparfe , e del grado di tenacità , di cui la massa linfatica è vizziata nel medesimo tempo .

Le flussioni acri ed ostinate , l' ostruzione delle glandole linfatiche , gli erpeti che dipendono dall'

(a) Il siroppo di rabarbaro , ossia siroppo di cicoria col rabarbaro si compone come segue .

Recipe di radice di cicoria , once due e mezzo : si fanno cuocere in once otto d' acqua fontana : alla colatura s' infonde per una notte , rabarbaro minutamente tagliuzzato , once una : sale di tartaro , scropoli uno : si cola , e si aggiugne zucchero bianco , once ventidue : si cola di nuovo : *Il Tr.*



ostruzione delle glandole miliari, accompagnati da gemitio; la scabbia saniosa, la tosse secca e diversi movimenti convulsivi, e spasmodoci, sono i mali più ordinarij, ch'ella produce. Cotal vizio dispone al reumatismo gottofo, alla micrania, alle febbri catarrali, ed esantematiche senza infiammazione. Contribuisce come già è stato detto, non solo a moltiplicare, ma ad esaltare potentemente i fomiti gottofi, scrofolosi e gangrenosi, ed a risvegliare la disposizione, che si ha per questi mali.

Quando cotali sintomi di acrimonia nascono, o sono chiaramente complicati con quelli dell'una o dell'altra acrimonia del sangue, di cui si è parlato, si conchiuderà che i medesimi acri dominanti nel sangue, signoreggiano ancora nella linfa: S'impiegheranno in tali casi, i diversi regolamenti raccomandati per correggere le varie acrimonie del sangue. Dacchè i principali sintomi faranno tolti, si raddolcirà la linfa col latte di asina, o di vacca, tagliato con eguale porzione di decotto di china dolce N.º 35., di cui se ne darà mattina e sera una dose sopportabile; e si cercherà di dormire e di traspirare in seguito alla prima dose della mattina.

Quando al contrario i sintomi indicanti l'acrimonia della linfa, non sono chiaramente complicati con quella dell'una o dell'altra acrimonia del sangue, si troverà per lo più, che la massa linfatica è viziata dai fomiti, i di cui germi derivano dai genitori, o dalla nutrice del malato, o guadagnati per contagio. Tali diverse acrimonie sono o complicate col condensamento generale della massa linfatica, od esistono, senza che vi sia nello stesso tempo una manifesta tenacità.

L'acrimonia senza tenacità, è comune alle persone di costituzione sanguigna e delicata, come pure a quelle che peccano di viziosa sottigliezza del san-

gue. Le flussioni acri sui denti, le ottalmie secche, le affezioni risipelatose, la tosse con sputo di umore sottile od acre, i reumi del cervello accompagnati da una fonte di fluidi acri, il prurito, i rimordimenti senza eruzione alla pelle, gli erpeti volanti, fecchi o gettanti un'acqua acre, quando sono irritati, le inquietudini nel sonno, gl'insulti del granchio (*b*), gli spasimi recorrenti senza una cagione manifesta, sono i più comuni accidenti, che dichiarano esservi un'acrimonia sottile nella linfa. La mancanza dei segni che ne indicano la tenacità, compie di assicurare, che l'acrimonia non è complicata col condensamento. Così vedesi soventi questi diversi sintomi d'acrimonia cessare dopo il vajuolo, la rosalia, ed altre considerevoli eruzioni cutanee; qualche volta ancora dopo la gotta, la febbre intermittente, le periodiche evacuazioni, ec.

Quando l'acrimonia della linfa è accompagnata dai sintomi indicanti tenacità di questi liquidi, i fomi che ne sono involuppati, irritano meno il genere nervoso, e viziano tanto più la pelle e la parte glandolosa. La scabbia, le umide serpigini, la tigna, le flussioni sierose, la tumidezza delle glandole, i tumori nella testa o nel collo od altri indolenti mali di gola abituali, provvenienti dal gonfiamento delle amigdale, i frequenti accessi di raffreddore, con spettorazione di flemme viscide ed acri, la tenacità dell'umore bronchiale, l'asma umido, i reumatismi ostinati, ed i fiori bianchi, sono altrettante malattie provenienti da questa sorgente, ed indicanti un cotal vizio complicato della linfa. Le persone, i di cui genitori o nutrice sono stati mal guariti da qualche malattia venerea, o che avranno

---

(*b*) Il granchio è quell'incomodo stiramento de' muscoli delle gambe e dei piedi, che nasce o per sintomo di malattia, o per mala situazione delle suddette parti: *Al Tr.*

il più leggiere sospetto di essere viziati di discrasia scrofolosa , cancerosa , o gottosa , capiranno quanto importa loro di nulla omettere per guerentirsi dall' acrimoniosa tenacità della massa linfatica .

Quando l' acrimonia della linfa è leggiere e semplice , si comincia dallo svuotare i vasi col salasso ; e nel caso che gli acri affettino gli occhi o qualche altra parte , da dove convenga fare una derivazione , si preferiscono al salasso , le ventose a taglio . Si purga in seguito colla pozione lassativa N.º 166. ; dappoi si dà per quindici giorni alla mattina al sortire da letto , il bagno tiepido N.º 2. , od un bagno d'acqua-crusca imbianchita col latte ; finalmente si prescrive il siero di latte per sei settimane , e nell' andare a coricarsi , la polvere di magnesia N.º 181.

Durante tutto il tempo dell' uso di siffatti rimedj , si obbliga al regolamento prescritto sotto la lettera F. , dando a bere fra i pasti il decotto N.º 25. ; e se i sintomi dell' acrimonia della massa linfatica sieno numerosi ed invecchiati , si replica ogni otto giorni la purga , ed immediatamente dopo cotali rimedj si esibisce il latte di asina , od in sua mancanza quello di vacca , unito ad egual parte del decotto N.º 35. , fatto senza regolizia . La dose della misura sarà circa una libbra mattina e sera da continuarsi per sei settimane . Con siffatti mezzi si guerentirà dai progressi e dalle conseguenze dell' acrimonia semplice , allorchè ancora sarà complicata con un principio di tenacità della massa linfatica .

Se cotal vizio fosse inveterato e ribelle , si conchiuderà che l' acrimonia è intimamente unita ad una tenacità difficile a sciogliersi . In questo caso , si farà succedere al corso dei suddetti rimedj un lungo uso di mezereon (c) , affine di ricondurre per questa

---

(c) Si adopera la scorza di mezereon , mettendo a macerare



strada la materia peccante . Per correggerla nel medesimo tempo , si darà per sei settimane , affine di depurare gli umori bianchi , le gocce N.º 93. , soprabbevendo sopra ciascuna presa , tre o quattro tazze del decotto di dulcamara N.º 27. Per consolidare la guarigione si porterà in luogo delle acque termali le più convenienti al caso per usarne di esse , od in loro vece , i bagni riferiti sotto il N.º 3. ; e se si manifestasse qualche vizio specifico , si ricorrerà alla cura indicata per questi mali . Siccome cotesti vizj cutanei che sono di lunga durata , viziano il tessuto della pelle , allorchè dopo aver corrotto la massa linfatica , rimarrà qualche affezione locale , s' impiegheranno i topici convenienti .

### *Della cachessia .*

Quando la cacochimia per le diverse alterazioni della massa dei fluidi , delle quali si è parlato , è arrivata al segno di cagionare una cattiva digestione , e che il chilo nutrice e malamente sostiene i solidi , la prima indisposizione che risulta da tale combinazione , chiamasi cachessia .

I sintomi della cachessia variano a proporzione del vizio , che domina nel sangue . Le persone che ne sono affette , perdono insensibilmente il loro colore . Il volto e la pelle impallidiscono od acquistano un colore giallognolo , che volge al verde ; le carni divengono molli e rilasciate ; gli occhi languidi ; il polso molle e cadente ; le urine crude ,

---

nell' aceto un pezzetto lungo un pollice , e largo sei linee circa : si applica al braccio , alla goscia , alle gambe , ritenuto con fascia adattata , regolandosi in seguito come col medicare il vescicante : la scorza della radice internamente presa sotto forma di decotto , diceasi uno specifico dei tosi venerei , e dei dolori osteocopi : *Il Tr.*



spumose o torbide; i malati sono pesanti ed oppressi. Durante il tempo della digestione, soggiacciono a sentire un tremore interno; ed il caldo monta loro alla faccia. Hanno rigurgiti e flatulenze incomode; l'esercizio li opprime; salendo, respirano con pena e con battito del cuore; sono indolenti, inclinati alla tristezza, al mal umore. La sera sono soggetti ad avere la caviglia dei piedi gonfiata e le palpebre tumide nello svegliarsi.

Quando la cachessia ha fatto progressi considerevoli, gl'infermi sono nauseati; non appetiscono che cattivi alimenti; le forze e l'abito del corpo diminuiscono giornalmente; divengono tumidi, e cadono in una febbre lenta. Le viscere del ventre inferiore si ostruiscono insensibilmente, e la cachessia porta seco l'idrope, la consunzione ec.

Quantunque questa malattia possa dipendere da più specie di savorre, e di umori cacochimi, siccome però sono comunemente la savorra fredda e la fredda tenacità della massa umorale, che la produce, il malato guarirà col mezzo del regolamento e rimedj, che indicheremo.

Userà gli alimenti più leggieri prescritti nei metodi sotto le lettere A. e C.: eviterà il latte e gli alimenti farinosi: si purgherà ogni otto giorni col decotto lassativo N.º 30.; e se avesse nausea o sintomi tali che indicassero uno stomaco sopraccaricato, prenderà innanzi la prima purga, la polvere vomitiva d'ipecacuana N.º 192. Nell'intervallo delle purghe, berà i brodi amari N.º 10., ed al fine dei pasti l'elisire viscerale N.º 58. Abiterà in un' aria secca e temperata; e se è possibile, in campagna, dove si getterà a tutta sorta d'esercizj, senza però troppo stancarsi; si farà fregagione generale mattina e sera con flanella perfumata di carabe o di bacche di ginepro, continuando l'uso di codesti rimedj, sino

a che comincia a riprendere colore e forza . Allora accrescerà i suoi esercizi ; monterà a cavallo , berà ai suoi pasti buon vino rosso un po' aspro mischiato coll' acqua o con avervi tuffato un pezzo d' acciaio arroventato ; e per consolidare la sua guarigione , prenderà l' elettuario N.° 54. o le acque minerali , ferrate , stoniachiche , siccome quelle di Spaa , ec. avvertendo di nutrirsi principalmente di carni arrostiti , succose e facili a smaltirsi .

Le deduzioni fin qui da noi fatte porranno il lettore attento e giudizioso nella cognizione dello stato fisico delle persone , per le quali potrebbe interessarsi . Saprà ciò che conviene fare , per mantenere la salute degl' individui ben costituiti ; a migliorare le complessioni che ne avranno bisogno ; a conoscere i primi disordini del corpo umano , ed i mezzi di arrestarne gli ulteriori progressi . Queste nozioni preliminari lo porranno in istato di rimontare alla sorgente del numero delle malattie , di rilevarne le affinità , e di comprenderne la coerenza e la condotta ragionata della cura . Queste sono le riunite considerazioni , le quali mi hanno spinto a dettagliare questi preliminari poco usati , e questi dettagli sui temperamenti , sui vizj primitivi dei solidi , dei fluidi , dello stomaco , ec. , affine d' insegnare a conoscere il fisico dell' uomo , a conservarlo in salute ed a migliorarlo , facendo riconoscere i principj di un qualunque disordine , ed i mezzi di prevenirne le conseguenze : oggetti che non sono meno preziosi dell' arte di guarire le malattie formate .

## DELLA FEBBRE IN GENERALE .

**L**A malattia la più frequente, e che fa il maggiore sterminio, è la febbre. I sintomi che la dichiarano più costantemente, sono un'agitazione frequente e non naturale del polso, accompagnata da calore, e da diversi disordini nell'economia del corpo. Gli altri accidenti più comuni, e che variano secondo la specie, e la violenza di questa malattia, sono l'abbattimento, la stanchezza, un mal essere generale, il brivido, la sete, una cattiva bocca, la svogliatezza, le nausea, l'imbarazzo agl' ipocondri, il vomito, la diarrea o la costipazione, i mali di testa, il sopore o la veglia, l'ardore e la secchezza della pelle od i sudori abbondanti, le ambascie, il delirio od il trasporto al cervello, le afte e i mali di gola, e diverse eruzioni sotto forma di vescichette, di chiazze o di bolle.

Si conosceranno le sorgenti del più gran numero di coteste malattie, quando si avrà letto ed esaminato attentamente ciò, che noi abbiamo detto a questo riguardo, parlando della cura delle diverse savorre delle prime vie e delle alterazioni della massa umorale. Senza obbligarci, nel trattare di ciò, a dotte nomenclature, a divisioni, e suddivisioni già date sulle febbri; e per non deviare intieramente dagl' introdotti costumi, noi tratteremo delle differenti febbri sulla classificazione generalmente adottata dai Medici.

Vi sono delle febbri di accesso, in cui il malato è senza febbre durante gl' intervalli di un accesso all' altro: queste si nominano intermittenti o febbri d'accesso. Quando durano sempre, in modo però ch' esse si calmano e si riaccendono alternativamente, si chiamano febbri continue remittenti. Quelle senza intermissione o remissione sino alla fine, sono chia-



mate febbri continue. Quando sono caratterizzate da eruzioni, diconsi febbri esantematiche ; e finalmente se sono poco sensibili, di lunga durata, e che a poco a poco consumano i malati, si nominano febbri lente od etiche.

Siccome egli è il numero e la violenza dei sintomi, che accompagnano la febbre, ciò che caratterizza la malattia, e ne predice il successo, si tratterà immediatamente dei varj accidenti famigliari ai febbricitanti, e dei mezzi di diminuirli, o s'egli è possibile, di dissiparli. Noi indicheremo in seguito i segni, che annunciano la guarigione, i sintomi che predicono un esito incerto, quelli che dichiarano più timore che speranza, e quelli finalmente di una morte prossima.

## DEI SINTOMI GENERALI DELLA FEBBRE .

### *Del brivido e del tremore .*

**P**ER abbreviare e diminuire il brivido, il malato sarà collocato a letto in una stanza temperata : si coprirà con panni caldi ma leggieri, berà spesso una tazza della tisana comune N.º 210. o thè leggiero e caldo. Se il brivido attacca più particolarmente il dorso o qualche altra parte, questa si coprirà con pannolini caldi, e s'egli è universale, lungo ed ostinato, si applicheranno sotto le ascelle e sotto i piedi, mattoni riscaldati e ravvolti in pannolino, o bottiglie di felce, o di stagno piene d'acqua calda per riscaldarle. Siccome i rimedj caldi, la triaca ec. sono pericolosi in queste malattie, sopra tutto in quelle, nelle quali non se ne conosce ancora il carattere, bisognerà astenersene intieramente, fino a che rimarrà della incertezza su questo proposito. Che il brivido sia o non sia accompagnato da tremore e dallo stridore dei denti, s'impiegherà fino a che cessa, se non ciò che si è detto. Il malato asterrassi dal bere, s'ei trova che la bevanda accresce l'oppressione.



Quando sarà deciso, che la febbre è intermittente, il febricitante farà bene di coricarsi in un letto riscaldato , un pajo d'ore prima del cominciare del brivido ; e potrà prevenire anche l'accesso , se all'avvicinarsi del brivido , può provocare un dolce sudore . A tal effetto, due ore innanzi l'accesso, prenderà due once di rob di sambuco (a), od anche meglio , una doppia dose della mestura diaforetica N.º 125., dopo di che berà più tazze d'infusione di cardo benedetto . Se arriva a traspirare per le prime ore del parossismo, manterrà l'umidore coll'infusione dei fiori di sambuco . Se il malato suda difficilmente , si rinoveranno i mattoni o le bocce di felce , coi quali mezzi siffatte malattie ed in particolare le febbri terzane che sopravvengono in conseguenza della soppressa traspirazione, saranno soventi terminate . Se non pertanto non cessano, siccome il calore eguaglia ordinariamente il brivido, coll'indebolirlo, si accorcerà il parossismo ; e siccome le poche persone che soccombono per una febbre d'accesso, muojono durante il freddo, non si trascurerà di usare le precauzioni indicate ogni volta, che il freddo sarà non solamente lungo e considerevole, ma accompagnato da molta oppressione .

*Dell' oppressione e delle ambasce .*

Quando in una febbre intermittente , l'oppressione , e le ambasce insorgeranno durante il bri-

D 2

---

(a) I robbi , chiamati anche sape, sono i sughi di alcuni frutti inspessiti da se al sole , od al fuoco , perchè si pollino conservare .

Il rob di sambuco si fa col cogliere le coccole di sambuco un poco innanzi la loro perfetta maturità : si schiacciano , e si tengono a macerare per 24. ore : si spremono con torchio : si pone questo sugo in un bacino con alcuni bianchi d'uovo ; si sbattono fortemente , e si pongono sul fuoco a bollire per qualche tempo ; si feltra, e si lascia inspessire sopra il fuoco a consistenza di densa poltiglia : *Il Tr.*

vido, vi si rimedierà coi mezzi indicati per uniliare il brivido; e l'uno e l'altro di cotali accidenti si dissiperanno in proporzione del maggior calore che ne verrà in seguito. Quando l'oppressione e le ambascie nasceranno in una febbre continua, si osserverà, se il malato soffre di dolore agl' ipocondrij, esarcerbandosi al tatto; o s' ei prova soltanto un sentimento di pienezza allo stomaco, accompagnato da rigurgiti, e da nausea.

Siccome in quest' ultimo caso, codesti accidenti dipendono dalla pienezza delle prime strade, si dissiperanno col prendere la pozione emetico-lassativa N.º 165.; e questa nell' intervallo dei parossismi, se la febbre è intermittente. S' ella è una febbre continua remittente, si prenderà l'emetico medesimo fra le remittenze stesse; e se dessa è continua e senza remittenza, si darà al più presto lo stesso rimedio, ammeno che il malato non sia incomodato da dolore vivo agl' ipocondrij, il quale se s' inasprisse al tatto, dinoterebbe che l'oppressione e l'ambascia dipendono da un principio infiammatorio. In tal caso si farà precedere uno o due salassi al braccio di 10. once per ciascheduno: il malato berà molto siero di latte, la tisana comune N.º 210., o quella d' orzo N.º 213. Si applicherà sul sito dolente, una vescica piena per metà di latte caldo; e di sei in sei ore, il lavativo domestico N.º 108.; se, dopo la intiera dissipazione di codesto dolore, vi restasse indicazione per evacuare per dissopra, ciò farassi colla polvere vomitiva d' ipecacuana N.º 192.; e s' egli è indicato di evacuare per dissotto, si eseguirà colla pozione N.º 168. Finalmente se vi fosse luogo a temere di una febbre esantematica, l'oppressione e gli ansamenti potrebbero dipendere dalla congestione del fomite agl' ipocondrij. In tal caso converrà favorire questa eruzione come dirassi in appresso.

*Dei rutti , e venti , della svogliatezza , delle nausea ,  
e dei mali di testa , familiari ai febbricitanti ,  
ed originarj dalle prime vie .*

S' egli succede che nel principio di una febbre, il malato si trova con uno o più di cotali accidenti, essi dipendono comunemente da pienezza dello stomaco o del ventre inferiore, alla quale è impossibile di rimediarvi immediatamente.

Se la lingua è imbrattata, e che'l malato senta unicamente, e principalmente della pienezza allo stomaco, o ch'egli abbia dei rutti o nausea considerabili, non si ometterà di schiuderla colla polvere emetica N.º 178. Ma se il basso ventre fosse nel medesimo tempo pieno e teso, o ch'egli fosse costipato, si preferirà il lavativo N.º 111., ed in seguito la pozione emetico-lassativa N.º 165. In mancanza di questi segni indicanti pienezza dello stomaco, si purgherà reiteratamente colla pozione lassativa N.º 166.

Rispetto alle nausea, che nascono nel corso delle febbri infiammatorie ed esantematiche, siccom'elieno sono ordinariamente, come già è stato detto, prodotte da un principio d'infiammazione, o da flogistica congestione di fermento esantematico dello stomaco o dell'addomine; allorchè nel medesimo tempo, la forcella dello stomaco, o gl'ipocondrij saranno molestati da un dolore che col tatto accrescesse; si userà immediatamente ciò che è stato indicato per l'oppressione e le ambascie, che dipendono da un principio d'infiammazione: se l'infiammazione fosse complicata colla pienezza delle prime strade, si differirà di purgar l'ammalato, sino che i segni dell'infiammazione sieno tolti o diminuiti al segno, che non si possa arrischiare di accrescerli coll'emetico o



colla purga. Dopo tali evacuazioni, si daranno per precauzione le gocce anodine N.º 89.

*Del calore, dell' alterazione, della veglia, dei mali di testa e di gola sopravvenienti alla febbre.*

Affine di mitigare l'ardore ed il calore della febbre, si rinoverà l'aria con precauzione: si adacquerà la stanza con acqua fredda, e se ciò non bastasse, si porranno in un secchio d'acqua, rinfrescato con un pugillo di nitro o di carboni pesti, alcune frondi di sambuco o di salice, affine di spanderè nella stanza il vapore acquoso e fresco che queste piante esalano. Si terranno aperte le cortine del letto; il malato sarà posto sopra materasso di crine, che potrà coprire ancora con una pelle liscia, affine di procurare la più possibile freschezza, e le sue coperte faranno leggiere. Si fomenteranno le gambe col fomento rinfrescante N.º 81. e si bagneranno spesso le tempie, il disotto del mento, le mani e le giunture, ossia i polsi delle mani con acqua tiepida mischiata con un quarto d'aceto. Si darà per ciascuna volta che beve, alcuni grani di nitro purificato da unirsi alla medesima bevanda, la quale dovrà essere tiepida, e presa spesso, ma poco per volta. Allorchè l'alterazione sarà grandissima, si preferirà una limonea leggiere, ed i giulebbi acidetti, raccomandati al regolamento prescritto sotto la lettera D. S' inacidiranno le tisane con un pajo di gocce di spirito di zolfo o di vitriuolo (b).

---

(b) Lo spirito di zolfo non è altro che lo zolfo abbruciato in un apparecchio di vasi adattati. I vapori, che ne esalano, si riuniscono, si condensano, e formano il così detto spirito di zolfo: A questo rimedio infinitamente dispiacevole, si suole dai Medici sostituire lo spirito di zolfo volatile di *Beghine*, fatto con once otto di



Nel caso che il malato non possa sopportare queste bevande, prenderà la tisana comune N.º 210., ed un'orzata leggiere, e gli si applicherà mattina e sera un cristiero d'acqua-crusca con entro disciolte due dramme di nitro. Inoltre per sollevarsi dall'alterazione, e rinfrescarsi la bocca, egli succhierà delle fette di aranci dolci o di cedro, leggiermente zuccherate; lascerà liquefare sulla lingua delle tavolette di pruno spinoso, e si gargarizzerà con cinque parti d'acqua unita ad una parte d'aceto.

Per sollevarlo dai mali di testa, gli si applicherà sulla fronte e sulle tempia, una crosta di pane inzuppata d'aceto rosato (c) unito con il doppio d'acqua tiepida: farà mattina e sera un pediluvio d'acqua-crusca tiepida colla giunta di un bicchiero d'aceto: nell'intervallo si farà la fomentazione alle gambe sopra enunciata. Il suo capezzale sia sollevato; gli assistenti si mantenghino in un'aria tranquilla: bea molto, e riceverà mattina e sera i lavativi indicati con due dramme di nitro: se i mali di testa sono violenti ed ostinati, si applichi alla pianta dei piedi il cataplasmo di lievito N.º 16.

Nelle veglie, il malato e gli astanti si manterranno nella maggiore tranquillità possibile: si cer-

D 4

---

fale ammoniaco, dodici once di calce viva, ed once quattro di fiori di zolfo: Mescolate queste sostanze, si pongono a distillare, e si conserva lo spirito estratto:

Lo spirito di vitriuolo è fatto con una parte d'olio di vitriuolo, e tre parti d'acqua-fontana, appoco appoco riunite: Si adopera in sua vece, come più grato alla bocca, lo spirito di vitriuolo dolcificato, conosciuto sotto nome di essenza, od acqua di Rabel, fatto con quattr'onze d'olio di vitriuolo, e nove once di spirito di vino rettificato: si versa appoco appoco l'olio di vitriolo sopra lo spirito di vino, ed a vaso chiuso si lascia digerire: *Il Tr.*

(c) L'aceto rosato si fa con mezza libbra di rose rosse, ed un boccale d'aceto forte: si lascia in infusione per tre o quattro settimane: ad un dolce calore in vaso ben chiuso, e si filtra: *Il Tr.*

ca di conciliare il sonno con qualche acqua che cada goccia a goccia in un catino : bea orzata leggiera ; e dopo rimediato alla pletora od alla pienezza delle prime strade , si può dare l' emulsione calmante N.º 66.

Nei mali di gola si preferiranno per bevanda ordinaria i giulebbi di siroppo di more, da avararsi lentamente e tiepiducci, e da usarsi ancora a foggia di gargarismo .

Tali sono i mezzi che conviene usare per adolcire e palliare i varj accidenti nominati . Non si ometterà non pertanto di seguire le indicazioni della malattia ; e se i mali di testa fossero violentissimi ed accompagnati da calore ardente , si ricorrerà alla cacciata di sangue dal piede e dalla giugulare , come nei mali, in cui necessita una pronta e potente derivazione del sangue .

*Delle inquietudini , delle alienazioni momentanee dello spirito , dei subsulti , tremori e movimenti convulsivi ; delle affezioni soporose , del delirio e dei trasporti che sopraggiungono nelle febbri .*

La maggior parte di questi diversi accidenti ponno nascere al principio della febbre , allorchè è nel suo vigore , non che quando si porta verso la fine .

Allorchè dessi si manifestano sul principio della febbre, e che questa non è tanto forte per poterli produrre , si potrà conchiudere, che la malattia sarà maligna o che soppravverrà qualche eruzione . Cotali sintomi provengono allora comunemente dalle materie esaltate nelle prime vie , o dalla congestione nel cervello o nella regione degl' ipocondrj , da un fomite sottile, il quale distrugge il principio delle forze, o che scompagina il corso degli spiriti .

Quando codesti accidenti nascono in una febbre; la quale non è nè maligna, nè esantematica, ciò ordinariamente inforge nel vigore della malattia. Sono essi per l'ordinario prodotti da una infiammazione al cervello, e qualche volta ancora dal deposito della materia morbosa alla testa; e le alienazioni di spirito, il delirio ed i movimenti convulsivi, che nascono sul declinare delle febbri di lunga durata, derivano soventi da languore.

Si rileverà, che ciò è principalmente da un putrido nelle prime vie, che hanno origine i sintomi enunciati; quando il malato ha la bocca cattiva, la lingua molto imbrattata, e nel medesimo tempo dei rutti, i quali sentono di uovo corrotto, od una grande svogliatezza, ed un senso di peso e di calore alla fossetta dello stomaco. Cotali sintomi sono accompagnati da nausea, da vomiti, ed altri sintomi, indicanti pienezza del basso ventre, e varianti a ragione della qualità delle materie, e secondo ch'essi affettano più particolarmente lo stomaco o le intestina.

I sintomi del cervello provenienti da questa cagione diminuiranno e si dissiperanno a misura della evacuazione delle prime strade. A tal effetto si darà la pozione emetico-lassativa N.º 165.; dacchè l'operazione sarà terminata, si applicherà il lavativo domestico N.º 108. affine di terminare l'uscita delle materie state precipitate negl'intestini; e se i sintomi della corruzione sussistono ancora dopo queste evacuazioni, si rinoverà immediatamente il suddetto emetico. Il malato si rinfrescherà nell'intervallo colle bevande acidette raccomandate per il calore febbrile; ed ammeno che le indicazioni non siano molto forti, si sospenderà il salasso, sino a che non si sia rimediato alla pienezza del ventre inferiore.

Quando invece di avere de' sintomi di putrido



nelle prime vie , il febricitante è incomodato da ristrettezza agl' ipocondrij , da ambascie e da dolore simile alla cardialgia , gli accidenti al cervello sono ordinariamente simpatici , e dipendenti dalla congestione della febbre maligna od esantematica esistente negl' ipocondrij .

Se il malato non ha pienezza nel basso ventre , e s' egli è libero dai suddetti sintomi , si conchiuderà , che il cervello è immediatamente affetto .

Che il cervello sia immediatamente affetto , o lo sia per simpatia , siccome questi diversi accidenti sono il preludio dell' infiammazione e dei depositi , i quali portano a morire gran parte delle persone , di febbre maligna , e putrida , tutto si porrà in esecuzione per distruggerli . A tal effetto si farà scrupolosamente la distinzione qui sopra dettagliata , perchè trattasi della vita dell' ammalato ; cioè che si scansi il salasso nei casi , nei quali non si farebbe che indebolire le sue forze ; e che devesi farlo prontamente , quand' egli è indicato ; ma sempre colla necessaria circospezione di non estinguere il vigore , di cui la natura avrà bisogno per arrivare alla convalescenza .

Fino a che i sintomi enunciati sono leggieri , basta usare ciò che è stato raccomandato , per diminuire i mali di testa , trattando del calor febbrile ; e se la regione degl' ipocondrij soffre , vi si applica la fomentazione risolvente N.º 82. , od una vescica piena a metà di latte caldo . Si avvertirà in seguito alle indicazioni della malattia : nel caso che il salasso sia indicato , si farà nel piede ; e se prevedesi per la epidemica costituzione , che la febbre debba essere esantematica , si ajuterà l' eruzione , com' è raccomandato per la cura di siffatta malattia .

Se gli accidenti nominati saranno considerevoli in un malato sanguigno , vigoroso , rosso in volto ,



e che i mali di testa sieno accompagnati da un battito alle carotidi , da piccole perdite di sangue dal naso , da un polso elevato o piccolo , ma chiaramente molto inceppato , si salassa prontamente dal piede , e si applica subito dopo il cristiero purgante N.º 111. , il quale rimesso , si rinnova il salasso ; e se l'ingorgamento della testa fosse incomodissimo , farassi dalla giugulare , dando poco dopo l'emulsione stibiata N.º 68. , la quale si potrà ridurre nel caso che non potesse prenderne una sufficiente quantità per fare prontamente la rivulsione e l'evacuazione necessaria . Si applica nel medesimo tempo alla pianta de' piedi il cataplasmo di lievito N.º 16. , ed i vescicanti alla polpa delle gambe : deve bere molta tisana comune N.º 210. tiepida , e continuare l'uso dell'emulsione stibiata , al segno di scaricare cinque o sei volte in 24. ore , sino a che gli accidenti enunciati sieno distrutti , o con una susseguente eruzione , o con una spontanea evacuazione qualunque , o con una metastasi salutare . In allora basta secondare la natura , com' è raccomandato per la cura delle eruzioni e delle crisi , che sopravvengono alle febbri . Allorchè senza queste rivoluzioni , gli accidenti del cervello faranno considerevolmente diminuiti , si segue l'andamento della malattia ; soddisfacendo alle indicazioni che potranno presentarsi .

In mancanza dei sintomi , i quali fanno necessario il salasso , si ommette ; e se vi fossero ragioni urgenti per diminuire la quantità del sangue , e fare nello stesso tempo una rivulsione più prossima al cervello , si supplisca colle ventose alla nuca , o le sanguisughe al collo . Tali precauzioni premesse , si ordinano i bagni tiepidi replicati , i vescicanti alla polpa delle gambe ; ed affine di derivare e fare fuori uscire insensibilmente i fomiati fissatisi sul cervello • sugl' ipocondrj , si darà nello stesso tempo

l'emulsione stibiata N.° 68., da continuarsi secondo il bisogno, fino a che si possa sperare che la natura rintuzzi, digerisca, ed evacui la materia morbifica. Ecco perchè deve si secondarla accortamente senza disturbare le sue operazioni.

Quando il cervello resta viziato in una febbre, che non è maligna, gli accidenti di rado diveranno importanti, se, nei principj della malattia, si rifletta ai sintomi. Quelli della testa che sono leggieri o momentanei, dipendono ordinariamente dal calore e dall'agitazione del sangue: vi si rimedia col metodo e rimedj indicati pel calore febbrile, osservando di evitare il salasso, ed accontentandosi di adoperare i vescicanti e l'emulsione stibiata, allorchè il malato sia letargico, debole e piuttosto pallido che di un colorito animato; come pure quando puossi credere, che il cervello è meno affetto d'inflamazione che imbarazzato da un deposito critico della materia morbifica.

Rispetto al delirio, alle alienazioni dello spirito, alla veglia, ed ai movimenti convulsivi, che sopraggiungono ai febbricosi spoffati per la lunghezza della malattia, si lascerà di evacuarli. I malati prenderanno buoni brodi e si rianimeranno colla mestura cordiale N.° 124.; e se il loro stato lo permette, si preferirà la polvere di chinacchina N.° 184.

*Del dolore non reumatico dei febbricitanti.*

Quando i dolori sopravvengono nelle febbri, sono sordi o vaghi, e di rado portano conseguenza; ed, ammeno che non provengano da una cagione ben' evidente, basteranno le applicazioni ammollienti, tali che le fomenta col decotto di foglie di malva, o di seme di lino; il cataplasma emolliente N.° 15.; od una vescica piena per metà di latte caldo:

darassi al malato l'emulsione calmante N.º 68.; e nel caso che 'l dolore fosse preludio della metastasi, si regolerà, come è raccomandato per la cura della metastasi.

Quando al contrario il dolore è fissato, vivo, pungente, accompagnato da un senso d'ardore, e da pulsazione alla parte affetta, il polso essendo nel medesimo tempo duro, il dolore è infiammatorio; e se l'infiammazione non è un sintoma della metastasi della materia morbifica sopra una parte esterna, si deve considerarlo come un male altrettanto più serio, e pericoloso, quanto più la parte viziata sarà profonda, e nobile.

Siccome le infiammazioni, che si formano internamente, sono le più volte pericolose assai che non la febbre, e che i rimedj destinati a risolverle, servono comunemente a diminuirle, si darà mano ad arrestare i progressi dell'infiammazione, impiegando immediatamente tutto ciò ch'è raccomandato per le risoluzioni dell'infiammazioni interne in generale.

*Della grande debolezza, dello svenimento,  
e della sincope.*

Quando simili accidenti si manifestano nel principio della malattia, ed innanzi che il febbricoso sia stato indebolito dalla dieta, o dall'èvacuazioni spontanee, od artificiali, avvi ordinariamente un principio maligno nella febbre. Se 'l malato ha nello stesso tempo il polso quasi naturale, o piccolo, con imbarazzo al cervello, non vi sarà più a dubitare, che i suddetti sintomi non provenghino da un fomite nelle prime strade, che opprime la natura, o che, introdottosi nelle vie del sangue, comincia a viziare il cervello, ed inceppare gli spiriti. Se poi il malato ha la bocca cattiva, la lingua imbrattata, le



nausee , od altri segni di pienezza nelle prime strade , il suo miglior cordiale sarà un pronto vomitorio , colla polvere emetica N.º 178. ; e se dopo questo , l'addomine rimanesse tuttora imbarazzato , lo si purgherà all'indomani colla pozione lassativa N.º 166.

Quando non vi faranno indizj di pienezza dello stomaco , e che 'l malato è incomodato dai sintomi indicanti un principio d'inflammazione , od una congestione di fomite morbofo al cervello , si useranno i diversi rimedj prescritti per la risoluzione dell' inflammazioni , e per dissipare i movimenti convulsivi , il delirio , ec. , dipendenti da quest' ultima cagione . Non si ometteranno altronde le indicazioni del male , come abbiamo insegnato , parlando di quella specie di febbre , da cui sarà preso il malato ; e se la debolezza fosse accompagnata da svenimento , o da deliquio , si farà fiutare , aceto forte , o lo spirito volatile N.º 75.

Se i suddetti sintomi avvengono nel corso della febbre in seguito a qualche abbondante evacuazione spontanea od artificiale , si può moderarla o sopprimere intieramente coi rimedj o precauzioni indicate , trattando delle diverse evacuazioni , che sopraggiungono nelle febbri . In questo caso , siccome pure quando il malato sarà stato indebolito per la lunga febbre , si cercherà di ristorarlo con buoni brodi , colla mestura cordiale N.º 124. , e ponendo sotto il naso le acque spiritose aggradevoli , ed ai polsi delle mani , l'epitema N.º 69.

Nel resto qualunque sia il carattere della febbre , tutte le volte che la natura sarà in uno stato d'inerzia , di languore , di stupore o di spoffatezza considerevole senza poterne rilevare la cagione , conviene eccitarla prontamente , dando a questo effetto ogni ora la polvere di chinacchina N.º 184. ; e se



il caso fosse pressante, anche i vescicanti alla polpa delle gambe, affine di destare tutte le forze, e di eccitare la natura a fare un ultimo sforzo, sia per cacciare al di fuori il fomite esantematico, sia per espellere le materie morbose, col favore di una evacuazione, o di una metastasi critica.

*Della diminuzione, o soppressione delle naturali  
escrezioni nelle febbri.*

Siccome vi sono delle febbri, nelle quali la materia morbosa è scacciata insensibilmente per beneficio delle secrezioni, che sussistono nel corso della malattia, e che d'altronde, le favorevoli e critiche evacuazioni, delle quali si parlerà fra poco, mancano soventi, perchè si è trascurato di rimediare in tempo alla costipazione, alla diminuzione delle urine o della traspirazione, bisognerà altrettanto essere sollecito a prevenire gli accidenti, che ne accagiona il rattenimento, tanto della materia morbosa, che dei recrementi dei cibi e delle bevande, quanti vi saranno più colatoj chiusi nel medesimo tempo.

A tal fine si avrà la precauzione d'impedire la costipazione col lavativo domestico N.º 108. ; o se ella ha durato per qualche tempo, si userà quello purgante N.º 111. Nel caso vi fosse difficoltà ad applicare il cristiero, il malato berà una sufficiente dose di tisana di cremore di tartaro N.º 211., o del sugo di susina, animato da un'oncia di manna sopra quattr' once di questo fluido, affine di rilasciargli il ventre.

Rispetto alla traspirazione, si cerca di mantenerla mediante la temperatura della stanza. Il malato non si coprirà che di coperture calde senza essere pesanti, e la sua bevanda sarà più calda che tiepida.

Se la traspirazione fosse diminuita al segno , che la pelle rimanesse secca, farà piediluvj con acqua-crusca un po' più calda che tiepida ; e se la febbre è maligna od esantematica , gli si darà la misura diaforetica N.º 125. Se è ardente , i bagni ai piedi saranno replicati, ed avvalorata l'acqua-crusca con una tazza d' aceto . Il malato prenderà in seguito la misura temperante N.º 130., e berà molta tisana comune N.º 210. : Nel caso in cui la soppressione della traspirazione sia ostinata , si cerca di rilasciare il tessuto della pelle con una piccola cacciata di sangue , e col mezzo di vesciche piene per metà d' acqua calda , d' applicarsi sotto alle ascelle . Si fomentano le gambe con acqua-crusca unita ad una sesta parte d' aceto . In casi urgentissimi , si ricorre al bagno di vapori da farsi colla medesim' acqua , da prendersi , stando sotto le coperture , sostenute da cerchj . S' egli è in istato di restare levato , prenderà questo bagno sotto un mantello di tela cerata : se ciò fosse impraticabile , e che il malato fosse vicino a morire per la soppressa traspirazione , potrà bere acqua fresca , atteso che questa bevanda presa in abbondanza a diverse riprese , ha provocato la traspirazione ed il sudore , anche quando tutti i diaforetici ed i sudoriferi sono stati insufficienti .

Rispetto alle orine ; dacchè non saranno esse proporzionate alla quantità dei fluidi presi , e che nello stesso tempo la bevanda non sarà rimessa colle uscite di corpo o col sudore ; affine di accrescerle , il febricitante prenderà in ciascun brodo ed in ogni sua bevanda , tre o quattro grani di nitro depurato , e gli si applicherà mattina e sera il lavativo domestico N.º 108. Ma se al contrario la bevanda sortirà per un altro emuntorio , le diminuite orine non faranno di conseguenza alcuna , per quanto la evacuazione supplementaria farà nocevole . In tal caso non si potrà

potrà accrescere il corso delle orine, che diminuen-  
do o sopprimendo l'evacuazione sfavorevole. Se il  
malato fosse preso da stranguria, da iscuria, o da  
totale rattenimento d'orina, vi si rimedierà nel mo-  
do raccomandato per la cura di questi accidenti. Egli  
farebbe inceppare la circolazione, inondando il ma-  
lato di bevande, quando i colatoj faranno ostrutti.  
Aspettando il ritorno delle secrezioni, ei berà meno;  
e se fossero pertinacemente, e considerevolmente di-  
minuite la traspirazione, e le orine, non si lascerà  
di tenere aperta la strada del ventre, affine di fare  
fuor uscire di là una porzione di ciò, che non pas-  
serà per le altre strade escretorie. Si darà dunque al  
malato mattina e sera, il lavativo purgante N.° III.,  
purgandolo contemporaneamente colla pozione mino-  
rativa N.° 168.

*Delle varie evacuazioni spontanee che sopraggiungono  
nelle febbri .*

Le principali evacuazioni che sopraggiungono  
nelle febbri, sono il flusso emorroidale, e menstruo;  
l'emorragia da naso, il vomito, la diarrea, il sudore,  
ed il flusso delle orine. Cotale evacuazioni sono  
favorevoli, quand' elleno diminuiscono la malattia;  
critiche e perfettamente salutari, quando terminano  
la febbre; indifferenti quando il malato non si trovi  
né meglio né più male; e finalmente elleno sono  
cattive, dacché la febbre o i suoi sintomi, innanzi  
che diminuire, crescono o si moltiplicano.

Quando il corso della malattia, non è stato in-  
torbidato da un metodo mal inteso, le critiche eva-  
cuazioni nascono comunemente nei giorni, che gli  
antichi hanno chiamato perfettamente critici, dei  
quali i principali sono il settimo, il quattordicesimo,  
il ventesimo primo, ed il vigesimo ottavo. La crisi



è qualche volta annunciata il giorno innanzi, da un piccolo preludio dell' evacuazione, che deve succedere il giorno critico; ed il malato è ordinariamente poco prima della crisi, od assopito, o più agitato, e più male che non mai (d).

Rispetto al flusso emorroidale e menstruo egli è annunciato dai sintomi ordinarj in simili casi. Tali evacuazioni sono salutari, e qualche volta perfettamente critici, nelle febbri che hanno per ragione principale la soppressione del flusso emorroidale e menstruo. Elleno sono comunemente favorevoli, e sollevano meravigliosamente, nei casi di congestioni sanguigne, come pure negl' ingorgamenti infiammatorj idiopatici alla testa, ed al basso ventre. D'altronde questi flussi non nucono, se non in quanto

(d) La crisi, o crise è parola greca, che significa giudizio, o conflitto; cioè a dire una subitanea mutazione della malattia, per cui l' ammalato o risana, o muore, o migliora, o peggiora: Si chiama crisi perfetta, quella che produce una perfetta e decisa guarigione; cattiva quella che conduce l' ammalato a morire; pericolosa quando rende la malattia alterata da nuovi, e cattivi sintomi.

Perchè si compia la crisi, sono necessarie sufficienti forze nell' ammalato; negli stenuati e debili, non si eseguisce la crisi:

Tanto i mali acuti, come i cronici soggiacciono alla crisi.

Il momento che precede la crisi, è un vero conflitto della natura col male, per cui si vede l' ammalato oppresso da più fieri sintomi, siccome sono, per modo d' esempio, il delirio, il sopore, il zuffolamento delle orecchie, le voglie al vomito, i borbottamenti di ventre, la soppressione delle urine, le ansietà, il raddoppiamento della febbre, con polso agitato. Allora perchè la crisi sia perfetta, deve nascere o la diarrea, od il sudore, o l' emorragia, od il vomito abbondante, o le urine copiose, sputo, ec., con assoluto rimarchevole sollievo dell' ammalato;

Le crisi non avvengono sempre costantemente nei giorni nominati dal nostro Autore, imperocchè il temperamento, l' età, le stagioni, il clima. ed altre molte circostanze, e specialmente il metodo di cura, possono ritardarle, od accelerarle; come ancora può occorrere, che si facciano in un modo impercettibile, come avviene molte volte nelle febbri acute benigne.

La crisi è promossa dalla natura, epperò conviene nulla operare, e farsi credere piuttosto Medici che meditano sopra la morte, di quello essere troppo attivi, ed apportare la morte: *Il Tr.*



che impediscono d'amministrare i rimedj convenienti alla malattia, e perchè snervano le forze: Si userà, per favorire, o per moderare, e sopprimere queste evacuazioni, i rimedj esterni raccomandati per la cura del flusso menstruo ed emorroidale.

L'emorragia nasale, ella è annunciata dalla plethora, dalla rossaggine del volto, dal mal di testa, dalla pulsazione delle tempie o del collo, da un pizzicore nelle narici, come pure da una disposizione del malato a perdere sangue dal naso nello stato di salute. Secondo le nuove osservazioni, un polso che batte con pulsazioni egualmente forti ma più serrate, e conseguentemente meno distaccate l'una dall'altra, che non erano le pulsazioni precedenti, annuncia l'emorragia; e più questa variazione del polso è ripetuta e considerevole, più l'emorragia dev'essere vicina (e).

L'emorragia nasale è ordinariamente critica nelle febbri continenti, e nelle continue, o dipendenti principalmente da plethora, da rarefazione, o da qualche leggiera congestione del sangue. Allorchè è perfettamente critica, ella è abbondante; la febbre cade; la maggior parte dei sintomi diminuisce a ragguaglio, che il sangue cola, e 'l malato trovasi quasi vicino alla convalescenza. Rispetto alle piccole perdite di sangue dal naso, elleno non sono favorevoli, se non quando nascono il giorno innanzi dei giorni critici, per predire l'emorragia critica, e che nei

E 2

---

(e) Il polso, che indica il sangue di naso, dice il Sig. Dottor Giuseppe CERRI nel suo dottissimo libro. *intorno al polso*, è forte, e pare che l'arteria per finire la diastole, s'alzi in due volte; onde si sentono due battimenti, l'uno all'altro vicino. i quali sembrano formare una sola, ma interrotta diastole. Questo polso è chiamato *dicroto* dai Greci, *bisferiens* dai Latini, *redoublé* dai Francesi, e *nasale semplice* da BORDEUX; *Il Tr.*

mali di testa, e nelle congestioni sanguigne del cervello sollevano il malato. Ella è indifferente, quando è irregolare, quando si ripete in piccola quantità, ed avviene a persone soggette a perdite di sangue dal naso nello stato di salute. L'emorragia nasale è pericolosa, quando, senza produrre buoni effetti, snerva il malato, o fa retrocedere una critica eruzione; ed allora pure che dessa è critica, quando la perdita del sangue è copiosa al segno di produrre gli svenimenti accompagnati da convulsioni, e che la non si può arrestare. Ella è ancora di cattivo augurio, quando, avendo il cervello imbarazzato, l'infermo perde alcune gocce di sangue; ciò che indica, essere la congestione considerevole, ostinata, od infiammatoria.

Allorchè si prevede l'emorragia critica, il malato terrà soventi sotto il naso, una spugna inzuppata d'acqua calda, di cui respirerà il vapore, affine di rilasciare i vasi, pei quali deve colare il sangue. Si sospenderanno i rimedj, che potrebbero frastornare questa emorragia: il malato berà molto: si alimenterà con un brodo debole, unito alla crema d'orzo, ed aspettare, fino a che dessa sopraggiunga. Se il sangue non colasse a dovere, egli tirerà il fiato per le narici assorbendo per tal modo dell'acqua tiepida, e potrà irritare la narice, da dove il sangue cola, con una paglia bene affilata.

Quando, al contrario, l'emorragia dura un tempo considerevole, e la perdita è talmente copiosa, che 'l malato cade in debolezza, si cercherà di sopprimerla prontamente, usando ciò che raccomandiamo a quest'uopo, parlando della cura dell'emorragia nasale.

Se per la cognizione rilevata della causa della malattia, e della fisica disposizione del febbricoso, si prevede che l'emorragia non sia perfettamente criti-

ca; come pure quando si offerverà, che l'emorragia nasale non produca niente di favorevole, si continuerà a soddisfare alle indicazioni della malattia.

S'egli converrà trar sangue, si preferirà il piede al braccio, continuando l'uso del vapore di acqua calda più sopra raccomandato. Lungi dal frastornare con ciò le operazioni della natura, elleno faranno anzi più felici; ed un salasso che non sarà stato che utile, potrà divenire perfettamente critico e salutare.

A più forte ragione, non si atterrà solo all'emorragia nasale, quando non si perdano irregolarmente che alcune gocce di sangue. Questa sarà una indicazione di più per salassare dal piede. Si continuerà a praticare ciò, che la febbre e gli accidenti richiedono, senza contare sopra una critica emorragia; ammeno che queste piccole perdite sanguigne non arrivassero l'anti-vigilia dei giorni critici sopra nominati, e coi segni che annunciassero la critica emorragia.

Di rado il vomito che nasce nelle febbri, è perfettamente critico; ma soventi è favorevole. Egli è preceduto da un senso di pienezza alla forcilla dello stomaco, da rutti di un sapore scipito, amaro, o putrido; da nausea, o da uno sputacchiare frequente. Quand' egli è abbondante e facile, e che gli accidenti preceduti si dissipano a misura che il malato vomita, non si ha che a facilitarlo con una bevanda abbondante d'acqua tiepida. Se l'evacuazione per lo contrario, non fosse nè facile nè abbondante, o ch' ella non dissipasse questo senso di pienezza, e le antecedenti nausea, non si esiterà di dare la polvere vomitiva d'ipecacuana N.º 192., ciò che si replicherà senza indugio, se la pienezza sembrasse considerevole, e che la malattia fosse ancora nel suo principio; e s'egli avvenisse che i sin-



tomi di pienezza si rinnovassero nel corso del male; dappoichè le materie dello stomaco, venendo ad inacidirsi, a corrompersi e ad insinuarsi nel sangue, la malattia ne diverrebbe più viva, ed il febbricitante sarebbe sorpreso da una diarrea, che lo indebolirebbe, ec. Se dopo essere stato sufficientemente purgato, egli avesse lo stomaco irritato e della disposizione a vomitare, gli si applicherà sulla bocca dello stomaco un impiastro di triaca, e prenderà la pozione anti-emetica N.º 163.

Il vomito è di cattivo augurio, allorchè non è preceduto dai sintomi di pienezza sopra nominati, e ch'egli sussiste ostinatamente, dopo che le materie peccanti sono state evacuate. Egli è allora di maggiore pericolo, se il malato è nel medesimo tempo preso da delirio, da singhiozzo o da altri convulsivi movimenti, come di dolore fisso e vivo alla forcilla dello stomaco, che s'accresce al tatto. In tal caso il vomito proviene il più spesso da una infiammazione dello stomaco; e però si userà immediatamente, quanto è stato raccomandato per distruggerla, parlando della cura dell'infiammazione dello stomaco.

Il vomito convulsivo, che succede frequentemente nelle febbri esantematiche e maligne; allorchè il fomite si fissa sullo stomaco, si applica sulla forcilla di esso una vescica piena per metà di latte caldo, ed il lavativo domestico N.º 108. Sussistendo il vomito, si darà ciò che è raccomandato per ajutare l'eruzione, nel trattato delle eruzioni, che sopravvengono alle febbri.

In questi diversi vomiti, che saranno lunghi ed ostinati, il malato lascerà i brodi, e le insulse bevande. Prenderà per cibo alcuni cucchiaj di gelatina di carne, colla giunta della raschiatura di corno di cervo. Berà poco per volta di sola limonea leggiere, animata da una goccia di vin bianco; o



dell'acqua pura inacidita con alcune gocce di spirito di vitriuolo, o di spirito di zolfo.

*Della diarrea.*

La diarrea, che sopravviene nelle febbri, è spesso favorevole, qualche volta perfettamente critica, ed altre cattiva, ed anche pericolosa.

La favorevole o critica è comunemente preceduta da sintomi di pienezza nelle prime strade. E' annunciata da borborigmi, da leggieri dolori nel basso ventre, o da dolori colici. Nella diarrea critica questi accidenti sono accompagnati da un polso intermittente; e più questa intermissione del polso è lunga o ripetuta, più prossima è la crisi (*f*).

La diarrea assolutamente critica e salutare, non nasce guari che nelle febbri continenti, ed ancora in alcune febbri infiammatorie. Ella insorge ordinariamente nei giorni critici sopra indicati, ed è comunemente preceduta l'anti-vigilia da un rilasciamento del ventre.

Dacchè si prevede la diarrea critica, si sospendono i medicamenti, che potessero frastornarla; ed il malato, affine di favorire quest'evacuazione, deve bere molto siero di latte o della tisana N.° 212., raddolcita con siroppo di viole. Prenderà mattina e sera il lavativo domestico N.° 108. Aspetterà il principio della diarrea, e nel caso che l'evacuazione non fosse abbondante, e non producesse un sollievo pronto e considerevole, prenderà la pozione minorativa N.° 168., da ripetersi ancora all'indomani, se la

E 4

---

(*f*) Polso intermittente critico, chiamato da SOLANO, da NIHÉL e da altri; polso inferiore intestinale di BORDEUX: CERRI l. 2.: *Il Tr.*

prima dose ha diminuito la febbre , ma che non sia intieramente terminata .

La diarrea può essere favorevole per tutto il corso della malattia , come un buon effetto di una cattiva causa , o perchè porta fuori le materie peccanti delle prime strade , o perchè previene o diminuisce la congestione del sangue o della materia morbifica alla testa o sulle viscere . Questo è il bene ch' ella produce nelle febbri maligne , non che nelle febbri infiammatorie e continue remittenti . Fino a che il malato sia sollevato dalla diarrea , e che questa evacuazione non lo indebolisca molto , si può facilitarla coi lavativi domestici e col siero di latte , e coll' acqua d' orzo sopra raccomandata . S' egli avesse nel medesimo tempo una manifesta pienezza nelle prime strade , o se le sue forze crescono a misura che il malato scarica di ventre , si considererà la natura , purgando colla pozione minorativa suddetta . Ma dacche la diarrea comincerà ad infiacchire di troppo , converrà arrestarla dolcemente , prendendo a tal effetto per bevanda ordinaria , la tisana bianca N.º 208. , con eguale porzione d' acqua : si darà alternativamente di quattro in quattro ore od un brodo di vecchio pollo alterato colla crema di riso , od alcuni cucchiaj di gelatina di corno di cervo N.º 87. Se la debolezza esigesse , che si arrestasse prontamente la diarrea , prenderassi l' elettuario contro la diarrea N.º 48. ; avvertendo se vi fossero sintomi ancora di pienezza , di purgare colla pozione di manna N.º 167. , o colla polvere d' ipecacuana N.º 192. , nel caso che il flusso di ventre fosse accompagnato da nausea o da vomiti .

La diarrea è cattiva , quando invece di sollevare il malato , lo snerva , ed accresce gli accidenti della febbre . Egli è ciò che succede assai frequentemente nelle febbri , quando nel loro principio

si siano omesse le indicate evacuazioni . Ella nuoce ancora, quando fa rientrare una eruzione, o che produca la soppressione di qualche salutare evacuazione. Il flusso di ventre è ancora di cattivo augurio, quand' è colliquativo, cioè a dire che il malato scarica molte materie acquose, grigie o rosse e fetidissime, come pure se lascia sfuggire sotto di se materie meno cattive, ma senza ch' ei se ne avvegga, quantunque non sia delirante .

Quando un cotal flusso di ventre nasce inseguito ad una pienezza dello stomaco, che si ha omezzo di evacuare, in qualunque tempo ciò succeda, si potrà essere assicurato, ch' egli è prodotto da un avanzo di purulenze nello stomaco o negl' intestini . Per poco dunque che lo stomaco sia tuttora imbarazzato, e che l' infermo abbia nausea o rutti, si purgherà immediatamente, ma dolcemente colla polvere vomitiva d' ipecacuana N.º 192. Se la diarrea sussistesse dopo l' operazione dell' emetico, si purgherà poco dopo il malato colla pozione minorativa N.º 168., e si potrà dopo ciò, arrestare il flusso di ventre, col regolamento e rimedj raccomandati per la cura della diarrea febbrile . Si praticherà lo stesso, se la diarrea ha fatto rientrare una eruzione, o se dessa accagiona la soppressione di una evacuazione salutare, ed allorchè il malato sarà nel medesimo tempo incomodato da nausea e da vomiti, come da altri sintomi indicanti una considerevole pienezza nello stomaco o nel ventre inferiore . Nel caso che le prime vie fossero in buono stato, si arresterà immediatamente la diarrea nel modo sopra enunciato; dopo di che si useranno i mezzi insegnati per promuovere l' evacuazione o l' eruzione soppressa . Nella diarrea colliquativa, il malato prenderà mattina e sera il lavativo tonico N.º 112.



*Del sudore che sopravviene nelle febbri.*

Il sudore dei febbricitanti è qualche volta perfettamente critico e salutare, soventi favorevole, ma spesso ancora egli nuoce.

Il sudore perfettamente critico non nasce guari che nelle febbri continenti leggiere, e nelle febbri infiammatorie, allorchè i fluidi stagnanti sono subitamente trasportati al centro, e che dopo essere rientrati nel torrente della circolazione, la natura li espelle per questa strada. Si prevede, che il sudore sarà perfettamente critico, quando la malattia è epidemica, e di natura da terminare con una simil crisi; come pure allorchè il febbricitante si è liberato col sudore da altre febbrili malattie. Il sudore critico è il più di spesso annunciato da un polso, che di tempo in tempo accresce di vigore, talmente che la seconda pulsazione è più forte che la prima; più questo accrescimento di polso è ripetuto e prolungato, più vicino è il sudore. (g)

Dacchè si potrà sospettare di un sudore critico, si sosponderanno tutt' i rimedj, che poteessero deviarlo. Il malato si coprirà con coperture calde ma leggiere; la sua bevanda sarà più calda che tiepida, e frequente, e questa sarà la tisana comune N.º 210. di cui userà; e quando il sudore apparirà, affine di favorirlo, si potrà dargli di tempo in tempo una tazza di leggiere infusione di fiori di sambuco o di tisana di scorzonera N.º 217., evitando di cangia-

(g) Il sudore critico ha il polso, chiamato da BORDEUX, *polso di sudore critico*, *inciduus* da SOLANO, *ondeggante* da GALENO, *inæqualiter adsurgens*, *aut increescens* dai Latini, *ridondante* de' Chinesi, *cutaneo* da FOUQUET, *ascendente* da FLEMING, ec.: CERRI l. c.: *Il Tr.*



re biancheria, fino a che questo sudore spontaneo sia sul suo finire.

Il sudore favorevole appare su tutta la superficie del corpo: egli produce mollezza e sviluppo nel polso: diminuisce gli accidenti della febbre; e non opprime considerevolmente il malato. Questa specie di sudore spontaneo sopravviene ordinariamente alla fine delle remittenze della febbre continua; e quantunque comunemente sia meno la cagione, che l'effetto della diminuzione della febbre, non si farà niente, che possa diminuirlo, tanto che desso solleva il malato. Si manterrà, come è stato detto quì sopra, questo sudore, e con altrettanto di attenzione quanto cattivo sarà il suo odore, e che la febbre sarà di carattere maligno. Quando al contrario il sudore comincerà ad indebolire di molto il malato, si diminuirà insensibilmente il peso delle coperte, le bevande saranno appena tiepide, e prenderà brodi sostanziosi.

Rispetto ai sudori cattivi, si conoscono da ciò, che invece di sollevare il malato, la febbre ed i suoi accidenti continuano egualmente, frattanto che le forze diminuiscono. Questi sudori cominciano spesso nei primi giorni della malattia; e siccome non fanno che estrarre le parti più fluide del sangue, si eviterà di provarli. Si seguiranno le indicazioni della febbre senz'ajutare il sudore; e per diminuirlo, si rinnoverà l'aria della stanza del febbricitante. Cangerà letto con precauzione, o resterà levato altrettanto tempo, quanto lo permettono le sue forze; berà meno e solo acqua panata tiepiduccia. Siccome ordinariamente cotali sudori sono sintomatici, e provenienti da un putrido delle prime strade, nel caso che il malato sia preso da sintomi indicanti pienezza del ventre inferiore, si purgherà immediatamente colla pozione lassativa N.º 166.

Il sudore colliquativo è familiare delle persone etiche, e sopravviene qualche volta nelle febbri continue, la cui lunga durata ha snervato l'infermo. Egli è di cattivo augurio del pari che il sudore locale e freddo, che si ammassa in grosse gocce sulle tempia ed al collo. Nel caso che il sudore colliquativo sia un accidente della febbre etica, si userà per diminuirlo, ciò che è raccomandato nel trattato della polmonia; e s'egli nasce in una febbre continua, si darà al malato la mestura cordiale N.º 124, con un bicchiere d'infusione di chinacchina fatta nella proporzione di due libbre d'acqua fredda sopra un'oncia di chinacchina. Si alimenterà con brodi sostanziosi alterati col cremore di riso (b); la bevanda farà acqua panata unita ad un ottavo di eccellente vin rosso; ed affine di comprimere i pori cutanei, le sue vesti saranno ferrate.

*Del flusso delle orine nei febbricitanti .*

Egli è della quantità, e non della qualità delle orine, che quì si tratta. Egli è del flusso dell'orine che sopravviene nelle febbri come del sudore; ed egli è molto più raro che questa escrezione sia perfettamente critica: comunemente ella è favorevole. Il flusso d'orine può essere perfettamente critico nella febbre catarrale e nell'infiammazione delle vie urinarie, atteso che nel primo caso, le orine stranguiose, spesse, mattonose ed abbondanti seco portano prontamente i fomenti catarrali, e perchè, nelle infiammazioni febbrili delle vie urinarie, come anche nella disenteria, il flusso d'orine annuncia

---

(b) I cremori di riso, o d'orzo, o d'avena, o di frumento, sono una bollitura nell'acqua, o nel brodo di una o più di queste sostanze leggermente pilate, e monde dalla loro scorza: *Il Tr.*

la cessazione dell' increspamento dei vasi, e la risoluzione dell' infiammazione.

Il flusso delle orine è favorevole, quando si sostituisce, e termina i sudori e le diarree non salutari; come anche se produce una sensibile diminuzione della febbre o dei suoi accidenti; od il colore delle orine è di un rosso proporzionato alla violenza della febbre, e che la loro quantità è eguale alla bevanda; come anche quando il malato ne rimette molta in una volta, o che depone prontamente più o meno di sedimento, o che contenga una nube riunita e ben sospesa. Il flusso d'urina è cattivo, quando invece di sollevare, indebolisce il malato, o ch' ei sopprime od impedisce qualche altra salutare evacuazione. In questo caso le orine sono ordinariamente crude, oleose, o fangose; la bevanda scorre prontamente, ed il volume delle orine eccede quello dei fluidi presi.

Allorchè il flusso d'urina farà perfettamente critico, si sospenderanno tutti i rimedj, che potessero diminuire, o deviare quest' escrezione. Il malato non farà troppo coperto, e berà molta tisana comune N.º 210., da frammischiarsi, se orina difficilmente o con dolore, con una tazza d'infusione di radice d'altea, o d'acqua di seme di lino, raddolcita con siroppo d'altea.

Quando le orine non sono che favorevoli, si continuerà a soddisfare alle indicazioni della febbre. Il malato berà molta tisana comune N.º 210.; affine di mantenere quest' escrezione salutare, prenderà tre o quattro volte al giorno, nella sua bevanda, una dozzina di grani di nitro depurato; e se la febbre fosse putrida e vivissima, userà per bevanda ordinaria, leggiera limonea, od i giulebbi acidetti raccomandati nel regolamento descritto sotto la lettera D.

Si cercherà di diminuire il flusso d'orine, che nuoce colla sua abbondanza, coll'uso dei diaforetici, prendendo a quest'uopo la mestura diaforetica N.º 125., sopra bevendo alcune tazze d'infusione calda dei fiori di sambuco, e coprendo sufficientemente il malato per favorire il sudore.

La bevanda ordinaria farà la tisana N.º 217., tagliata con eguale porzione d'acqua; e nel caso che il flusso d'orine fosse accompagnato da pienezza del basso ventre, si farà precedere ai diaforetici la porzione lassativa N.º 166.

*Dell'eruzioni che sopravvengono ai febbricitanti.*

Queste eruzioni sono la *bouchere*, le *fliteni*, le *pemfigini*, le *papole*; le macchie cutanee, ridotte a forma di papole, o di grani, e di tumori più considerevoli.

La *bouchere*, le *fliteni*, le *pemfigini*, le *papole*, nascono spesso nelle febbri, che non sono maligne. Quest'eruzioni sono le più volte senza conseguenza, come pure le macchie superficiali; e larghe di colore scarlato, e che si chiamano macchie scarlatine, o febbri rosse non epidemiche: qualche volta ancora la *bouchere* predice il termine vicino della febbre.

Quando le macchie sono simili alla morficatura delle pulci, si nominano petecchie. Si distingueranno da quelle, che produce il morso dei pulci, dalla mancanza del punto nero, che trovasi nel centro di quest'ultime.

Quest'eruzione non è cattiva nei fanciulli, nè nelle persone adulte, quando le macchie sono di colore di rosa; ma più il rosso farà fosco, o volgerà verso il livido, più queste macchie saranno di cattivo augurio. Lo stesso dicasi delle macchie nominate vibici, che sono rare, lunghe, di un rosso livi-



do ; atteso che siffatt' eruzioni predicono un principio gangrenoso nella massa del sangue .

Rispetto all' eruzioni che sono granite , o bottorutte , le principali sono il vajolo , e la rosolia , delle quali si parlerà separatamente . L' eruzione migliare consiste in piccoli grani rossi , o bianchi innestati sopra macchie petecchiali . La porpora , al contrario , si manifesta con chiazze di questo colore , che rassomigliano ai morsi di pulce ; ma desse hanno una elevatura visibile in tutta la loro superficie , che volge qualche volta al bianco , e questi grani prendono allora il nome di porpora bianca . Sopravvengono ancora nelle febbri , dell' eruzioni risipelatose , serpiginose , scorbutiche . Rispetto ai tumori , dessi sono grosse papole , parotidi , carbonchj , terminti , ec. , dei quali se ne darà la descrizione , parlando della cura delle infiammazioni esterne , e delle malattie cutanee .

Quando coteste varie eruzioni dipendono dalla costituzione epidemica , egli è uso , di nominare queste febbri , esantematiche , od erutive . Elleno prendono il nome di febbri-porporine , migliari , ec. , secondo i diversi caratteri dell' eruzione .

Dacchè , senza precedente epidemia , apparirà una eruzione in una febbre qualunque , si avvertirà , se la malattia , e i suoi sintomi si calmano a ragguaglio , che ella si manifesta . In tal caso l' eruzione sarà salutare , se dessa può eseguirsi intieramente . Si sospenderà tutto ciò , che potesse deviarla , e si seconderà la natura coi mezzi quì sotto raccomandati .

Se la febbre è epidemica , e che dippiù si sapia , essere esantematica ; che per conseguenza la natura è inclinata a scacciare la materia morbosa col beneficio dell' eruzione , si cercherà di sapere , in qual' epoca del male l' eruzione si è fatta sulle altre persone , che ne sono state invase ; affine di sospen-

dere allora tutto ciò che potrebbe opporsi alla eruzione e prevedere le convenienti misure per facilitarla, e renderla salutare. A quest' effetto, si esaminerà scrupolosamente il temperamento, e lo stato del malato, e s' egli fosse piuttosto di una costituzione temperata, che calda o fredda, o che la febbre fosse mediocre, il polso sviluppato, e gl' ipocondrij ed il cervello liberi o poco imbarazzati; in questi casi si abbandonerà l' eruzione alla natura, e continuerassi soltanto a soddisfare alle indicazioni del male, nel modo che sarà raccomandato, parlando delle febbri epidemico-efantematiche in generale, ed in particolare del vajolo, della rosolia, cc.

Quando al contrario, il temperamento del malato sarà caldo, vivo, bollente. e se la febbre è violenta, accompagnata da molt' agitazione, da inquietudini, da delirj e da alienazioni di spirito, od ancora da assopimento con pulsazione delle carotidi, e molta rossaggine al volto, converrà ajutare l' eruzione col salasso. Si esiterà tanto meno a replicarlo, quanto che il polso sarà nel medesimo tempo duro e soffocato: l' infermo non si nutrirà che di brodo di pollo o piuttosto polte d' acqua: starà in una stanza molto temperata, e leggermente coperto; gli si darà la mestura temperante N.º 130.; e nel caso avesse dolore, veglia, o grandi agitazioni, prenderà dopo il secondo salasso, l' emulsione calmante N.º 66.

Ma se il suo temperamento fosse freddo e flemmatico, il salasso, invece di esser utile, sarà altrettanto più pernicioso, quanto più l' infermo è nello stesso tempo debole, assopito, ed instupidito. Si alimenterà con brodo sostanzioso: la sua bevanda sarà la tisana di scorzonera N.º 217.: sarà collocato in luogo temperato, ma coperto con robe calde e leggiere; e s' egli è molto infiacchito, converrà la

mestura cordiale N.º 124. ; nel caso che l'eruzione non si faccia debitamente, e che il ritardo fosse pericoloso, gli si applicheranno i vescicanti alla polpa delle gambe; e se la febbre fosse maligna, prenderà la mestura bezoartica N.º 121. invece di quella cordiale.

Siccome la sperienza insegna, che l'eruzione è soventi sospesa tanto presso le persone di costituzione calda, che in quelle fredde o temperate, perchè la natura è oppressa dalla pienezza delle prime strade, o dalla congestione del fomite esantematico al cervello, od agl' ipocondrij; se il malato ha la lingua imbrattata, nausea, imbarazzo allo stomaco o pienezza all' addomine, non si lascerà di purgarlo giusta l'indicazione, o colla polvere emetica N.º 178., o colla pozione lassativa N. 166. Questo si praticherà nelle persone flemmatiche, prima di dar loro i cordiali ed i bezoartici. Se il malato è di una costituzione calda, lo si purgherà dopo il primo o secondo salasso. Rispetto alla congestione dei fomiti esantematici nel cervello o negl' ipocondrij, si conoscerà coi segni indicati, parlando delle alienazioni di spirito, dei moti convulsivi, imbarazzo al cervello ec. che sopravvengono alle febbri; vi si rimedierà nello stesso modo e colla stessa distinzione.

Quando al contrario il malato non è che poco o niente sollevato dall'eruzione, si conchiuderà, ch'ella è imperfetta, e piuttosto sintomatica che critica. Si seguiranno in questo caso, le indicazioni della malattia, senza badare all'eruzione. Ma se il malato è stato alcun poco sollevato dall'eruzione, questa potrà divenire critica, se si arriva a renderla più perfetta. S'insisterà a questo effetto, nell'uso dei diversi rimedj raccomandati per ajutarla; e se si adoperano prontamente, e colla prescritta distinzione, ben lungi da nuocere, si potrà accertarsi che



quand' anche vi fosse dell' eruzione, la quale sparisse per un momento, poco dopo ricomparirà meglio; e che una eruzione, la quale farebbe stata poco utile, potrà essere perfettamente salutare. Ciò è, che si praticherà ogni qual volta una eruzione, che non è stata critica, non sarà stabile, o che rientrerà subito. Siccome il rigurgito nel sangue dei fomici che si sono portati alla pelle, è pericolosissimo, si farà in questo caso altrettanto più sollecito di provocarla, quanto più considerevoli saranno gli accidenti di questo rigurgito.

Rispetto ai tumori esantematici, non nascono se non nelle febbri epidemiche e molto maligne: Dacchè questi tumori cominciano a comparire, affine di attrarre le materie morbose, si applica sulla parte, dove il deposito sembra volersi fare, il cataplasmo emolliente N.° 15. Si può ancora accelerare la tumefazione col mezzo di una ventosa a vento sul tumore. Il deposito essendo formato, affine d' impedire il riflusso della materia, e di provocare la suppurazione, si sostituisce al cataplasmo emolliente, quello maturativo N.° 17., animato, se abbisogna, colla gommamoniaco. Si apre l' ascesso, dacchè vi è fluttuazione; e s' e' il tumore è glandoloso, piuttosto colla pietra caustica che col taglio. Si alimenta il malato sufficientemente, per sostenere le sue forze; gli si dà nell' intervallo dei brodi, la mistura cordiale temperata N.° 124.; e se la febbre è stata maligna, si preferisce quella bezoartica N.° 121.; e per eccitare un dolce sudore, l' infusione diaforetica N.° 103., astenendosi altronde durante la suppurazione di questi tumori, d' indebolirlo col salasso e colla purga, come pure da tutto ciò che potesse contribuire a fare retrocedere la materia del deposito. La suppurazione sarà mantenuta, fino a che il tumore sia intieramente fuso. Se dessa venisse a



sparire , e che nello stesso tempo gli accidenti del male si rinnovassero , si userà incessantemente ciò , che è indicato per ajutare l'eruzioni , nel trattato dell'eruzioni in generale .

*Delle afte , che sopravvengono nelle febbri .*

Le afte si manifestano con bianche vescichette , le quali appianandosi , contraggono presto il colore e la consistenza di piccole croste del colore di lardo . Più comunemente nascono nella bocca , e qualche volta si avanzano nella gola , nell'esofago , nello stomaco , nel canale degl'intestini , nella trachea-arteria e nel polmone . Nella bocca elleno non sono che incomode ; quand' esse si portano più innanzi , diventano pericolose e mortali , se gangrenose . Si conoscono al semplice aspetto le afte della bocca e della gola . Quelle dell'esofago e degl'intestini vengono indicate dalla preesistenza delle afte della bocca , seguita da una sensazione dolorosa nel passaggio dell'esofago , il quale eccita qualche volta nel trangugiare , il singhiozzo , un po' di vomito come anche la diarrea con pizzicori nell'intestina , se fino là si sono stazionate le afte .

Le afte situate nella trachea-arteria , e nei bronchi , sono annunciate da una voce fioca , tronca , o da una piccola tosse rauca .

Fintanto che non incomodano che la bocca , il malato si gargarizzerà spesso coll'infusione di salvia , raddolcita col mele ; si toccheranno spesso le afte con filaccia inzuppata nel mele rosato , unito ad eguale porzione di sugo di cedro : cotale applicazione farassi pure e molto frequentemente su quelle della gola . Se desse sono ribelli a questo rimedio , si rinforzerà la mestura del mele e del sugo di cedro con

una dramma di borrace (i) sopra tre once della detta mestura; si potranno toccare leggermente quelle delle labbra e dei margini della lingua, che sono incomodissime, con un pezzetto di vitruolo turchino . A proporzione che le afte si avvanzeranno internamente, l'infermo ingolerà spesso a cucchiaj di caffè, la misura raddolcente N.º 117.

Se le afte venissero ad imbrunirsi, ad annerirsi, od a rendersi insensibili, e gangrenose, si unirà ai suddetti rimedj l'uso interno del decotto anti-setico N.º 22., di cui si farà uso ancora per schizzettare nella gola .

Quando le croste bianche si staccheranno, si purgherà dolcemente colla pozione di manna N.º 167.; della quale se ne prenderà ogni ora, un cucchiajo a bocca piena, sino a che comincerà a sciogliersi il ventre, mantenendo questa evacuazione per un pajo di giorni, affine di espellere le croste astose del tubo alimentare .

---

(i) La borrace, chiamata dai Greci, *crisocola*. è una specie di sal neutro che ci viene dall' Austria, e dalla Macedonia, sotto forma di piccole pietre grosse come un' avellana, e coperte da una specie di grasso. Il borrace purificato che serve ad uso della medicina, è ridotto in piccoli cristalli lucidi, trasparenti, bianchi, simili all' alume: Malgrado tutte le fatiche e prove fatte per rilevare la natura di questo sale, e tutto ciò ch' è stato supposto, ed immaginato dagli Scrittori, e dagli Artefici, siamo tuttora incerti sulla sua origine, e raffinamento: Egli è importantissimo nelle arti, per la proprietà che possiede di facilitare la fusione dei metalli; in medicina poi è stimato come un eccellente aperitivo, fatto per dividere ed attenuare gli umori tenaci: se ne usa frequentemente nella soppressione de' mestruj e de' lochj; serve pure come cosmetico ad imbianchire la pelle. *Il Tr.*

*Della metastasi, ossia deposito della materia morbosa per trasporto (k) .*

La metastasi succede non solo nelle febbri maligne, ma in quelle che tali non sono, allorquando la materia morbosa gettata nel sangue, invece d'essere evacuata coll'éruzioni o coll'escrezioni, delle quali si è parlato, si ammassa sopra una parte, formando un locale deposito. Ella nasce ancora, quando nelle febbri infiammatorie i fluidi che sono stati alterati dal ristagno, sono riassorbiti e trasportati altrove. La metastasi è salutare nei due casi, che il deposito si faccia, e si sostenga sulla superficie del corpo, fino a che la materia morbosa sia interamente evacuata: ella si forma frequentemente sulle parotidi, sotto le ascelle, ed alle anguinaglie. Ella è favorevole, e salva ancora la vita con meno pericolose malattie, come succede, quando il deposito farsi alla coscia, ai testicoli, nell'orecchio, o che la materia morbosa produca la itterizia, ostruendo il fegato, o producendo un ingorgamento in qualche altro viscere, che possa risolversi. La metastasi è mortale, quando farsi un deposito considerevole nel cervello, sul petto, alla gola o sopra qualche altra parte più nobile, da dove cotal deposito non potrebb'essere evacuato, che dalla natura ajutata dall'arte. Tutte le volte, che si formerà alla superficie del corpo un deposito, siccome la materia della metastasi è soventi di cattiva qualità, e siccome

F 3

---

(k) La metastasi è il cangiamento di un male in un altro, che gli succede immediatamente; cangiamento che si conosce per il trasporto della materia morbosa sopra una determinata parte, e diversa da quella, che dapprima formava la sede del male: *Id. Tr.*

il suo rigurgito nel sangue, farebbe pericoloso, si eviteranno in generale le applicazioni, che potessero ripercuoterlo o risolverlo.

Dacche l'ammalato comincia a lamentarsi, durante il vigore della febbre, di un dolore all'una od all'altra delle parti, nelle quali la metastasi ordinariamente si forma, affine di attrarvi le materie, vi si applica il cataplasmo emolliente N.º 15. Se con questo, le apparenze del deposito si dissipassero senz'accrecimento di febbre o degli altri accidenti della malattia, si conchiuderà, che la materia della metastasi è benigna; ed in questo caso, se la infiammazione del tumore non è considerevole, potressi dissipare in parte colla traspirazione locale e col susseguente riassorbimento, ed insensibile evacuazione. Si continua allora il cataplasmo emolliente: il malato bea molta infusione diaforetica N.º 103.: stia ben coperto, bevendo brodi molto caldi, affine di mantenere sempre una forte traspirazione. Dacche insorge qualche altra evacuazione spontanea, propria ad espellere la materia della metastasi, questa si ajuta nel modo da noi raccomandato nella cura delle diverse evacuazioni, che nascono nelle febbri.

Se per lo contrario il deposito fosse una parotide sotto l'ascella od all'anguinaglia, e che il dolore fosse vivo, e l'infiammazione considerevole; o che la febbre fosse stata maligna, si userà incessantemente, quanto è stato indicato all'articolo dell'eruzioni, affine di attrarvi la materia morbifica, e ridurre in ascesso i tumori della metastasi, osservando in tutte le sue parti, la medesima direzione.

Siccome la materia della metastasi delle febbri infiammatorie, e di quelle che non sono nè putride nè maligne, è assai benigna nelle persone altronde ben costituite, affine di evitare il deposito alla coscia, ai testicoli o sopr'altre parti, nelle quali la



suppurazione è a temersi; si può, fino a che la parte minacciata non sia molto infiammata, tentarne la risoluzione coi mezzi raccomandati per la risoluzione delle infiammazioni in generale, purchè questi sieno comparibili collo stato dell' infermo. In tal caso se ne continua l' uso fino a che la febbre, ed i suoi accidenti, non raddeppiano; mentre se ciò avvenisse, la strada della risoluzione diverrebbe più pericolosa; e non vi sarebbe allora altro partito a prendere, che quello di ajutare la suppurazione, giusta gli avvisi da noi dati a questo effetto, parlando delle infiammazioni in generale.

Quando il deposito si fa sopra un viscere, dassi l' elettuario lenitivo N.<sup>o</sup> 51., ed una sufficiente quantità di siero vaccino, per promuovere e mantenere una diarrea moderata. Dopo questi preliminari, si prescrivono le acque minerali aperitive e lassative, fino ad intiera destruzione del male. Se il caso n'è suscettibile, si cerca di far precedere a questi rimedj i piccoli salassi, allorchè il viscere o la metastasi, se è fatta, sia presa da dolore permanente; e se il deposito degenerasse in una cronica ostruzione, farassi tutto quello, che è insegnato per disostruere un viscere inzeppato.

Rispetto alla metastasi fatta al cervello, al polmone, ed alla gola; nel primo caso il malato è ordinariamente in un letargico sopore; epperò si useranno immediatamente, per quanto sarà compatibile il suo stato, quelle cose raccomandate, per dissipare la congestione della materia morbosa al cervello, trattando delle affezioni soporose che nascono nelle febbri.

Se il petto o la gola fossero incomodate per tal modo, che il malato fosse minacciato da soffocazione, si praticherà prontamente, quanto è stato indicato per il catarro soffocativo, per la peripneumo-

nia o la squinanzia, come però la sua situazione potrà comportarlo; avvertendo sempre di non salassare, se non quando la infiammazione ciò esigesse assolutamente, e di eseguirlo più localmente che sia possibile colle scarificazioni o colle sanguisughe. Nel caso di metastasi al petto, si promuove prontamente l'uscita di corpo colla emulsione stibiata N.º 68., applicando contemporaneamente un vescicante fra le scapole; e se il deposito è alla gola, si usano esternamente i topici raccomandati per invitare l'ascesso, e forarlo nello stesso modo, come quello che si forma nelle squinanzie della gola.

*Delle scalfiture e delle piaghe (l).*

Non si trascurerà nelle lunghe febbri di prevenire, che gli ammalati s'impiaughino a forza di stare sempre collocati sulla medesima parte. Si avrà cura a questo effetto di far loro cambiar luogo e situazione: si stende una tela cerata sotto le natiche e sotto le parti, che sono soggette a riscaldamento; anzi si preferirà una pelle di cane acconciata a questo effetto. Dacché si rileva dalla rossaggine della pelle, che ciò voglia avvenire, si collocherà il malato in modo, che non giaccia sulla parte affetta: si bagnerà la pelle con vin bianco infuso con foglie di salvia, e lo si coprirà con chiara d'uova sbattuta con parte eguale di acqua vite. Se la pelle fosse scalfita, si sostituirà a quest'ultimo rimedio l'unzione colla pomata saturnina di Goulard o coll'unguento di cerusa (m); e si replicheranno queste medicazioni giusta

(l) Ciò è che volgarmente chiamasi decubito: *Il Tr.*

(m) La pomata saturnina di GOULARD, ossia il ceroto saturnino di GOULARD è fatto con once otto di cera bianca, ed altrettanto d'olio di mandorle dolci, assieme liquefatti a lento fuoco, e

il bisogno. Se la parte viziata fosse livida, un poco sensibile, è questo un segno di vicina gangrena, nel qual caso s'impiega tutto ciò, ch'è raccomandato per la cura delle infiammazioni esterne in generale, affine di rimediare alla gangrena, come anche allo sfacello, se la parte fosse insensibile, nera, e sfacellata.

DEI SEGNI, I QUALI ANNUNZIANO I  
SUCCESSI NELLE MALATTIE IN GENERALE,  
E NELLE FEBBRI IN PARTICOLARE.

Questi segni saranno riferiti estesamente, sia per tranquillizzare, sia per determinare le persone lontane dai professori dell'arte, ed ai quali la vita del malato è preziosa, a risolversi di chiamarli.

*Dei segni favorevoli nella febbre.*

Avvi luogo a sperare la guarigione del malato, se nel caso di epidemia, quelli che ne sono stati attaccati dalla medesima malattia, sono stati guariti; ed in generale quando il malato è di un buon temperamento, e che gli accidenti della febbre, dai quali è stato preso, sono piccoli e sopportabili. Se la

---

eni si aggiugne once quattro di estratto di Saturno: si rimestola fino a che la massa sia fredda, e poi vi si mette una dramma di canfora disciolta con un pd d'olio di mandorle dolci:

E' lodato questo cerotto per le ulcere callose, fistolose, scrofolose, e veneree, non che nella impetigine.

L'unguento di cerusa, chiamato ancora, unguento bianco di *Rhass* è fatto con tre once di cera bianca, ed una libbra d'olio rosato: si scioglie la cera nell'olio; si cola il miscuglio in mortajo di marmo, e si agita, fino a che sia raffreddato, e non compaja alcun grano: allora vi s'incorpora, bianco di cerusa preparato, once tre: si agita il miscuglio, fino a che sia il tutto intimamente unito; e si conserva in vaso.

Dissecca le piaghe, e le scottature; raddolcisce, e dissipa la tosse: *Il Tr.*

faccia, l'umore, la voce, e la traspirazione non sono molto cambiate; s'egli non perde intieramente il sonno; e se la sete è proporzionata all'ardore febbrile; se gl'ipocondrj non sono molto tesi, nè incomodati da forti dolori, come pure quando le orine sortono a dovere, nè sono molto infiammate, e che sono sedimentose, o contenenti una nube bianca; quando l'escrezioni della pelle, del ventre e della saliva non sono soppresse, nè molto alterate rispetto alla loro qualità; se il calore è eguale per tutto il corpo, e piuttosto umido che secco e focoso; se il polso è passabilmente eguale molle e dilatato; se il malato decombe sul dorso e sui fianchi, secondo ch'egli è abituato a farlo quand'è sano; finalmente s'egli ha il cervello libero e che i rimedj indicati e ben applicati facciano il loro effetto naturale; e che il malato sia sollevato colle spontanee evacuazioni che sopraggiungono.

*Dei segni svantaggiosi cattivi e mortali.*

Il successo della malattia diviene dubbio, se l'epidemia è mortale, ed a misura che si riconosce il contrario dall'esposto. Il pericolo cresce a proporzione, che gli accidenti della febbre si facciano sempre più acuti, e le remittenze più frequenti e più violente. Se il febbricitante non è alterato a ragione del calore, ch'egli ha, o se niente può diminuire l'ardore della sua sete, la lingua rimanendo molto secca ed aspra, molto imbrattata o coperta da una crosta bianca e secca; se l'umore è intieramente opposto al naturale del malato nello stato di salute; s'egli è disgustato di tutto, avendo nausea continue; s'egli rimette tutto ciò che prende, soprattutto quando nel medesimo tempo egli ha dolore, agl'ipocondrj, ch'egli respira difficilmente e



frequentemente, sospirando e dilatando le narici, o sollevando gli omeri e le omoplate. Si rileva ancora, che il pericolo cresce, se la traspirazione, la secrezione della saliva e l'evacuazione del ventre sono considerabilmente diminuite; o se 'l malato ha delle evacuazioni spontanee, le quali, lungi dal sollevarlo, lo snervano; s'egli orina poco o con molta difficoltà; se le orine sono molto chiare o molto rosse e nel medesimo tempo crude; s'egli è o molto assopito, o molto vegliante, o con considerevole delirio, o con trasporti; s'egli ha un'eruzione che non lo sollevi punto, nè sia stabile, o di colore di porpora inclinante al livido. Se il polso è molto frequente, inceppato, o duro ed ineguale, intermittente o molto debole; s'egli è incomodato da tremori o subsulti, da continua inquietudine delle labbra e delle mani, da movimenti convulsivi, come a dire da un singhiozzo ostinato. Cotali diversi accidenti sono tutti di cattivo augurio: il danno cresce dalla loro combinazione, e diviene estremo, allorchè la fronte, le tempie ed il collo si cuoprono di un sudore freddo; quando, col cervello imbarazzato, l'infermo perde dal naso alcune gocce soltanto di sangue; s'egli pischia sangue; se cangia bruscamente e ad un tratto di luogo, o s'egli è molto debole, decombente sul dorso, lasciandosi cadere il capezzale, e senza che se ne avveda, avere i piedi nudi e fuori del letto; se invece d'ingojare dolcemente, la bevanda cade con istrepito nello stomaco; se gli occhi sono lagrimosi e molto secchi; se l'occhio è smarrito; lo sguardo triste o fisso sul medesimo oggetto; se gli sfugge tutto sotto di se e senz'avvedersene; s'egli si occupa a spennacchiare le sue coperture, a cercare ed a prendere quì e là cose che non esistono se non nella sua immaginazione; quando, dopo essere stato indebolito dalla lun-

ghezza e violenza della malattia, si dichiara un deposito sopra un nobile viscere; quando il febbricitante s'viene con sospensione del battito del polso e con tremori convulsivi alla faccia, preceduti da orine nere, o che sono chiare e crude dopo essere state spesse. Questi accidenti e la subitanea cessazione di una gran sete, di un violento dolore, o di un considerevole trasporto al cervello, senza che l'arte o la natura vi abbiano avuta parte con una crisi abbondante, predicono la gangrena, od un deposito mortale, e ciò si confermerà, se il polso sarà piccolo ed ineguale. Ben presto insorgerà il freddo del respiro e delle estremità, il pallore del naso e delle orecchie, e l'agonia, che ordinariamente è accompagnata da incavamento delle tempia e degli occhi, da appassimento delle orecchie, e naso profilato; ciò che costituisce la faccia ippocratica.

Egli è in vista di questi diversi segni, e dalla riunione di molti di questi accidenti nel medesimo ammalato, che si rileverà lo stato suo. Le eccezioni da farsi, ed i pronostici particolari faranno inseriti nel trattato delle diverse specie di febbri, e delle altre gravi malattie.

## REGOLA DA OSSERVARSI

### *Nel principio delle febbri in generale.*

**D**Acche uno è preso dalla febbre, fino a che se ne conosce il suo carattere, cercherà di tranquillizzare il corpo e lo spirito: sarà collocato o sollevato in luogo piuttosto un po' fresco che troppo caldo, rinnovandone cautamente l'aria: osserverà il regolamento sotto la lettera H.: berà tiepida e spesso la tisana N.° 210., o l'una o l'altra delle bevande prescritte al detto regolamento; prenderà il

lavativo N.° 108. , ed ammeno di sintomi urgenti , e di positive indicazioni di praticare altri rimedj , prenderà unicamente nelle prime 24. ore , la mestura temperante N.° 130. Se la febbre dura meno di 24. ore , è questo un movimento febbrile passeggero , od un accesso di febbre intermittente ; e se dessa è una febbre efimera , sarà terminata al fine di 24. ore ; nel secondo caso , basterà che il malato continui il regolamento suddetto ; ed egli differirà di prendere altri rimedj , fino a che si sappia , se la febbre è terzana o quartana ec. Se al contrario ella durasse di più di 24. ore , continuando il suddetto metodo , si replicherà il lavativo mattina e sera , ed il malato farà dei piediluvj tiepidi di acqua-crusca colla giunta di una tazza d'aceto. Nel resto se ne starà in aspettazione. Nel caso che il febbricitante abbia la bocca cattiva , la lingua imbrattata , peso alla bocca dello stomaco o nausea , si purga immediatamente colla polvere emetica N.° 178. o colla pozione lassativa N.° 166. Se il basso ventre fosse incomodato da sintomi , i quali indicassero la sola pienezza degl'intestini ; e se il malato è pletorico , che 'l polso sia vivo , molto inceppato , o frequentissimo , o ch'ei risentisse dolore agl'ipocondrj , si premette a quest'evacuazioni , il salasso piuttosto al piede che al braccio. Nel caso di molto male di testa , si replica il salasso dopo la prima purga , e ciò reiteratamente come lo esigeranno la pletora , la veemenza del calore , o la qualità flogistica del sangue ; e se qualche dolore acuto indicasse la replica del salasso , innanzi di purgare il malato , si raddoppieranno i salassi per accelerare l'evacuazione . Il febbricitante continuerà a bere molto , ed eseguirà esattamente il suddetto regolamento , ammeno che non si preveda , sia per essere la febbre intermittente , o lunga . In allora si può accordargli zuppe leggiere ,

un pomo cotto o qualche altro cibo di questa natura, ed ajutando nel medesimo tempo le spontanee escrezioni che sopravverranno, non si ometterà niente di essenziale. Ben presto un esatto osservatore saprà, qual'è la specie di febbre, dalla quale è preso il malato, e lo curerà conseguentemente.

*Delle febbri d' accesso od intermittenti.*

Le febbri d' accesso sembrano nascere principalmente dalla retrocessa traspirazione, che si congiunge ad un ammasso di crudità nelle prime vie. Questa favorra vizia insensibilmente la massa umorale, ed i fomenti, che producono i parossismi più o meno distaccati.

All' avvicinarsi dell' accesso, il malato è pesante, sbadiglia; si stende e soffre spollatezza nelle membra. L' accesso comincia comunemente da un brivido al dorso e da raffreddimento delle estremità, e poco dopo il febbricitante è ordinariamente preso da tremore con stridore dei denti. Cotali sintomi sono accompagnati da qualche difficoltà di respirare: il polso, sotto il freddo, è piccolo, frequente, ed inceppato: le unghie pallide o di colore azzurgnolo, e le orine chiare e crude. Questo stato dura più o meno, ma di rado al di là delle due ore. Al declinare del freddo, il febbricitante soggiace a nausea, ed a vomito: poco dopo succede il calore, il quale dapprincipio è secco e pungente; ma che diviene insensibilmente più vivo; il malato è alterato, inquieto, qualche volta assopito; soffre comunemente grave male di testa o piccolo delirio. A poco a poco il calore scema, la pelle s' inumidisce, ed in seguito si bagna di copioso sudore: la durata del calore è varia; dura di raro più di otto ore; frattanto ch' egli è forte, il polso è frequente vivo



ed alto , e le urine rosse . La frequenza e l' elevazione del polso , come anche il calore , e gli altri accidenti della febbre diminuiscono col beneficio dell' umidore , e cessano contemporaneamente col sudore . Allora le urine sono molto sedimentose ; sedimento somiglievole ad un ' mattone pesto . La febbre cade ; il polso faasi naturale , e tranne la spossatezza , il febricitante trovasi bene fino al ritorno dell' accesso .

Quando l' accesso ritorna tutti i giorni ed alla stessa' ora , la febbre chiamasi *quotidiana* .

Quando l' accesso viene un giorno sì e l' altro nò , e circa alla medesima' ora , la febbre è chiamata *terzana perfetta o legittima* : e quando gli accessi di questa febbre avanzano o ritardano , si chiama *febbre terzana irregolare ed illegittima* .

Se il malato ha tutti i giorni un accesso , ma in modo che il terzo dì , rispetto all' ora dell' attacco , ed alla violenza del parossismo , ha relazione col primo , ed il secondo col quarto , la febbre è *terzana doppia* .

Allorchè gli accessi non vengono che un dì sì e due dì nò , la febbre è *quartana* ; ed ella è legittima , illegittima o doppia , secondo che imita i diversi caratteri della febbre terzana . Le febbri d' accesso prendono il nome di *febbri-continue-intermittenti* , quando i parossismi sono moltiplicati o prolungati in modo , che il malato prima d' avere il polso affatto naturale , è sorpreso dal brivido d' un nuovo accesso .

Dacchè si conosce l' andamento delle intermissioni , si segue la regola prescritta per la cura delle febbri in generale . Se il salasso fosse indicato , si fa durante il calore dell' accesso , ed innanzi che appaja il sudore , avvertendo di premettere le prime evacuazioni raccomandate per le febbri in generale . Si avrà ancora molta attenzione al temperamento ed alla natura della favorra , dalla quale l' infermo farà

incomodato . Si purgherà conseguentemente coi rimedj suggeriti per distruggere le differenti favorelle delle prime strade , e si cercherà di fare le grandi evacuazioni in modo ch' elleno siano terminate innanzi , che cominci il vicino accesso . Se il malato fosse di costituzione calda , pletorica , od incomodato da gran male di testa , si può rinnovare il salasso , come si è detto più sopra . Questo secondo salasso sarà altrettanto più utile , quanto la stagione sarà calda , il calore dell' accesso vivo o lungo , e che la febbre intermittente si avvicinerà sempre più alla continua .

Dopo cotesti preliminari , se il febbricoso è stemmatico , cacochimico , affetto da qualche ingorgamento , o da qualche male cutaneo , o soggetto a dolori reumatici , od altri mali cronici di tale natura , conviene per lo più lasciar sussistere la febbre ; mentre in simili casi la febbre d' accesso dissolte i visceri , e corregge gli umori : Il malato prenderà dunque , solamente fra gli accessi , la misura diaforetica N.º 125. ; ed immediatamente dopo ciascuna dose , un bicchiere del decotto amaro N.º 21. Se il freddo è grande , userà , prima dell' accesso , quanto è raccomandato per diminuire il freddo febbrile : con questi mezzi arriverassi a distruggere insensibilmente , non solo la febbre , ma nello stesso tempo diversi mali cronici , che avranno preceduto . Se sopravviene qualche indicazione per sopprimerla , si esamina lo stato delle prime vie , e se lo stomaco trovasi sovraccaricato , si replica primieramente l'emetico N.º 178. ; se nò , si purga in due o tre volte , col decotto febbrifugo-lassativo N.º 29. ; dopo di che potressi con tutta sicurezza arrestare la febbre coll' elettuario febbrifugo N.º 50. Le più volte l' opiata febbrifuga N.º 144. potrà esattamente rimpiazzare il decotto , e l' elettuario solido ; mentre

frat-

frattanto che sopprime la febbre, mantiene sciolto il ventre sufficientemente per ripulire il condotto intestinale, e prevenire gl' imbarazzi.

Quando non più converrà lasciare sussistere la febbre, sarà bene, l'arrestarla immediatamente. Il malato, dopo i rimedj generali sopraindicati, e dopo la purga col decotto febrifugo-laffativo, se rimane qualche apparenza di pienezza, prenderà preferentemente, e senza dilazione l' opiate febrifuga N.º 144., od in sua vece, l'elettuario N.º 50.

Le persone attaccate da febbre intermittente, useranno la dieta durante l'accesso. Beranno, nel tempo del calore, molt' acqua di cedro, acqua panata, o tisana comune, tiepida, ed un brodo alla fine dell' accesso: osserveranno, nell' interspazio degli accessi, il metodo prescritto sotto la lettera B., astenendosi però dal latticinio, e dagli alimenti farinosi: mangeranno poco, e prenderanno il loro ultimo pasto ad una sufficiente distanza dal prossimo accesso, affine la digestione sia compita prima del ritorno della febbre. Se sopravvenisse l' uno o l' altro dei riferiti accidenti, siccome si è parlato dei sintomi sopravvegnenti nelle febbri, vi si rimedierà nel modo indicato in quell' articolo.

Tali sono i mezzi per guarire le varie specie di febbri d' accesso; e la guarigione sarà radicale, se l'ammalato non soggiorna in uno di que' luoghi, dove le febbri periodiche sono endemiche; perchè l'aria, e la rea qualità dei cibi rinnovano incessantemente le due cagioni principali di cotesto male; di modo che diviene indispensabile di abbandonare un cotal soggiorno. Altronde, le febbri intermittenti, sono poco pericolose; quelle di primavera finiscono spesso innanzi il settimo accesso; e siffatti mali sono generalmente altrettanto meno a temere;



quanto gl' intervalli sono più lunghi: la febbre quartana è comunemente ribelle.

Quantunque il freddo ed il tremore sian sintomi ordinariissimi nelle febbri intermittenti, avviene però di tali, in cui gl' infermi non hanno che poco o nessun freddo. Si saprà, che la febbre non accompagnata da freddo, è intermittente, dal sedimento mattonoso delle urine. Le più volte queste febbri sono senza tipi, ed erratiche.

Più gli accessi sono lunghi, frequenti, ed il calore ardente, più il salasso, anche replicato, è conveniente; ed il tempo più proprio a farlo, è, come noi l'abbiam detto, durante il calore, ed innanzi che'l sudore comincia. In mancanza di una intermissione sufficiente per evacuare il malato, nell' intervallo di un accesso all' altro, si purgherà coll' emetico, sul declinare della febbre, affine l' evacuazione sia fatta prima del nuovo parossismo (a).

Innanzitutto di dare la chinacchina, se vi avesse qualche manifesta ostruzione in un viscere, o che la febbre fosse quartana, il malato prenda primieramente fra gli accessi, di sei in sei ore, una presa dell' elettuario aperitivo marziale N.º 52., soprabbevendo una tazza del decotto amaro N.º 21. Si continuino questi aperitivi, fino a che l' ostruzione sia tolta; e se la febbre fosse quartana, ne userà per quindici giorni almeno: in tali circostanze,

(a) Gli emetici nelle febbri intermittenti non solo servono a ripulire lo stomaco ed il condotto intestinale; ma promuovono ancora la traspirazione, e le altr' escrezioni. MEYER: *de eximio ipercacanthæ, nec non aliorum quorundam emeticorum refracta dosi exhibitum usu*: WOLF: *de vomitoriorum usu in febribus*; e di tanto n'è persuaso MELART del valore degli emetici in queste febbri, che suggerisce di esibirli unitamente alla chinacchina nelle stesse periodiche comatose: *diff. de tempore exhibendi emetica in febribus intermittibus maxime opportuna*: Il Tr.



purgherassi ogni cinque giorni col decotto lassativo aperitivo N.° 30. Se dopo essere stato replicatamente purgato, l'infermo continuasse ad avere sintomi di pienezza nelle prime strade, affine di rimediare alla favorra, ed alla febbre, basterà purgarlo dolcemente fra gli accessi col decotto febbrifugo e lassativo N.° 29.; fino a che la febbre sia intieramente distrutta; e se ciò tardasse, soltanto coll'opiatà-febbrifuga N.° 144.

Siccome nei fanciulli non puossi eseguire il metodo suddetto, si cercherà di guarirli col linimento-febbrifugo N.° 115. Se questo rimedio diminuisce il parossismo, si replicherà, e si adoprerà inoltre l'epitema-febbrifugo N.° 70. Nel caso, che cotesti mezzi fossero infruttuosi, dopo avere anticipatamente purgato il fanciullo con un emetico fatto con infusione di cinque ai dieci grani d'ipeca-cuana, in un'oncia d'acqua bollente; o con un purgante, siccome di siroppo di cicoria col rabarbaro: si danno i lavativi di chinacchina N.° 110., avvertendo di ragguagliare alla sua età la dose degl'ingredienti. I lavativi si potranno pure impiegare negli adulti, che rifiutassero di prendere i febbrifughi per bocca; e se ciò ancora non fosse praticabile, si tenterà di applicare sulla forcella dello stomaco, un ampio cataplasma di chinacchina polverata, cotta nel vin bianco, da rinnovarsi da che si farà efficace.

Le febbri autunnali in generale, e le febbri quartane in particolare, sono qualche volta sì ostinate, che il convalescente n'è replicatamente sorpreso fino alla vegnente primavera, o fino a che abbia cangiato d'aria. I fiori di camomilla polverati, presi alla dose di un denaro, di tre in tre ore, nell'intervallo degli accessi, hanno qualche volta sospeso le febbri quartane caparbie alla china.

La gonfiezza del ventre che sopravviene subitamente nei fanciulli, come anche l'enfiagione della

caviglia dei piedi negli adulti, sono comunemente indizj di guarigione. Cotali tumori si dissipano le più volte a misura che 'l convalescente riacquista forza. Se non pertanto l'enfiagione persistesse, si dà mattina e sera una diecina di grani di sale d'assenzio, in una tazza del decotto amaro N.º 21. Allorchè la febbre sarà stata lunga, o che 'l convalescente sarà molto debile; siccome, in questo caso, la tumidezza proviene da un rilasciamento generale dei solidi, si sostituirà al sale d'assenzio una ventina di grani di chinacchina polverata: si eserciterà moderatamente, e si freggerà dal sotto in su, mattina e sera, con flanella profumata di carabe.

Le poche persone, le quali muojono di febbre d'accesso, muojono nel freddo; quindi non si lascerà, quando il tremore sarà forte, di eseguire ciò che si è raccomandato più sopra per diminuirlo. S'egli avvenisse, che un febbricoso, sopra tutto di età avanzata, avesse negli accessi un sopore profondo e letargico, si solleciterà di arrestare la febbre col' elettuario-febbrifugo N.º 50.; imperocchè altrimenti nel susseguente accesso, arrischierebbe di morire apopletico.

Dacche la febbre è soffermata colla chinacchina, se sopravvenisse una tensione ed un permanente imbarazzo all'addomine, si esami, se non avvi ostruzione in qualche viscere, nel qual caso si cerchi di fare ritornare la febbre immediatamente, purgando a tal'uopo un pajo di volte colla pozione lassativa N.º 166. ed esponendo l'ammalato all'aria fresca. Se la febbre ritorna, più non si sopprime, ma si prescrivono i soli rimedj aperitivi sopra raccomandati.

La voracità prolunga le febbri d'accesso, e produce le recidive nei convalescenti: bisogna giudiziosamente evitare l'uno e l'altro per un buon regolamento. La mancanza dell'appetito, al contrario,

che è di lunga durata, mantiene il convalescente in uno stato di languore, e di debolezza, che gli accagiona pena. In questo caso ei prenderà doppia dose dell'elilire viscerale N.º 58.; sostanziosi cibi, in poca quantità, e spesso, ed esercizio dopo i passi. Se però si manifestassero sintomi di pienezza, non si potrà omettere di purgarlo col decotto febrifugo e lassativo N.º 29.; ed affine di prevenire la recidiva, che la purga potrebbe accagionare, prenderà all'indomani, e per alcuni giorni a digiuno, e nel coricarsi, una dramma di chinacchina polverata; avvertendo sempre, che ogni volta un convalescente di febbre d'accesso guarisce colla china, avrà bisogno di esser purgato, prima del termine dei quindici giorni al meno, dopo l'ultima sua ricascata (b).

G 3

(b) Gli altri febrifughi succedanei alla chinacchina, per le persone che la ripugnassero, sono, per esempio, la scorza del salice. AKERBERG: *de usu corticis salicis in febribus intermittentibus*. GUNTIVS: *de cortice salicis cortici peruviano substituendo*; la cariofilata volgare, ossia il geo urbano di Linneo. ANJOU: *de radice caryophyllatae vulgaris*, ec.; l'ippocastano. ZANICHELLI: *lettera intorno alla facoltà febrifuga dell'ippocastano*. TURRA: *lettera ed osservazioni della facoltà febrifuga dell'ippocastano*; l'arnica. COLLIN. *Arnica in febribus vires*, ec.; l'opio. SCHÆRTLICK, *de usu opi in febribus intermittentibus*, in FRANK, *delectus opusculorum medicorum*, Vol. 1.; la quassia. SEVERIUS. *Commentarius, in quo medicatae quassiae vires expenduntur*; il caffè. AUDONIUS; l'olio animale del Dippellio WERLHOEF, & LINNÆUS: Nei Commentarj di Bologna leggesi un rimedio febrifugo fatto coi vegetabili indigeni, preferibile alla china, quando per particolare indicazione, o per assoluta-antipatia non si potesse amministrarla, proposto dal Sig. Giuseppe MOSCA Medico Napoletano.

Si prendono eguali porzioni di sughi depurati di scordeo, di cardosanto, di camomilla, e di centaurea minore ridotti con sufficiente quantità di purissimo zucchero a consistenza di sciloppo. Premessi i rimedj generali suggeriti dalle circostanze particolari d'ogni febbre e d'ogn'individuo, dassi il siroppo alla dose di un'oncia agli adulti, sei o sette ore prima del parossismo, e si continua l'uso fino a che sia cessato il sospetto di ricorrenza di nuova febbre. Nelle febbri continuaci e pericolose, si può raddoppiare, e triplicare la dose nello spazio di due o tre ore; ritenuto sempre che l'ammalato sia preventivamente purgato, e scevro da ostruzioni od intasamento delle viscere dell'addomine: *Il Tr.*

*Delle febbri continenti, o continue non remittenti.*

Le febbri continenti, delle quali il carattere è di non avere intermissione, come le febbri d'acceso, nè remissione, come le febbri continue remittenti, sembrano principalmente derivare da plethora, da rarefazione, da riscaldamento, da tenacità calda del sangue, di cui è stato detto precedentemente.

Cotesta specie di febbre è soventi efimera; ma vedesi più comunemente durare, senza calmarli, per sette giorni. Allorchè oltrepassa questo termine, la malattia è fomentata da fermenti, che sono insensibilmente passati dal condotto cibario nella massa umorale, o dalla materia della soppressa traspirazione, e che mantiene l'eretismo febbrile.

*Della febbre efimera, o della prima specie delle febbri continenti.*

La febbre efimera è altrettanto dolce che corta, dappoichè non oltrepassa le 24. ore: è comunemente prodotta da un leggiero riscaldamento, o soltanto dalla rarefazione del sangue. La frequenza, e l'alzata del polso, il calore, l'alterazione, l'oppressione ed il male di testa, sono i precipui sintomi di tale malattia, ma moderati.

La febbre efimera finisce colla dieta, e precauzioni indicate nella condotta da osservarsi nelle febbri in generale. S'ella è familiare al malato, si farà trar sangue in primavera, ed in autunno; ei prenderà, dopo questi salassi di precauzione, tutte le mattine per 15. giorni, una pinta di siero vaccino, od il brodo rinfrescante N.º 14.; e si regolerà cautamente nei cibi, bevande, ed esercizi, che non sieno riscaldanti.



*Seconda specie di febbri-continenti .*

I sintomi sono più considerevoli che nella precedente; e durano al di là delle 24. ore. Il malato è rosso in volto, un po' agitato, ed incomodato da veglie, o da leggiere sopore, senza o con piccolo delirio: le orine sono torbide, e durante il corso del male, il polso è assai uguale, mediocrementemente frequente, e sollevato. Questa febbre non dura più di sette giorni, e non è pericolosa; ella proviene comunemente da pletora congiunta a un caldo condensamento del sangue, ma non molto rimarchevole; e se dessa non è frastornata nel suo corso, termina ordinariamente col beneficio di un sudore abbondante, o di una emorragia da naso.

Il febbricoso stia nel regolamento prescritto sotto la lettera H.: faccia i pediluvj tiepidi d'acqua-crusca con una tazza d'aceto, e si sbarazzino gl'intestini col lavativo domestico N.º 108. Dopo cotesti preliminari si farà immediatamente un generoso salasso, da replicarsi dopo le 24. ore, se la pletora lo esige, o che 'l primo sangue sia stato troppo tenace e caloroso, o finalmente che il male di testa fosse considerevole. Berà inoltre molta tisana comune N.º 210.; o limonea leggiere, e tiepida.

Se 'l malato ha dell'impiastramento nelle prime strade, due ore dopo il primo salasso, gli si darà il lavativo purgante N.º 111.; poi la polvere temperante N.º 190.; e se dopo il secondo salasso, fosse tuttora agitato, od incomodato da veglia, verso la sera, l'emulsione calmante N.º 66. Gli si manterrà sciolto il ventre col mezzo del lavativo domestico; e continuerassi su questo piede sino a che la febbre sia caduta, o che 'l febbricitante abbia sintomi indicanti sudore, emorragia, o qualche altra critica

evacuazione. Si farà in tal caso, come per altri accidenti febbrili, il raccomandato per i sintomi delle febbri in generale. Non si purgherà in questa specie di febbre, che due giorni dopo la sua intiera cessazione, ammeno che 'l malato non abbia sintomi evidenti d'impiastramento nelle prime strade, nel qual caso si purgherà colla pozione minorativa N.º 168. Il convalescente prenderà appoco appoco cibo più sostanzioso; e dopo la purga, osserverà per quindici giorni, il regolamento sotto la lettera B., colla precauzione di astenersi dal latte e dagli alimenti farinosi.

*Terza specie di febbri-continenti.*

Questa è assai frequente: i suoi principj sono tali come la precedente; ma l'abbattimento è più considerevole, ed i sintomi crescono più o meno prontamente, a ragguaglio che il calore, l'alterazione, le inquietudini, e i mali di testa diventano molto rimarchevoli. Allorchè la febbre è nel suo vigore, il malato ha la lingua molto secca, gli occhi lagrimosi, e molto calore agl' ipocondrij: è asfopito, o veglia ostinatamente con delirio: la pelle è molto secca, e focosa; le orine o molto rosse, o crude, o sangose.

Quando cotesta specie di febbre continente è viva nel principio, e dura sino verso la fine, quasi nel medesimo grado di violenza, ella non è pericolosa; curandola come la seconda specie, vedrassi terminare parimenti, il nono, undecimo, o 'l quattordicesimo giorno.

Allorchè per lo contrario la febbre od i suoi accidenti crescono insensibilmente nei primi giorni, continua ordinariamente a crescere del pari per alcuni altri giorni consecutivi: ella si mantiene nel

medesimo numero di giorni nel suo più alto grado di violenza; poi declina appoco appoco, com'era accresciuta; e le cagioni morbose, a misura che si digeriscono, si evacuano per orina, per traspirazione, e verso il fine del male, per sudori copiosi.

Ma quando invece di queste benefiche escrezioni, la lingua, la quale dapprincipio non era che secca, viene ad impaniarsi, e che sopravvengono accidenti allo stomaco ed al basso ventre indicanti, che lo scarico della materia morbosa si rivolge nel condotto cibario; allora egli è da temere, che la malattia non degeneri in febbre putrida. In questo caso la febbre continente, invece di seguire il suo corso ordinario, acquisterà il carattere di febbre putrida, della quale si parlerà in seguito.

Siccome la seconda specie di febbri continenti sembra principalmente divenire dalla pletora congiunta al caldo condensamento del sangue; la terza specie ha di più per cagione un fomite acrimonioso negli umori. Le prime vie non sembrando essere evacuate nei principj della malattia; l'una e l'altra terminano spesso tutto ad un tratto per mezzo del sudore o dell'emorragia critica nasale; mentre che nella prima specie, le materie morbose sono espulse poco a poco, nel declinare della febbre, per le diverse escrezioni naturali, ed in particolare per via delle urine e della traspirazione: Si tratta dapprincipio la terza specie coi medesimi riguardi della seconda. Il malato prenderà per cibo, poltiglie fatte coll'acqua, condite con sugo di cedro ed un pò di zuccaro (c): berà abbondantemente, preferendo le

---

(c) Ciò che si chiama dai Turchi, e dal REDI ancora, pan lavato: Si troverà nel decorso dell'opera sempre proposto per cibo degli ammalati le poltiglie fatte con orzo, o con avena bollite nell'acqua, o nel brodo, secondo lo stato del male, invece che da noi si costuma il pancotto, il pangrattato, ossia pane grattugiato, e bollito con brodo, e con acqua: *Il Tr.*

diverse bevande acidette nominate sotto la lettera D. Se dopo il secondo salasso, il calore, la secchezza della pelle, e i mali di testa fossero ancora molto confiderevoli, potraffi, circa dieci ore dopo, salassare per la terza volta in più piccola quantità. Questi salassi si faranno alternativamente negl' intervalli al braccio ed al piede, e replicarli fino a quattro volte, se il periodo dell' aumento è lungo e violento.

Dacche questa febbre si calma, il malato può nutrirsi di brodo di pollo, o di un brodo debole di vitello, alterato col cremore d' orzo; bere acqua d' orzo od orzata leggierissima, continuando l' uso dei pediluvj, dei lavativi, e della polvere temperante fino al termine della febbre. In allora s' insisterà meno, perchè bea; gli si darà una sufficiente dose dell' emulsione stibiata N.º 68. perchè possa scaricare un pajo di volte in 24. ore, e sulla sera il lavativo N.º 108. Si può dargli progressivamente dei brodi un pò più forti. Il terzo od il quarto giorno della convalescenza si purga colla pozione minorativa N.º 168., da ripetersi poi ogni otto giorni, nel quale interspazio stia prudentemente al regolamento prescritto alla lettera B. Rispetto agli accidenti, se la veglia, e l' agitazione la indicassero, darassi verso sera l' emulsione calmante. Si rimedierà tanto ai sintomi febbrili che alle diminuzioni delle secrezioni naturali, e si favoriranno l' evacuazioni critiche, com' è stato insinuato parlando della febbre in generale: Si fa ciò, che avvi a sperare ed a temere, consultando quanto abbiamo detto nel pronostico generale delle febbri. Se la febbre continente degenerasse in putrida, necessita di distinguerla dalla continua putrida, la quale ha delle remittenze, e di cui parlerassi in seguito; dappoichè in questa le materie peccanti derivano dalle prime vie; invece che le febbri continenti putride divengono ordinariamente



da un caldo condensamento ed acrimonioso della massa umorale, o da un eretismo nei solidi, per cui i prematuri evacuanti delle prime vie non farebbono che accrescere, ed i di cui effetti, non si ponno diminuire se non dopo il salasso, e facendo bere moltissima bevanda antisettica, la quale diluisca il sangue e rilasci gli organi secretorj. Ecco perchè si lascerà di purgare nei principj di questa febbre; e se vi fossero indicazioni evidenti di purgare, ciò farassi solo colla pozione minorativa N.º 168., e dopo di avere sufficientemente diminuito il volume del sangue col salasso. Si purgherà il convalescente due giorni dopo che la febbre sarà intieramente tolta, colla pozione lassativa N.º 166., che si replicherà secondo il bisogno, usando nell'intervallo i cibi più leggieri del regolamento prescritto sotto la lettera B. (d).

---

(d) Alla classe delle efimere si ponno aggiugnere quelle chiamate efimere maligne, efimere gangrenose, od efimere contagiose, ossia prodotte da un putrido miasma: Avviene pur troppo frequentemente, che una persona sana malata di una febbre, la quale seco porta la morte in poche ore, senza che si sappia definirne la malattia; perchè appunto nata da improvvisa, corta, e micidiale febbre.

Scorrono queste febbri il loro periodo nel corto spazio di 24. ore, coi sintomi proprj o di malignità, o di gangrena, o di dichiarato contagio, a cui vi si provvede giusta i precetti dati dal n. a. nelle diverse specie di febbri maligne, o contagiose, ec., e come con copia di clinica erudizione è stato consigliato dal cel. BORSIERI nelle sue istituzioni di medicina-pratica: *Id Tr.*

DELLE FEBBRI MISTE  
CHE SCORRONO IL LORO PERIODO  
SENZA REMITTENZA,  
O CON REMITTENZE IRREGOLARI,  
E CHE SI RIDUCONO  
ALLA FEBBRE INTESTINALE,  
ED ALLA FEBBRE PUTRIDA MALIGNA (a).

*Febbre intestinale o gastrica.*

**L**A febbre intestinale, che è frequentissima, è preceduta, ed accompagnata da sintomi dell'una e dell'altra favorra nelle prime vie, delle quali si è parlato. I fomenti ch'ella comunica alla massa dei fluidi, uniti alla retrocessa traspirazione sul tubo cibario, producono codesta malattia.

Ella si conosce dunque dalla preesistenza ed esistenza dei sintomi della favorra. Di più l'ammalato è oppresso: sente languore nelle membra, e brividi, che nel principio della febbre alternano col calore. Rispetto alla frequenza del polso, ed agli accidenti famigliari ai febbricosi, essi sono più o meno rimarchevoli. La febbre intestinale finisce qualche volta colla diarrea, o con un sudore critico; allorchè le remissioni sono frequenti e lunghe, ella degenera spesso in febbre intermittente. Nel caso contrario, specialmente quando la favorra è cal-

---

(a) Ogni volta, che si troverà la parola *remittenza*, non intendesi di esprimere menomamento, o declinazione della malattia, ma bensì tutt' all' opposto: cioè a dire, raddoppiamento del male, giusta la comunemente ricevuta definizione di SAUVAGES, il quale parlando delle febbri remittenti, disse: *Febres remittentes illæ sunt, quæ ab initio ægritudinis ad finem usque ægrum non dimittunt, sed determinatis temporibus, in quocumque stadio, adeoque plures cum horrore, vel oscitatione, frigore, aut simili quodam spasmodico conatu recrudescent, subsequente caloris, vel aliorum symptomatum augmento citra ullam causam evidentem, vel absque principio procatartico*. Nosol. tom. 1. pag. 169. ediz. di Venez. 1772. *Il Tr.*

da , degenera facilmente in febbre putrida , la quale sarà sempre benigna , e si solleciteranno le indicate evacuazioni .

Quando la febbre intestinale è ben curata , non è pericolosa . Dura ordinariamente dai nove ai quattordici giorni ; di rado oltrepassa i venti .

Gli autori parlano punto o poco di questa febbre ; e volendo noi svilupparne le variazioni , ci condurrebbe ad una prolissità , la quale non può aver luogo in un' opera compendiata , com'è questa .

Siccome avvi dell' analogia fra la favorra delle prime vie , ed i fermenti che di là si sono distribuiti nella massa degli umori , non bisogna sbagliare sulla loro qualità . Si comincia la cura di questa malattia , evacuando la favorra , che esiste , secondo i varii dati parlando delle favorre ; il malato non sarà lassato se non se con evidenti indicazioni , e dopo avere replicatamente sbarazzate le prime strade col lavativo purgante N.º 211. Fatte le prime evacuazioni raccomandate per la favorra , prenderà ancora giusta il bisogno , per tre , quattro o cinque giorni , alla mattina , l' emulsione stibiata N.º 68. , la quale mantenendo libero il ventre , invece di frastornare le altre escrezioni , anzi le ajuterà ; ed al mezzo-giorno , due prese della polvere di cremore di tartaro N.º 175. L' ammalato essendo sufficientemente purgato , userà , se la favorra è stata calda , metà dose del decotto antisettico N.º 22. ; e se la favorra fosse fredda , il decotto febbrifugo N.º 28. , da continuare fino ad intiera cessazione della febbre . Rispetto agli accidenti febbrili , che potessero sopravvenire , si consulti l' articolo della cura dei sintomi della febbre in generale ; e per ciò che riguarda alimento e bevanda , più la favorra è stata calda , biliosa , putrida od atrabile , più famigliari saranno le bevande acidette riferite sotto la lettera D. Si

attenghi per suo cibo alle poltiglie ed altri cibi farinosi prescritti sotto la lettera H., e cotti solamente nell' acqua. Preferirassi nella favorra fredda, la tisana comune N.º 210., che si potrà aromatizzare leggermente con zucchero strofionato sulla scorza di cedro: le poltiglie ponno essere ancora tagliate con metà di brodo di vitello o di pollo. Nella convalescenza il malato si regolerà secondo il raccomandato per le febbri continue remittenti, non omettendo di purgarsi più volte.

### *Febbre putrida benigna.*

Si è parlato dei principj e delle cagioni di questa malattia nel metodo della terza specie delle febbri continenti, e della febbre intestinale. A misura che i fomenti si esaltano e che inclinano alla putrida, l'abbattimento cresce, il polso diviene piccolo, frequente, e qualche volta irregolare: sopravvengono nuovi sintomi febbrili; i precedenti crescono, e la testa si altera.

Le prime evacuazioni essendo fatte nel modo sopra enunciato, frattanto che si dà l'emulsione sfiabiata, ed il cremore di tartaro, da prolungarsi secondo il bisogno, si applicherà alla pianta dei piedi il cataplasmo N.º 16.; e se ciò non solleva la testa, i vescicanti alla polpa delle gambe. Dacchè la febbre comincia a finire evidentemente, si usi il decotto, o l'elettuario febbrifugo come nella febbre intestinale; e così pure il malato si regolerà rispetto alla bevanda ed al cibo, e non altrimenti ancora nella convalescenza.

### *Delle febbri continue remittenti.*

Si conoscono le febbri continue, dalle esacerba-



zioni, e dalla diminuzione della febbre, che succedono alternativamente nel maggior corso della malattia. Queste febbri sembrano consistere nella complicazione di una febbre d'acceso con una febbre continente, ed il loro corso varia secondo la specie della febbre d'acceso, ch'è unita alla continente; di modo che le remittenze imitano gli accessi della febbre cotidiana o terzana, o quelle della terzana doppia ec. Ciò nulla ostante le remittenze sono ordinariamente irregolari, e non cominciano che al fine di due o più giorni della malattia. Esse corrispondono rispetto alla forza, alla quantità e qualità della favorra, ed ai fomenti sparsi nella massa degli umori. Quando coteste febbri sono epidemiche, hanno soventi un carattere di malignità.

Siccome le cagioni, il carattere, e la cura delle febbri continue-remittenti differiscono, egli è essenziale di classificarle a dovere. Si ponno dividerle in febbri continue-catarrali, biliose, verminose, ed ardenti. Si saprà, se elleno sono maligne dalla qualità dell'epidemie, e dal rapporto, che quei mali avranno alle febbri maligne, delle quali si parlerà in seguito.

*Febbre continua-catarrale.*

La febbre continua-catarrale è frequentissima nei climi, dove l'aria è soggetta a subitanee variazioni. Ella è soventi epidemica, e qualche volta maligna. Tale malattia sembra derivare principalmente dalla ritenuta perspirazione, la quale condensa, ed altera la linfa, al segno che la circolazione nei vasi linfatici è talmente inceppata, che la materia perspirabile retrocede sul polmone, sullo stomaco, e sul condotto cibario.

La febbre continua catarrale comincia ordinariamente da una grande rilasciatezza, e da sintomi

reumatici. Il malato prova del freddo per tutto il corpo, il quale predomina di più il dorso e le estremità inferiori, che sono freddissime. Qualche tempo dopo, il freddo comincia ad alternare con un calore poco considerevole al principio, ma che durante la notte diviene molesto. Egli è alterato, inquieto, agitato, oppresso, o rauco; egli tosse, e qualche volta sente difficoltà nell'ingollare, e comunemente ha uno spesso e pressante bisogno d'orinare. La testa è piuttosto caricata, che fortemente addolorata; il palato e le narici sono riscaldate e secche; la lingua è bianca; le reni, le membra, e qualche volta il petto sono incomodati da dolori, ed il malato ha sopore o leggiera alienazione di spirito. Verso la mattina succede a questi sintomi un abbondante madore, per cui la remittenza finisce. Fra 'l giorno la febbre è assai moderata; ma la remittenza rinviene particolarmente verso la sera; le orine che il malato rimette nel vigore della remittenza, sono rosse e crude; e sulla fine depongono un sedimento rosso, pallido, o bianco. Tale è il corso ordinario della febbre continua-catarrale, che non è maligna. Ella non è molto pericolosa, e dura di rado più di 15. giorni.

Se il brivido, che precede la remittenza, è considerevole, si farà per diminuirlo ciò che è stato detto a quest'uopo, parlando del freddo febbrile. L'aria della stanza farà piuttosto un poco calda che temperata. Se il calore che succede, è secco e vivo; e se l'ammalato è molto oppresso, ha la gola infiammata, od un dolore fisso e vivo al petto, od altrove, si salassi al braccio, e ciò durante il calore della remittenza ed innanzi che comincia l'umidore. Se il sangue fosse cotennoso, o che 'l febbricitante fosse di una costituzione calda o sanguigna, o s'egli è stato sollevato col primo salasso, si replica  
nella

nella susseguente remittenza. Nell' intervallo delle remittenze, prenda ogni quattro ore, una polte d'avena nell' acqua, condita con un po' di zucchero; e se la febbre fosse moderata, si dia un brodo di vitello o di pollo, alterato col cremore d' orzo o di riso; può ancora mangiare un pomo cotto. Durante tutto il corso di questa febbre, bea molt' acqua d' orzo raddolcita col mele bianco o col siroppo di capelvenere, e se 'l calore fosse vivo, coll' ossimele semplice. Sussistendo il sudore, che sopravviene alla fine delle remittenze, la sua bevanda sia una leggiera infusione di fiori di sambuco, raddolcita come le precedenti bevande, applicando il lavativo domestico N.º 108. al fine di ciascuna remittenza; e dopo che l' umidore avrà cessato. Altronde tanto per diminuire i mali di gola, la raucedine e la tosse, quanto per facilitare la spettorazione, si useranno i diversi rimedj stati indicati parlando delle malattie catarrali; e si avvertirà di dare i becchici colla distinzione ch' è stata fatta relativamente alla consistenza della materia espettorata. La febbre notabilmente diminuita, si comincia dal purgare l' ammalato molto dolcemente, a tal effetto dando dopo ciascuna remittenza una sufficiente dose d' infusione pettorale lassativa N.º 104., od una presa dell' elettuario lenitivo N.º 54. soprabbevendo il siero di latte. Se il petto o le prime vie fossero cariche di umori catarrali, mucosi, e tenaci, s' incorporano in ciascuna presa del nominato elettuario due grani di Kermes minerale, continuando col mezzo di cotale regolamento, a diluire, a dividere, ed a precipitare questi umori: terminata la febbre, si purga il convalescente colla pozione N.º 167.

Quando la febbre continua-catarrale prende od ha già preso un carattere di malignità, la lingua è molto impaniata, e si cuopre di una pasta fosca •



bianca e tenace. Il salasso allora è pregiudizievole, e non diviene necessario, se non quando fatti sul cervello o sul petto una congestione di materia catarrale, accompagnata da sintomi indicanti il salasso, e dei quali si è parlato nella cura dei sintomi della febbre in generale. Egli conviene ordinariamente, nella febbre catarrale maligna, il cominciare dalla polvere vomitiva d'ipecacuana N.º 192.; dopo questa per tutto il corso della malattia, immediatamente dopo la remittenza, si dia una presa dell'elettuario lenitivo, com'è stato detto più sopra, col Kermes, soprabbevendo brodi chiari di polmone di vitello. Bea molta tisana comune N.º 210., tiepida, ed affine di diminuire col sudore il fomite-catarroso, al cominciare dell'umidore, si diano tre o quattro cucchiaj della mistura diaforetica N.º 125.; e durante il sudore, molta tisana di scorzonera N.º 217. Nel resto per diminuire i sintomi febbrili, e per facilitare l'espettorazione, si farà quanto è stato superiormente detto.

Se gli accidenti della testa divenissero rimarchevoli, converanno i sinapismi, ed i vescicanti nel modo raccomandato per la febbre putrida benigna; e se sopravvenisse un'eruzione, un'evacuazione, o qualche altro dei febbrili accidenti già nominati, si regolerà, come è stato prescritto per questi casi. Avvertirò soltanto, che i vescicanti fra le due scapole, e sul lato dolente, sono efficacissimi per i dolori esterni del petto; e quelli che si applicheranno alla polpa delle gambe, sono preferibili per gli accidenti della testa, come anche per la maggior parte dei sintomi che insorgono nella febbre catarrale, e specialmente nell'oppressione, e nella soppressa espettorazione, come avviene in quelle febbri maligne.



*Della febbre continua-biliosa.*

La febbre continua-biliosa è frequente. Ella sembra provenire congiuntamente da una bile esaltata, che è in effervescenza nelle prime vie, e dalla calda tenacità, o calda acrimonia del sangue, di cui si è parlato. Il corso di questa malattia varia secondo la quantità e qualità dei fomiti, che si trovano nelle prime vie, e secondo che il sangue è nel medesimo tempo più o meno riscaldato, spesso, od acre. Le remittenze non cominciano ordinariamente che al fine di due giorni: ritornano qualche volta cogli accessi della febbre terzana, ma imitano per lo più la febbre terzana doppia illegittima. Quando non vi ha diminuzione considerabile da una remittenza all'altra, ella ordinariamente partecipa del carattere della febbre continente putrida.

Il malumore, lo scoloramento del volto che volge più o meno al giallo, e l'abbattimento accompagnato da mali di testa, d'amarrezza di bocca, da svogliatezza, da un senso di calore e di pienezza allo stomaco ed agl' ipocondrij, e qualche volta ancora da un tremore interno, sono i sintomi coi quali comincia la febbre biliosa. A questi accidenti vengono in seguito il calore febbrile, l'alterazione e le nausea. La lingua è molto imbrattata; l'indebolimento e i mali di testa crescono; il malato ha le membra come rotte; è soggetto a vomitare umori acri e biliosi, od a rendere simili materie pel secceffo, e ad avere prematuri sudori, i quali, invece di sollevarlo, lo debilitano. La sete diviene ardente; il malumore più fastidioso, ed un' assoluta avversione crescono. Il polso è frequente e comunemente duro. Dappprincipio le orine sono quasi naturali, ma in seguito diventano sempre più

fosche e con poco o niſſun ſecimento. Cotali ſintomi crefcono confiderevolmente nel tempo delle remittenze, e ſi moltiplicano al ſegno, che il malato cade nel delirio con ſopore. Egli ſoggiace a ſuſulti, e ad altri accidenti riferiti parlando dei ſintomi, che ſopravvengono nelle febbri. Durante la malattia, la lingua rimane molto paſioſa, e più i varj ſintomi indicanti la pienezza delle prime vie perſiſtono o ritornano dopo replicate evacuazioni, più la malattia farà lunga. Si ſaprà, ſe avvi da ſperare o da temere, dai prognofici da noi dati ſulle febbri in generale.

Nella febbre continua-bilioſa egli è eſſenziaſſimo di purgare il malato immediatamente, e d'impedire che i ſomiti delle prime vie non ſ'inſinuino maggiormente nel ſangue. Che lo ſtomaco appaja eſſere o nò imbarazzato, ammeno non per tanto che un poſſo pieno ed inceppato, un dolore fiſſo o molto calore agl' ipocondrij, non indicaffero che ſi deve cominciare dal ſaſſo (b), ſi eſiſce ſubito la pol-

(b) Importa moltiffimo di avvertire a queſte indicazioni, per eſeguire, od omettere il ſaſſo in cotefte ſpecie di febbri. GORTER ſoltenne, che il ſaſſo nelle febbri bilioſe è ſempre inutile. HUXHAM più chiaramente ſi eſpreſſe, dicendo: *non videtur, cui bono hoc in caſu ſanguis mittatur. Sanguinem enim detrahendo cum ſanguine vires perducuntur*: Oper. phyſ. med. TISSOT non fa cenno del ſaſſo, parlando della febbre epidemica di Loſanna, oltre altri molti ſcrittori, i quali concordemente negano il biſogno di trar ſangue nelle febbri bilioſe:

Unque non ſi avrà mai a ſaſſare nelle febbri bilioſe? Nò; *Se un poſſo pieno, come dice il N. A., ed inceppato, un dolore fiſſo, o molto calore agl' ipocondrij*, una vera pletora ſi riconoſce nel febbricoſo, deveſi infallibilmente premettere la cacciata di ſangue agli altri rimedj, come beſſimo ci addottrina HOFFMANN: *Etiam in illis morbis*, egli dice, *quibus alius V. S. directe non convenit, ſemper omnino primo omnium ſolvenda plethora, tum ad præſcindenda ſymptomata truculenta, tum etiam ad faciliorem ſanationem*. Diſſ. de V. Snis abuſu §. x Si deve anche ripetere il ſaſſo, ſe riſcono i ſintomi con maggiore ſierchezza, quali ſono, p. e., la febbre, la oppreſſione, il dolore di teſta e dei lombi ec.

vere emetica N.º 178.; dopo l'operazione dell'emeticò, il cristiero purgante N.º 111., ed all'indomani la pozione lassativa N.º 166.: affine d'impedire alle materie delle prime vie, il passaggio nel sangue, ogni qual volta la febbre non sia rimarchevole, si differisce il salasso sino alla prima remittenza che succederà a quest'evacuazione. Questo salasso farà di 10. once circa, fatto dal braccio, durante il calore della detta remittenza, e prima che cominci il sudore.

Nei casi nei quali dopo la remittenza lo stato della lingua e l'imbarazzo dello stomaco dinotasse, che il ventricolo è ancora caricato, si rinnova l'emeticò, e questo nel declinare della febbre. Diversamente si replica due o tre volte la pozione suddetta negl'intervalli delle tre o quattro prime remittenze; ammeno che il malato non sia debolissimo nè molto dilicato; nel qual caso bisogna purgarlo colla pozione minorativa N.º 168. Egli basterà comunemente di purgarlo in seguito alla fine di ciascuna remittenza col lavativo sopraindicato, quando però forti indicazioni di evacuare superiormente od inferiormente non richiedino di rinnovare il vomitivo o la purgazione sopra raccomandati, mentre non si bilancerà di ciò replicare; atteso che questa è la strada per abbreviare la febbre continua-biliosa. Rispetto al salasso, si replica una o due volte, se la pletora o la costituzione calda o sanguigna del malato lo eligeranno, e secondo la febbre che sussiste fra le remittenze, è considerevolissima, e fatto piuttosto

H 3

---

Merita a questo proposito di essere letta la diss. di APPEL *De phlebotomia, in primis in febribus biliosis, recta administratione*, inserita nel tom. VI. *Sylloge Selectiorum Opusculorum argumenti medicographici* di BALDINGER. Il Tr.



al piede che al braccio . Se la febbre non si aumenta , e non sopravvengono sintomi indicanti di sollecitare il salasso , si aspetta per farlo , il calore della remittenza . Durante tutto il corso della malattia , l' infermo userà il regolamento sotto la lettera H. : i brodi saranno acquosi debolissimi e conditi con sugo di cedro . Berà molto per tutto il corso della malattia , o lunga limonea , o i giulebbi acidetti , raccomandati per questo regolamento . Fatte le grandi evacuazioni , il malato non prenda altri medicamenti che la tisana di cremore di tartaro N.° 211. , il siero di latte N.° 148. , o la polvere di cremore di tartaro N.° 175. , in dose sufficiente per procurare due uscite di corpo in 24. ore . Questi lassativi saranno dati la mattina o nel declive fra la remissione . Berà moltissimo ad ogni volta delle bevande acidette nominate , ed al fine di ciascuna remissione gli si applicherà il lavativo N.° 108. Se la malattia strascinasse in lungo , ed il febbricitante fosse molto indebolito , si sosterrà con migliori brodi , con un pomo cotto , con gelatina di pomi cotogni o di ribes ; e dacche la forza e la durata delle remissioni saranno sensibilmente diminuite , affine di terminarle intieramente , dassi il decotto antisettico N.° 22. , continuato sino a che la febbre sia affatto cessa . Rispetto agli accidenti , che sopravverranno , vi si rimedierà , come nelle istruzioni date nella regola dei sintomi delle febbri in generale .

Quando la febbre è terminata coi suddetti febrifughi , non si purga il convalescente che alla fine di 8. giorni circa ; ammeno che non vi siano indicazioni evidenti per farlo più presto : ciò si eseguisce col decotto febrifugo e lassativo N.° 29. Durante la convalescenza gli si concede poco per volta una maggiore quantità di cibo , consistente negli alimenti più leggieri del regolamento indicato sotto la lettera B.



Se in vista dell' epidemia , o dei sintomi maligni , vi fosse luogo a credere , che la febbre fosse biliosa-maligna , non si cambierà niente del regolamento prescritto , evitando solo più ch'è possibile il salasso , ed usando altrettanta diligenza a procurare le prime evacuazioni utili , a sopprimere le nocive , ed a rimediare agli accidenti del cervello .

La febbre continua-biliosa è spesso epidemica nelle armate , allorchè le truppe , esposte all' ardore del sole , mancano di acqua , o sono ridotte a cibarsi di alimenti che si corrompono facilmente ; o che non hanno a bere se non acque putredinose . Da ciò nasce il riflesso quì fatto , che l' uso abbondante dei frutti maturi e bruschetti , siccome i ciriegi , le uve , l' aceto mischiato coll' acqua , contribuiscono molto a preservare ed a guarire questa malattia . La tisana di cremore di tartaro che è meno dispendiosa , può non solamente rimpiazzare i suddetti frutti acidetti , ma è ancora assai salutare in questo male ; imperocchè , dopo eseguite le grandi evacuazioni , ella schiude insensibilmente le reliquie del fermento , se ne bee sufficientemente per mantenere un flusso moderato di ventre .

*Della febbre verminosa .*

Questa specie di febbre è comune ai fanciulli , che hanno dei vermi e del putrido nelle prime vie : qualche volta ella è epidemica nelle persone adulte . Essa invade preferentemente quelle di temperamento delicato , e i di cui organi della digestione sono deboli . Cotesta malattia è comunemente preceduta da un appetito vorace , e comincia a manifestarsi da una grande svogliatezza , accompagnata da mali di cuore , da un sentore di putridità alla bocca , e da rutti della medesima natura . La lingua è molto paniosa ;

gli occhi un po' infossati; il malato prova violenti mali di testa, e soggiace a prurigine del naso. Dapprincipio, il calore è poco rimarchevole al tatto, ineguale, ed ordinariamente interposto da brividi: il polso è poco sollevato, ma frequente, irritato. Rispetto alle remittenze, rinascono irregolarmente, e fino a che desse durano, il calore, e l'alterazione non crescono molto. Il polso varia: per l'ordinario diventa soltanto più frequente; il malato ha comunemente una guancia più rossa dell'altra; egli è assopito, si sveglia come sorpreso da subitaneo terrore, ha tosse secca, ambascie, subsulti, o leggieri movimenti convulsivi. Le orine, ch'ei rimette sulla fine della remittenza, sono per lo più fangose: soggiace inoltre durante il corso del male ad insulti colici, che finiscono con uscite di pessimo odore, frammischiate tante volte da vermi quasi infracidati, e disciolti. Cotesto male è per l'ordinario di lunga durata: gl'intervalli da una remittenza all'altra sono qualche volta lunghissimi, e si replicano nel tempo, in cui si credeva l'ammalato diggià fuori di pericolo, e la febbre quasi terminata.

Ad eccezione del salasso, il quale di rado è indicato, si cura la febbre verminosa delle persone adulte, in ogni sua parte come la febbre continuabilosa. Il malato prenderà inoltre, negl'intervalli di una purgazione all'altra, di tre in tre ore, ed a ragione della sua età, due o più cucchiaj della mestura fatta con eguale porzione d'olio di mandorle dolci, e di sugo di cedro, unito assieme allo zucchero; e se fosse incomodato da sintomi indicanti vermi rotondi, e tuttora vivi, si aggiugne a ciascuna presa del suddetto rimedio oleoso, tre grani di muschio polverato, e nei lavativi raccomandati per la febbre biliosa, mezz' oncia d'olio

ricino (c). Rispetto ai fanciulli, si purgano più volte coll' ipecacuana, e col siroppo di cicoria col rabarbaro; si fa loro prendere l'anzidetta misfura oleosa senza o col muschio, in dose proporzionata alla loro età, non omessi i lavativi, composti di parte eguale di latte, ed acqua, ed animati da due dramme d'olio di ricino. Si purgano i convalescenti adulti colle pillole N.º 155., ed i fanciulli collo sciloppo N.º 178. Gli uni e gli altri staranno per i primi quindici giorni al regolamento riferito sotto la lettera B., ed accorderassi ai fanciulli, quanto può convenire alla loro età.

*Della febbre ardente.*

Questa malattia sembra derivare principalmente da una tenacità calda del sangue, congiunta ad un ammasso di umori calorosi nelle prime vie, i quali entrano ad un tratto in una terribile fermentazione, e che producono un ardore, un pungimento ed un eretismo universale. Ella è frequente nei climi caldi: La febbre è viva nel primo giorno del male: le remittenze rinascono per lo più da un giorno all'altro, e sono violentissime: la febbre che sussiste fralle remittenze, cresce sempre più; il malato muore ordinariamente nel terzo o quarto giorno, e la sua sorte è quasi sempre decisa prima del declinare del settimo giorno.

---

(c) L'olio di Ricino, chiamato anche olio palma Christi, e dagli Inglesi, olio di castoreo, è una specie d'olio espresso da un' avetiana, che nasce sopra un albero chiamato Ricino: Quest'olio è un dolce purgativo, ottimissimo nei mali infiammatorj, convulsivi, in caso di vomito sanguigno, di emorragia, nelle persone convulsinarie, irritabili, nella colica saturnina, ec. Si deve adoperarlo freschissimo: rancido, ed acrimonioso produce mali di gola, e dolori intestinali: *Il Tr.*



Quantunque dappprincipio il calore sia vivo, non pertanto egli è ineguale. Il malato risente molto ardore negl' ipocondrij e nel petto: la bocca, le narici, e tutto l'abito del corpo sono invasi da un calore pungitivo e secco: la faccia è infiammata, l'alito diviene ardente; la lingua è secca, aspra, lorda di una pasta fosca o nera; ha nausee; è molto alterato, inquieto, agitato, svogliato, oppresso, rotto in tutto il corpo; il respiro è frequente, difficile; veglia, medita, delira; il polso è duro, frequente; le orine rosse infiammate. Questi diversi sintomi crescono nelle remittenze, al segno ch'egli soffre un ardore insopportabile al petto ed agl' ipocondrij, con terribili ambascie. Egli tosse; la sua voce è sottile e tremolante; il suo polso come le sue orine variano molto. Durante le remittenze, egli cade o in un sopore letargico, o soffre trasporti al cervello, con ribalzi, con tremori di nervi, o movimenti convulsivi. Quando questa malattia finisce bene, ciò succede ordinariamente per mezzo di critiche evacuazioni, più abbondanti di quelle mentovate parlando dei sintomi delle febbri in generale; e ch'è preceduta ed accompagnata da un tremore locale od universale. Ma quando le remittenze rinascono tutti i giorni; che il febbricoso sputa o rimette sangue per le orine; o che la gola ed il cervello s'infiammano; che la sete cessa subitamente; che le orine diventano nere e crude, o si soffermano, l'ammalato è senza speranza.

Gli si fa immediatamente un salasso abbondante dal braccio, e subito dopo si sbarazza il ventre col lavativo purgante N.º III., reso il quale, un'altro salasso dal piede. Berà ogni cinque o sei minuti una tazza di tiepida limonea, oppure acqua d'orzo inacidita collo sciloppo di agresto, o di ribes, aggiugnendo a ciascuna tazza di queste diverse bevande



alcune gocce di spirito di zolfo o di vitriuolo: non prenderà altro alimento che di sei in sei ore un brodo di polte d'orzo o d'avena cotta nell'acqua; e fra questi brodi, un lavativo di siero vaccino, o di acqua-crusca, con entro disciolte due dramme di nitro; non rinovando altro fino a che il malato entra nella remittenza; ammeno ch'ei non abbia sintomi di grande pienezza allo stomaco od al basso ventre. In questi casi si purga secondo l'indicazione, e come fu raccomandato per la cura delle febbri in generale. Durante il calore delle prime remittenze, e prima di principiare il sudore, si replica il salasso, da farsi piuttosto al piede che al braccio, continuando a prendere frequentemente le suddette bevande; i brodi ed i lavativi non si daranno che fra le remittenze. S'egli è disgustato dalle bevande brusche, che per lui sono le più salutari, berà orzata leggera, sciogliendovi sopra ciascuna libbra una mezza dramma di nitro, o latte spannato, chiarito. Si bagneranno soventi, le tempia, la fronte, e i polsi con aceto rosato, con parte eguale di acqua tiepida. All'avvicinarsi di ciascuna remittenza, si applicherà alla pianta dei piedi, una fetta di vitello inzupata nell'aceto, od il cataplasmo di lievito N.° 16.: Il malato sia rialzato, o collocato colla testa molto alta, e leggermente coperto, in una stanza fresca ventilata, colle cortine del letto aperte, insistendo in siffatto metodo, fino a che appajono i sintomi dell'una o dell'altra delle critiche evacuazioni menzionate all'articolo dei sintomi febbrili in generale, invitandole com'è stato indicato, e rimediando pure alle soppresse secrezioni ed ai diversi accidenti febbrili, che sopravveranno. Fatto convalescente, si purga soltanto cinque o sei giorni dopo terminata la malattia, colla pozione lassativa N.° 166., alimentandolo frattanto con poltiglie fatte col brodo;

ed in seguito coi cibi più leggieri del regolamento indicato sotto la lettera B. Per riafficurare la guarigione, conviene per 15. giorni, tre volte per giorno, il decotto antifetico N.º 22.

*Delle febbri endemiche in generale.*

Quando, nel medesimo luogo, molte persone sono costantemente attaccate dal medesimo male; si chiama malattia endemica. Siccome le febbri endemiche variano secondo il luogo e le stagioni, e secondo che gli anni sono più o meno salubri, i Medici stessi più veterani nella pratica non arrivano a distinguere, ed a curarle a dovere, che coll'istruirsi della loro natura presso i nativi del paese, e col mezzo di osservazioni e di ragionate sperienze. Frattanto che si prendono queste cognizioni preliminari, si confronteranno i rapporti della malattia endemica cogli altri mali conosciuti, e si userà il metodo raccomandato per il male, col quale dessa avrà più di analogia.

Siccome queste malattie endemiche provengono spesso da un putrido delle prime vie, non si ometterà di purgare prontamente, abbenchè sia piccola la indicazione per ciò fare. Si avvertirà attentamente, a ciò che possa contribuire ad accrescere o diminuire la malattia, ed i suoi accidenti più cattivi, cercando di prevenirli coi diversi mezzi indicati per la cura dei sintomi delle febbri in generale. Se la natura fosse inclinata alla evacuazione, o ad una critica eruzione, si seguiranno gli avvisi dati per siffatti casi.

Affine di apprendere a guerentirsi dalle malattie endemiche, si esamina la qualità dell'aria, dell'acqua, e degli alimenti più ordinari; imperciocchè egli è spesso dal loro vizio o corruzione, che hanno

origine tali malattie: Si può correggere l'aria per mezzo del fuoco, dei profumi, e del vapore d'aceto; non si bea che acqua stata bollita; si lascino gli alimenti crudi, e si condiscono le vivande, e gli erbaggi, col sugo di cedro, coll'aceto e qualche poco di aromati, accompagnati da buon vino; si sfuggano i crepuscoli, e si procura di mantenere e di accrescere la insensibile traspirazione, coll'esercizio, e col vestimento nel modo più conveniente al luogo che si abita.

*Delle febbri epidemiche in generale.*

Quando molte persone sono attaccate dalla medesima febbre, si chiamano queste malattie febbri epidemiche. Elleno sono ordinariamente pericolose, le più volte erutive, e qualche volta contagiose e maligne. Queste malattie variano tanto fra di loro, che i più accorti Medici non arrivano a ben conoscerle, e curarle a dovere, se non in seguito a lunghi tentativi; e siccome le loro cagioni e gli accidenti variano sempre più o meno, non puossi far meglio che consultare gli Autori, i quali ne hanno trattato, di osservare il rapporto della febbre che regna con quelle che l'hanno preceduta, e di usare ciò ch'è riuscito in consimili casi (d). In mancanza di analoghe osservazioni, od in aspettazione di maturate ricerche, o dell'azzardo, o delle ragionate sperienze, si tratterà la febbre epidemica come una delle febbri conosciute, ad essa maggiormente analoghe (e).

---

(d) *In plurimis morbis epidemicis, speciatim variolis, morbillis, febre scarlatina, cæterisque fieri potest, ut morbus generalis insigniter per ægrotorum particularem mutetur constitutionem.* HUXHAM: *Il Tr.*

(e) Egli non è soltanto da qualche sintoma apparente in una



Siccome le febbri epidemiche sono comunemente complicate con un putrido considerevole nelle prime vie, quantunque piccola sia l'indicazione di esibire l'emetico, non bisogna mai ometterlo. Si avvertirà ancora in questo caso, come nelle malattie endemiche, a tutto ciò che sembrerà giovare o nuocere all'ammalato. Si rimarcheranno gli accidenti che divengono funesti, cercando di prevenirli o di rimediarvi coi varj mezzi indicati per la cura dei sintomi delle febbri in generale; e se la natura è inclinata ad evacuazioni, ad eruzioni o metastasi critiche, si seconderà secondo il prescritto per la cura dei sintomi febbrili in generale.

Affine di guerentirsi da cotesti mali, si deggiono seguire i precetti dati per preservarsi dalle malattie endemiche; e se la malattia epidemica fosse contagiosa, si cerca di superare l'inquietudine, che potrebbe cagionare il timore di contrarla; astenendosi principalmente da quelli, che ne sono attaccati, evitando i crepuscoli, i sopracarichi dello stomaco, come anche tutto ciò che può diminuire la insensibile traspirazione. Si purga al primo indizio di pienezza, e prendesi di tempo in tempo un bicchiere di vin buono, per mantenersi in forza ed in illarità. Queste ultime regole saranno egualmente utili

malattia, che dedurre si deve la sua cagione, e regularsi rispetto alla cura; ma dal concorso dei molti accidenti concomitanti lo stesso male; come benissimo ci addottrina SELLE: *Sic enim, egli dice, in morbis inflammatoriis pulsus non semper durus ac plenus occurrit, & quidem in peripneumonia mollis. in ventriculi, & intestinorum inflammatione haud raro parvus deprehenditur. Sic in iisdem morbis inflammatoriis crusta sanguinis inflammatoria non semper adparet, quavis morbus veram indolem inflammatoriam prae se ferat. Sic in febribus quibusdam nulla bilis, atque humorum gastricorum corruptionis signa manifesta sunt, ubi tamen maxima causae materialis pars in ea quaerenda est. In his casibus ergo ex reliquis circumstantiis naturae morbi adjudicanda est: Rudimenta pathol. meth. l. Tr.*



per le persone, che abitano luoghi, che portano la mortalità a lungo andare, o che alterano tanto la salute, che il più gran numero delle persone, le quali hanno la disgrazia d'incontrarvi un cattivo stato, ne cadono malate per ogni resto di loro vita: Siami permesso di dire in questa occasione, com' egli sarebbe a desiderare, che i Sovrani fissassero fra di loro ordini necessarj, i quali richiamassero il loro proprio interesse e quello dell'umanità, perchè la maggior parte delle loro fortezze, delle quali l'aria ed il clima sono sì perniciose, non fossero abitate dalle truppe che in tempo di guerra, ed allora se non solo od almeno nella maggior parte, da rei, i quali poteessero sperare, col soggiornarvi un certo tempo, di ottenere la loro libertà, ed il perdono dei loro delitti.

*Della febbre scarlatina o febbre rossa.*

Ella di rado invade le persone adulte, ma frequentemente i fanciulli: Questa malattia, quando si è contratta all'ardore del sole, è ordinariamente di poca conseguenza. Le più volte ella è benigna; ma qualche volta è ancora grave ed anche pericolosa. Quand' essa è benigna, comincia da raucedine accompagnata da un po' di male di gola; sentesi stanchezza e voglia di vomitare. Nei vomiti il malato rimette della bile: il male di gola cresce in 24 ore con oppressione. Il terzo giorno e qualche volta prima, si vedono comparire piccole macchie rosse, che si manifestano immediatamente alla faccia, discendono successivamente, e si allargano in poco tempo al segno, che tutto il corpo è coperto da una rossaggine, la quale sparisce, se la si comprime colla mano, e rinasce immediatamente. Verso il quarto giorno, il mal di gola diminuisce, ma

la raucedine sussiste. Nel quinto o sesto giorno, sopravviene sudore, emorragia da naso, od una leggiera diarrea, che solleva, e la febbre raddoppia la sera con *subdelirio*, il quale non dura che il tempo della remittenza. La rossezza comincia a dissiparsi, abbandonando prima il volto; poi appoco appoco tutto l'abito del corpo, lasciando dopo di se, bianche e vuote vescichette della grossezza del miglio, con una pelle estremamente sensibile, che poi diviene farinosa.

Nell'ottavo o nono giorno il male sembra terminato, ma verso il dodicesimo, coloro che non sono stati sobri, e difesi dall'intemperie dell'aria, hanno le glandole del collo gonfiate. Altri verso il diciottesimo giorno, trovansi deboli ed oppressi; le orine diminuiscono, la pelle s'intumidisce, e spesso ne risulta un idrope anasarca. Allora se la febbre si unisce alla sete, alla veglia, agli spasimi, ed al delirio, l'ammalato è nel più gran pericolo.

Quando questa malattia è epidemica, e regnano nel medesimo tempo il vajuolo o la rosolia, distinguerssi innanzi l'eruzione, dacche l'ammalato non ha l'occhio lagrimoso come nel vajuolo, nè le lagrime ardenti, e lo sternuto che precedono la rosolia: d'altronde il mal di gola è più considerevole nella febbre scarlatina, che nelle altre febbri erutive.

Se questa malattia si annuncia da grande stanchezza, da sopore, da oppressione, e da un polso concentrato, cotali sintomi sono di mal augurio; sopra tutto quando tra le macchie rosse, ve ne hanno di colore fosco, ed inclinanti al livido. Allora la morte può insorgere in pochi dì. La saliva non che le orine sanguinolente, non sono di veruna conseguenza; ma se i fanciulli durante questa febbre gettano dei denti, & trovano in grandissimo pericolo.

Quando la malattia è dolcissima, la bevanda

copiosa di una infusione leggiere di parte eguale di fiori di tiglio e di sambuco, od un quarto di latte mescolato con tre quarti di acqua, basta per favorire l'eruzione; il calore moderato del letto e la dieta compiscono il resto. Se l'insulto è vivo, e rimarchevole il male di gola, la pelle ardente, e vi sia dell'oppressione, bisogna senza esitare, fare un salasso, da replicarsi negli adulti, visto, che gli accidenti indicanti il primo salasso, sussistano. Nei fanciulli, si applicano le sanguisughe alle tempia, sopra tutto s'essi fanno allora dei denti, essendo questo il miglior mezzo per salvarli.

Se l'ammalato ha delle nausee, si facilita il vomito coll'acqua tiepida, o colla polvere vomitiva d'ipecacuana N.° 192., soprabbevendo acqua tiepida, fino a che la si rimette chiara. Se il ventre non è libero, si danno ai fanciulli, lavativi di acqua e latte, e si purgano con manna stemperata nel latte. Rispetto alle persone adulte, si prescrive fino dappprincipio la pozione minorativa N.° 168., e giornalmente per tutto il corso del male il lavativo domestico N.° 108.

Affine di diminuire il male di gola, si applica all'una ed all'altra orecchia, sopra e sotto il mento, il cataplasma mollitivo N.° 15., e alla pianta dei piedi quello di lievito N.° 16. Si gargarizza, e gli si fanno iniezioni nella gola con una tiepida mistura, composta di cinque parti d'infusione di fiori di sambuco e d'una parte d'aceto sambucino, raddolcita col mele.

Se il male di gola non cedesse a questi rimedj, si rinnovano le sanguisughe dietro le orecchie; e se il caso fosse pressante, si scarificano le amigdale. Quando il malato comincia a sputare molta vischiosità, è questo un segno della declinazione del male, ed allora si sospendono le fomentazioni, il gargaris-



mo, e le iniezioni mentovate. Il malato non prenda allora che tisane di crusca, di orzo o di riso N.º 218. 213. e 215., e per cibo polte d'avena cotta nell'acqua; ed i fanciulli, latte con un terzo d'acqua bollente.

Si previene il delirio coll'evacuazioni raccomandate da farsi nei principj della malattia. Quello che viene e cessa nel medesimo tempo che le remittenze, non esige che leggiere emulsioni come quella del N.º 65. per temperare la febbre. Ma se il delirio che sussiste fra le remittenze, non cede ai pediluvj ed ai sinapismi, bisognerà lasciarlo il malato, s'egli è adulto, ed applicargli i vescicanti alla polpa delle gambe; s'egli è fanciullo, le sanguisughe alle tempie.

Per più di 15. giorni, il convalescente deve osservare un rigoroso regolamento, non esponendosi all'aria, e restando, per lo spazio di tre o quattro settimane costantemente in una stanza piuttosto calda che temperata. Mattina e sera si fanno dolci friegagioni per tutto il corpo con fine flanela, e si purga due o tre volte, ogni due o tre giorni colla pozione lassativa N.º 166.; se nasce gonfiezza, si ripurga ancora, s'egli è adulto, ogni quattro, cinque, o sei giorni, colla polvere purgativa N.º 186.; e nei giorni intercalari, di tre in tre ore, dassi un cucchiajo da caffè di siroppo di squilla (*f*), locchè contribuirà ad una perfetta guarigione. I fanciulli prenderanno il medesimo sciloppo nella dose proporzionata alla loro età, e si purgheranno colla polve-

(*f*) Il siroppo squillitico è fatto con un' oncia di squilla preparata, due once di foglie d'isopo, e mezz'oncia di gengiovo: tagliuzzate queste sostanze si pongono a macerare per due ore in vase chiuso con trentasei once d'acqua d'isopo; alla colatura chiarita, vi si uniscono trentasei once di zucchero bianco: *Il Tr.*



re cornacchina (g), dai cinque ai dieci grani, o col siroppo lassativo N.º 197.

*Della febbre petecchiale: o porporina.*

Questa malattia quand'è epidemica, è più o meno contagiosa. Ella proviene da un sangue disciolto impuro e putredinoso, e che rende gli spiriti vitali inerti (b). Ella è preceduta dalla perdita delle forze, e si manifesta coi medesimi accidenti che la febbre putrida. Le macchie somiglievoli a quelle dei pulci, appajono più comunemente verso il settimo giorno: elleno non sono già una depurazione del sangue; ma giusta la loro quantità, od il loro colore più o men fosco, sono l'effetto, ed il segno del grado di corruzione degli umori.

Le macchie livide annunciano un sangue disposto alla putrefazione sfacellosa; quelle che sono nere, provano, che il sangue è di già viziato da cotesto genere di corruzione: rispetto alle macchie che sono poche e di un rosso chiaro ed animato, non deggiono inquietare il Medico, nè determinarlo a classificare la malattia tra le febbri putride, o petecchiali maligne; dappoichè queste macchie spariranno cogli altri sintomi, purchè si avverta di seguire le indicazioni generali della malattia.

Rispetto alla cura della febbre petecchiale epidemica, si rifletterà ai suoi sintomi, i quali sono quasi i medesimi della febbre putrida non maligna, o quasi pareggianti i sintomi della febbre putrida maligna. Si regolerà giusta il rapporto che la feb-

I 2

---

(g) La polvere cornacchina, ossia del Conte di WARNICK, si compone con parti eguali di diagridio, antimonio diaforetico, e cretore di tartaro. *Il Tr.*

(b) Tante volte appajono le petecchie senza corruzione del sangue, ma bensì prodotte da diatesi infiammatoria. SELLE, l. c. de HAËN. Rat. med. P. IV.: *Il Tr.*

bre petecchiale avrà con l'una o l'altra delle febbri putride, delle quali si è parlato. Il salasso non converrà che nel principio della malattia, e nelle persone decisamente pletoriche, e con polso veramente depresso per la soprabbondanza del sangue. Non si ometteranno le evacuazioni per dissopra; e rispetto ai purgativi, siccome egli è ordinariamente dopo le straordinarie intemperie, o quando gli alimenti di prima necessità sono stati considerevolmente alterati, che si manifestano le febbri petecchiali maligne; e che dal principio della malattia, gli umori peccanti non sono disposti ad essere scacciati cogli evacuanti, ammeno che non vi siano forti indicazioni, per purgare l'ammalato, conviene differire di farlo, e dare ai diluenti ed alla natura il tempo di preparare e di cuocere le materie morbose innanzi di smuoverle colla purgazione. Nel settimo giorno della malattia, si può purgare con successo, secondando la natura, la quale verso quest'epoca, cercherà ordinariamente di sbarazzarsi colla diarrea, dalle materie morbose. Nel resto i convalescenti si regoleranno, come noi abbiamo raccomandato per quelli della febbre putrida.

*Della febbre migliare.*

Questa febbre è ordinariamente preceduta da dolori vaghi o fissi, che sembrano provenire da una congestione linfatica acrimoniosa. Le puerpere, le persone gottofe, le soggette al reumatismo, alla renella, come pure i febbricitanti stati trattati coi sudoriferi, soggiacciono all'eruzioni migliari. Sono desse bianche vescichette grosse come un grano di miglio, piene di un'acqua sierosa. Si seccano dopo che si sono aperte, e che il loro umore si è dissipato colla perspirazione; elleno si manifestano prin-

cipalmente al petto, al collo e fra le dita. La febbre è dolce, ma accompagnata da veglie e da scadimento di forze.

I rimedj caldissimi, ed un regolamento riscaldante irritano questa malattia, la quale può allora divenire pericolosa (i). Si dà al malato la mistura diaforetica N.º 125., soprabbevendo una tazza della tisana calda di scorzonera N.º 217.: ogni due giorni, si mantiene sciolto il ventre col lavativo domestico N.º 108.; seguendo il metodo indicato sotto la lettera H.; le polti sian cotte col brodo di vitello. Affine di mantenere la traspirazione, si concede molto della suddetta tisana, con doppia porzione di acqua calda.

I vescicanti faranno il più opportuno rimedio per dissipare le congestioni e gli accidenti, che risultano da questa malattia. Le migliari sopravvegnenti alle petecchie livide, non sono del tutto da temersi (k).

## V A J U O L O.

**V**I sono due specie di febbri epidemiche ed eruttive, che l'uomo contrae tosto e tardi; cioè il vajuolo e la rosolia.

Si distingue comunemente il vajuolo, in vajuolo o piccolo vajuolo volante, in vajuolo discreto, ed in vajuolo confluyente.

### I 3

(i) De HAEN è d'avviso, che la migliaja provenga da cattivo metodo di cura. Quantunque le tante volte ciò possa esser vero, egli è però innegabile, che non nasca da altre cagioni, siccome, p. e., da un vizio delle prime strade. SELLE, l. c.; da retrocessione del latte. BRUNING, l. c., ec.: *Il Tr.*

(k) Da temersi è la migliare critica, se improvvisamente sparisce, producendo in seguito il delirio, il subulso ai tendini, pertinaci diarree, massime nelle puerpere: In questi casi i soli vescicanti possono rimediare a tanti disordini, e richiamare nuovamente la recessa espulsione: *Il Tr.*

Il vajuolotto non guerentisce dal vajuolo , invece che le persone che hanno provato quest' ultimo , sono soventi esente dal vajuolotto . Egli non è altra cosa se non una eruzione di papole vescicolari , che imbianchiscono e si seccano prontamente . Siccome gli accidenti del vajuolo volante sono poco confidevoli , egli basterà prendere le appresso precauzioni raccomandate per il vajuolo discreto e benigno .

Il vajuolo è chiamato discreto o benigno , quando i grani della faccia sono e restano separati gli uni dagli altri ; e chiamasi confluyente , quando questi si toccano nella loro base , di modo che più pustole si confondono e si ammassano insieme .

Il vajuolo discreto è qualche volta così benigno , ed il numero delle pustole così piccolo , che vi sono persone , le quali lo hanno avuto senza essersene avvedute . Questa malattia è comunemente annunciata dall' abbattimento e da un freddo interposto da calore . Il malato è soggetto a sentire mali di testa , e dolori alle reni ; ma egli è ancora più immancabilmente incomodato da un dolore alla forcilla dello stomaco , il quale cresce al tatto . A codesti sintomi si uniscono ben presto la febbre non che ancora le nausea o 'l vomito : le persone adulte sono molto inclinate a sudare ; i fanciulli al contrario sono assopiti ed incomodati da movimenti convulsivi , assai forti qualche volta per rassomigliare agl' insulti epiletici .

Quando questi sintomi non che la febbre sono poco confidevoli , avvi luogo a sperare , che il corso della malattia sarà dolce , e l' esito felice . All' opposto il vajuolo discreto sarà altrettanto più cattivo , quanto lo sarà quello che regna , e che getterà maggior numero di pustole alla faccia .

L' eruzione comincia comunemente al fine dei tre , od al più tardi al fine dei quattro giorni d' in-



disposizione . Sono subito piccoli punti rossi , che appajono da prima intorno alle labbra e sul volto ; poi successivamente al collo , al petto , alle altre parti del tronco , e finalmente alle estremità . Questi punti si allargano e diventano ben presto somiglievoli alle morcature delle pulci , con questa differenza che non se ne ravvisa il punto , il quale stassi al centro di queste .

L' eruzione del vajuolo discreto dura circa tre giorni , contando dall' apparizione delle prime macchie . A misura ch' ella si avvanza , la febbre e gli accidenti che l' avevano preceduta , si diminuiscono a proporzione , e si dissipano quasi del tutto . Le macchie si alzano insensibilmente in forma di grano , di modo che quando le ultime macchie appajono , le prime che sono nate , sono altrettanto più bottonate , quanto l' intervallo della loro eruzione è stato più lungo . A misura che i grani s' ingrossano , la pelle d' intorno alle pustole si arrossa , si tende e si gonfia alcun poco .

Dacchè vi sono molte pustole in questo stato , la febbre sopravviene di nuovo : il malato prova ardore e dolorosa tensione ai luoghi della pelle infiammata . Egli è inquieto , e se ha delle pustole in gola , nei bronchi o negli occhi , i suoi occhi s' infiammano , le sue palpebre si gonfiano , ingolla con difficoltà , ha tosse ed oppressione . Questi accidenti continuano , e crescono comunemente fin verso il fine dell' ottavo giorno della malattia , ch' è il quarto contando dal principio dell' eruzione . Allora la faccia , le palpebre , e le mani sono più o meno gonfie , giusta il numero delle pustole che si trovano su queste parti ; e le palpebre soggiacciono a gonfiarsi al segno , che gli occhi sono assolutamente chiusi .

Siccome la suppurazione delle prime pustole è

allora molto avanzata , il pus che è assorbito , congiunto all'infiammazione del dintorno delle pustole , le quali non hanno suppurato ancora , producono un raddoppiamento di febbre . Egli è comunemente in questo tempo , che arriva nei quattro o cinque giorni dopo il principio dell'eruzione , o nell'ottavo e nono della malattia , che le persone attaccate dal vajuolo discreto si trovano nel più grande pericolo .

Le pustole , dopo questo termine , continuano ad imbianchirsi successivamente a misura che sono nate : gli accidenti dell'infiammazione diminuiscono , e verso l'undecimo giorno della malattia , la faccia è ordinariamente disenfata ; le pustole che sono state convesse , e turgide d'un pus bianco , si appianano , s'ingialliscono , e cominciano a seccarsi ; quelle sparse sul corpo provano successivamente i medesimi cambiamenti , di modo che verso il quattordicesimo giorno tutte sono cadute con croste e squame , a riserva di quelle delle estremità , le quali sussistono ancora per alcuni giorni .

L'eruzione del vajuolo confluyente è preceduta dai sintomi generali , che annunciano il vajuolo discreto . La febbre è comunemente considerevole nel principio della malattia ; e quando la costituzione epidemica è cattiva , il malato prova oppressione , dolore quasi cardialgico accompagnato da ambascie , molte volte crudeli , o altro dolore fisso e vivo . Spesso ancora la febbre ha i caratteri della febbre maligna .

Innanzi l'eruzione , le persone adulte non hanno tanta disposizione al sudore , quanta nel vajuolo discreto : elleno invece soggiacciono ad un flusso di corpo , il quale scema ordinariamente a misura che l'eruzione si avvanza . Rispetto ai fanciulli , cadono facilmente nel sopore al segno di stentare a svegliarli .

L'eruzione del vajuolo confluyente, ammeno che non sia sospesa da qualche congestione dolorosa, comincia ordinariamente nel terzo giorno della malattia. E' questa una effervescenza, che si manifesta irregolarmente, e tante volte alcune delle macchie che si erano mostrate, poco dopo svaniscono. La febbre e gli accidenti che avevano preceduto l'eruzione, sussistono, frattanto che questa si forma, quasi colla egual forza, o non diminuiscono che fra 'l giorno, e quando l'eruzione è molto avanzata. I fanciulli cominciano allora assai soventi ad avere una diarrea, la quale dura per un considerevole tempo della malattia. Le pustole s'ingrossano, meno che non nel vajuolo discreto; la faccia s'infiamma, e si gonfia prontamente; e quasi tutta si cuopre di una rossa piastra, la quale s'imbianchisce a misura, che le pustole si gonfiano di pus; al fine dell'ottavo giorno della malattia, cominciano a divenire gialle ed aspre; i contorni di quelle disperse sul corpo, e sulle estremità, s'infiammano e si gonfiano al segno, che le pustole sembrano innestate dentro piastre resipelatose, rossissime, e qualche volta frammischiate da macchie petecchiali, o d'alcune bolle piene di un'ardente sierosità.

Quando il vajuolo è maligno, le persone adulte, come anche i fanciulli, che non hanno diarrea, salivano, a misura che l'eruzione s'avanza. La saliva è dapprincipio chiara ed abbondante; dappoi diminuisce e si condensa insensibilmente verso l'undecimo giorno del male, che è il tempo, in cui l'infiammazione, la febbre e gli accidenti che ne risultano, sono comunemente nel più alto grado. Il malato soffre molto a sputare; è rauco, e tossicoso; ingolla con pena e con dolore; rimette la bevanda per le narici, ed è talmente impoverito di forze, che la natura è inabilitata a perfezionare la suppu-

razione. Allora le pustole, le quali avevano cominciato ad imbianchirsi, formano un vuoto e s'infoscano; la pelle stata infiammata, impallidisce e diviene foppassa, e la faccia invece di disenfarsi insensibilmente, si disenfia tutto ad un tratto. Il vuoto o centro delle pustole diviene nero e gangrenoso; e se non si gonfiano considerevolmente le braccia e le mani, o che non ritorni abbondante saliva, l'ammalato muore prestissimo, sia per i progressi della gangrena, sia per la congestione dei fermenti o delle materie riassorbite; ed a misura che sorprendono il cervello od il petto, o che si gettano sopra altre parti, producono diversi accidenti mortali (a).

Quando al contrario, l'ammalato ha superato l'undecimo giorno di malattia, egli è fuori di pericolo, ammeno che l'eruzione non sia stata ritardata, o cattivissimo il vajuolo. Nel primo caso il vigore del male è prolungato in proporzione del tempo dell'eruzione; e quando il vajuolo è cattivissimo, l'ammalato dopo l'undecimo giorno, continua a soffrire verso la sera violente remittenze febbrili; e trovasi in pericolo, fino a che queste non siano considerevolmente diminuite, ciò che può durare fino al ventesimo giorno del male. Finalmente il vajuolo confluyente tarda tanto più ad efficcarsi, quanto le croste sono meno gialle e più fosche. A misura ch'elleno cadono, la faccia appare liscia ed uguale; ed il vuoto e le cicatrici si cuopro-

(a) E' stato disputato, se il vajuolo nasceva ancora nelle parti interne, cioè a dire in quelle non esposte al contatto dell'aria. COTOGNI, nel suo libro *de Sedibus variolar.*, si è studiato a tutta forza di provare l'impossibilità del vajuolo nei luoghi non esposti all'aria. Io rispettando l'autorità di un tanto illustre professore, posso però assicurare, di essermi colla sezione de' cadaveri assicurato dell'esistenza del vajuolo nelle parti interne; e senza quì entrare nel novero di molti classici scrittori, che testimoniano il medesimo, basterà leggere la diss. di OTTO *De concil. med. quer. var. int. dissent.* *Socet.* 1771.: *Il Tr.*



no di squame , le quali si staccano appoco appoco . Egli non è che dopo essere ciò avvenuto , che le impressioni del vajuolo si manifestano , ed invece di una convalescenza perfetta , succede frequentemente , che in seguito a questa malattia , sopra tutto quando i convalescenti non fanno governarsi , o che si sollecitano a sortire , lor sopravviene una diarrea , che li snerva ; flussioni che sono molto a temere , molto più se invadano gli occhi ; furoncoli , febbre lenta , od altri accidenti , che divengono cattivi , e perniciosi ancora , se si trascurano .

Questo quadro è stato delineato naturalmente , affine di far comprendere a ciascheduno , e particolarmente ai miei compatriotti , i quali ricusano ancora l'uso dell'innesto , che l'aspettare il vajuolo naturale , egli è esporli ad un gran pericolo ; e che ancora , se l'epidemia e le altre circostanze sono favorevoli , perchè divenghi meno confiderevole questo pericolo non lascia di essere meno a temere .

Per evitarlo , la inoculazione ci porge un mezzo sicuro , le cui prove senza numero hanno avvertato i vantaggi per l'umanità , non solo per sottrarla dall'ordinario pericolo , ma dagli accidenti cattivi ancora , i quali succedono al vajuolo naturale . Giammai non si avrà luogo di dolersi di essersi deciso , se s'innesta un soggetto , il quale non sia nè male costituito , nè attaccato da qualche altra malattia ; e che si adopera per questo effetto un lievito di buona qualità , sopra tutto nell'età e stagioni le più appropriate , dopo alcuni giorni di regolamento , e dopo le procurate evacuazioni delle prime vie giusta le indicazioni (b).

L'inoculazione si fa sulla pelle delle due an-

---

(b) La stagione più propria per l'innesto è la primavera , od il principio della state , come la più costante , e meno soggetta a va-

tibraccia con leggiere scarificazioni della lunghezza di tre a sei linee, e con tre scalfiture sopra ciascun braccio, fatte con la punta di una lancetta, tuffatta nel pus ancora bianco di una pustola vajuolosa. Fatte queste scalfiture, s'insinua il pus con una leggiere frizione sulle medesime scalfiture, colla camiscia del malato, poi senza coprirla con verun impiastro, si lascia operare la natura, bastando di secondarla con una vita sobria, e con un giornaliero moderato esercizio, da prendersi in aria aperta, prima e dopo il mezzo giorno, per quanto sarà permesso dalla temperatura dell'aria; ciò che continuerassi fino a che si conoscono gl'indizj dell'eruzione, la quale ordinariamente si manifesta nell'ottavo e decimo giorno dopo l'inoculazione. In allora fralla giornata, il malato stia piuttosto levato che a letto, in una stanza temperata, rinnovandone l'aria tutt' i giorni. Astengasi dalla carne; bea molto latte temperato con eguale porzione di una leggerissima infusione di parti eguali di fiori di tiglio e di sambuco; e di tempo in tempo, se l'eruzione avesse bisogno di essere animata, alcune tazze della tisana di scorzonera N.º 217. I suoi alimenti siano i più leggeri e i più dolci del metodo prescritto sotto le lettere B. ed H., presi poco alla volta; ma assai spesso, ed in quantità sufficiente, per moderatamente sostenere le sue forze. Se passano due giorni senz' avere uscita di corpo, si rilascia con un lavativo composto di eguale porzione di acqua e latte, o veramente con una supposta di mele cotto (c).

riazioni: Il seme vajuoloso dev' essere tratto da una pustola quasi matura, da un vajuolo non maligno, e da un soggetto non scorbutico, nè rachitico, nè strumoso, nè viziato da lue venerea, da scabbia, da febbre etica, cc.: *Il Tr.*

(c) Le supposte, sono medicamenti solidi di figura cilindrica, che s'introducono per di sotto: *Il Tr.*

Osservando questo metodo , la malattia si termina felicemente ; e quando il più gran numero delle pustole è disseccato , si purga il convalescente colla manna o colla pozione lassativa N.º 166. , da replicarsi due o tre volte fra quattro o sei giorni d'intervallo , se sono cadute le croste del braccio , nel qual tempo tutto sarà terminato , ed il convalescente potrà appoco appoco riprendere il suo metodo ordinario di vivere .

In mancanza di pus fresco , la inoculazione puossi fare con uno stoppino , stato inzuppato nel più valido pus che si sarà procurato altrove . Siccome questo metodo è conosciuto da tutte le persone dell' arte , egli sarebbe inutile di darne quì il dettaglio . Rispetto a quelli che non ponno , o non vogliono approfittare di questa preziosa scoperta per il genere umano , fino a che i Governi convenghino icambievolmente di allontanare dalla società le persone infette dal vajuolo , e di estinguere con ciò il contagio , che si comunica più di raro dagli inoculati , noi indicheremo i mezzi più proprij per superare i pericoli , che non si sono voluti prevenire colla inoculazione .

Quando sarà presumibile di essere attaccato dal vajuolo , si cerca di renderlo benigno (d) . A tal fine , fino a che regna questa malattia , si osserveranno i metodi indicati sotto le lettere B. ed H. Si mangeranno poche carni ; ed in loro vece erbaggi , latticini , ed altri alimenti raddolcenti ; pochissimo vino , e moltissima acqua d'orzo o tisana comune N.º 210. ,

---

(d) COTOGNI, l. c. , e BRUNING : *Constit. epidem.* , raccomandano per ciò i vescicanti prima dell'eruzione vajuolosa . Questo metodo è tanto più conveniente , ogni volta che si veda minacciata la testa da delirio , o da sopore , o che 'l vajuolo sia epidemico , di cattivo carattere maligno , ec. : *Il Tr.*

e due volte la settimana i piediluvj d' acqua-crusca, tiepida, e nella state i semicupj. Quelli che sono pletorici, accostumati al salasso, o di temperamento caldo e sanguigno, si faranno fare un salasso di precauzione; e le persone adulte come pure i fanciulli, avvertiranno di purgarsi, i primi colla pozione lassativa N.º 116., e gli altri colla manna. Dopo questi preliminari, nascendo alcuni segni di pienezza nelle prime vie, si prenderanno due prese della polvere di cremore di tartaro N.º 175. (e).

---

(e) Il Sig. PAULET è il primo, che abbia esaminato l'affare dell'innesto, da filosofo, e che facendo la vera analisi del vajuolo, abbia indicato il mezzo da preservarsene: Nel vajuolo, egli dice, tutto si riduce a un principio contagioso, tutto è inoculazione naturale, o fattizia, effetto degli abusi, della comunicazione, dei pregiudizj, e dell'accecamento: questo male si attacca come la rogna, o come il mal venereo agl'individui, come il fuoco di un bosco alle abitazioni; e perchè ciò si faccia, v'abbisogna sempre la presenza d'un fermento per produrlo; senza di che non potrebbe esistere. Cosa necessita dippiù, quand'è dimostrata tale verità? A che andare a ricercare negli oscuri giri del sangue, o della linfa, nella cloaca impura degl'intestini, nel cordone ombelicale, un germe che non si trova giammai, e che sfugge nell'aria, e che credesi ritrovarlo nella cieca fatalità, in tempo che l'inoculatore lo tiene nella sua mano, e ve lo mostra sott'occhio? Quando si chiede ad un giardiniere il seme di una pianta, e che me lo porge, ho io bisogno di frugare ne' cieli, nell'aria, o nelle viscere della terra per trovarvi altro principio di sua riproduzione? Non mi basta egli, quando ho questo seme, trovare un terreno proprio, una matrice conveniente al suo sviluppo? E quando ho trovato questo terreno, questa matrice, che m'abbisogna dippiù? Or dunque l'inoculatore non semina egli l'acino del vajuolo? Il corpo umano non è egli il terreno proprio a farlo germogliare? Dunque perchè non si sottomette questo seme, e non si difende il terreno, perchè più non vi produca?

Quando fu presa Minorca agl'Inglese, il vajuolo dominava nell'isola; che fece il Governo? Temendo, che il contagio non entrasse tra le truppe, proibì qualunque comunicazione, e gl'Isolani guarirono perfettamente, e per nove anni che i Francesi furono padroni di quest'isola, non vi si vide mai vajuolo? A Londra, ed a Bristol, per avere trascurato nel tempo dell'innesto le necessarie precauzioni, l'Inghilterra fece una perdita dippiù di 30. mila Sudditi nello spazio di 45. anni.

Il P. LABAT ci fa sapere essere stato il vajuolo totalmente sconosciuto ai Caraibi nell'America, fino a che non vi approdaron gli Europei. I Groelandesi l'ebbero la prima volta dai Da-



Si uferanno cotali precauzioni tanto più esattamente , quanto più cattiva sarà l'epidemia , e che la stagione ed il temperamento della persona minacciata saranno caldi . Quelli che si troveranno in tale circostanza , eviteranno il caldo ed il freddo , col qual mezzo il vajuolo sarà sempre molto più dolce , che non lo sarebbe stato senza simili precauzioni ; sopra tutto quando si sarà raddolcito il sangue col metodo indicato , o con quello specificato sotto la lettera G. , per coloro di sangue molto acre . Si avrà cura di rilasciar loro la pelle con una dozzina di bagni tiepidi di acqua-crusca , imbianchita col latte , e di rimediare immediatamente prima o nel tempo dei forieri della invasione , alla pletora ed alla favorra delle prime vie (f).

---

nessi nel 1734 : Dunque se il vajuolo non è una malattia necessaria ; se non fu conosciuta da IPPOCRATE, e da GALENO, perchè in allora non esisteva ; se desso si diffonde , come la peste , e perchè non prendere per essa le stesse precauzioni , per guerentirsene infallibilmente ? Fino a che non sia affatto distrutto il germe vajuoloso , per assicurarci dal suo malfare , e dalle sue stragi , si faccia l'innesto , ma gl' innestandi siano trattati come malati capaci di diffondere la peste , ed a questo modo vedremmo terminare fra di noi il vajuolo , come si licemente già si vide tolta la lebbra , la elefantiasi , ec. *Nam certissimis consuet observationibus, inoculationem non hac cum præcautione institutam, missima variolosum in urbibus majoribus, primo in vicinior loci, tandem per totam urbem propagatum, & sic in infinitum multiplicatum fuisse, ideoque multo plures, quam ante cognitam inoculationem unquam variolis periiisse.* COELS. *De variolis.* Friburgi Brisgoviae 1781. Il Tr.

(f) I rimedj preservativi del vajuolo . o fatti per diminuirne la cattiva indole , massime quando regna epidemico . sono i fonticoli , DIEMERBROECK ; i vescicanti CLOSSIUS , e MEAD ; lo stibio ed il mercurio , BOERHAAVE ; l' etiope minerale , LOBB ; l' acqua di pece BERCKLEY ; le pillole di calomelano , canfora , estratto d' aloe , e gomma guajaco , ROSENSTEIN ; oltre la canfora esternamente ed internamente usata , l' asafetida , la scorza peruviana , gli acidi minerali , ec. , suggeriti da molti altri . Fino ad ora però sono stati riconosciuti inutili questi preservativi del vajuolo , onde posso ripetere con SELLE, *verissimum esse, ad morbum avertendum nil nisi impeditam contagii communicationem superesse.* Rudimenta pyretologiae medicæ. Il Tr.

Il regolamento si varia giusta la temperatura del malato, e la qualità del vajuolo . Siccome egli è qualche volta talmente benigno, che appare, senza essere stato annunciato dai sintomi sopra men-  
 trovati, egli basta in questo caso, dichiarata la ma-  
 lattia, che il malato si chiuda in una camera tem-  
 perata, prendendo ogni quattr' ore, un brodo assai  
 sottile di polmone di vitello, alterato col cremore  
 d'orzo o di riso, od al più qualche prugna o pomo  
 cotto, e beendo molt' acqua d' orzo tiepida, e la ti-  
 sana comune N.° 210. Rispetto a quelli che soppor-  
 tano bene il latte, avranno nel medesimo tempo  
 una bevanda ed un cibo convenientissimo, facendo  
 pappa con un terzo di latte, raddolcita con un po'  
 di zucchero . Con questi mezzi, e col prevenire la  
 costipazione di un giorno all' altro con un lavativo  
 composto di acqua e latte per metà, con entro di-  
 sciolto due cucchiaj da caffè pieni di zucchero, po-  
 trassi con tutta fiducia abbandonare la guarigione  
 alla natura . Soltanto si purga il convalescente colla  
 pozione lassativa N.° 166. ; e s' egli è fanciullo,  
 colla manna . Subito cadute le croste della faccia, si  
 replicherà un pajo di volte la purga in sei od otto  
 giorni d' intervallo, permettendo al convalescente  
 di esporsi all' aria, e ritornare al suo metodo ordi-  
 nario di vivere .

Quando al contrario il vajuolo è preceduto da-  
 gli accidenti summentovati, farà bene che il mala-  
 to, fino a che lo permetteranno la febbre ed i sin-  
 tomi, stia fra 'l giorno piuttosto levato, che a letto;  
 restando in una stanza temperata rinnovata prima e  
 dopo il mezzo giorno . Ogni quattr' ore prenderà i  
 sottili brodi sopra raccomandati, molt' acqua  
 d' orzo tiepida, o tisana comune, col lavativo pur-  
 gante N.° 111., ed i pediluvj mattina e sera coll'  
 acqua-crusca tiepida imbianchita col latte . S' egli ha

vomito, affine di facilitarlo, berà molt' acqua tiepida: s' egli è di temperamento vivo e sanguigno, o che la febbre sia confiderevole, converrà salaffarlo; e se la bocca è cattiva, la lingua paniosa, imbarazzo allo stomaco, nausea od altri sintomi indicanti pienezza allo stomaco, la polvere emetica d' ipecacuana N.º 192.; altrimenti se appena appena vi sia pienezza o tensione del ventre inferiore, si darà la posizione minorativa N.º 166. Rimediato alla pletora, ed alla favorra delle prime vie, si continuerà semplicemente la molta bevanda, e mattina e sera un piediluvio fino al termine dell' eruzione, la quale principia, si coricherà a letto, avvertendo di essere leggermente coperto e mediocrement caldo.

Se la febbre ed i principali accidenti che l'hanno preceduta, diminuiscono a misura, che l'eruzione si avvanza, l'ammalato deve prendere solo le suddette bevande, ed i brodi sopra nominati. Ma se al contrario l'eruzione non è ancora cominciata al fine del quarto giorno della malattia; che l'ammalato non sia sollevato; s'egli è senza spirito, agitato, ed abbia molta febbre, bisogna salaffarlo dal piede, e dargli l'emulsione calmante N.º 66. S'egli fosse debole flemmatico, e di un temperamento floscio e tardo, invece del salaffo, gli si dà una presa della confezione giacintina in un po' di vino, o la mistura cordiale N.º 124. Con questi mezzi l'eruzione si fa quasi sempre debitamente; gli accidenti, che l'avranno preceduta, o che l'hanno sospesa, diminuiscono; ma se questi continuassero, si useranno al più presto i diversi mezzi, stati raccomandati per favorire l'eruzioni, all'articolo dei sintomi febbrili in generale. Se sopravvenisse emorragia da naso, con sensibile perdita delle forze, si arresterà l'emorragia, e le altre sensibili evacuazio-

ni , coi rimedj raccomandati per la cura di cotesti sintomi , nel medesimo articolo sopradDETTO .

Per allontanare l'eruzione dalla gola , egli è costume di appendere al collo del malato , durante l'effervescenza , un sacchetto di rutta fresca , animato da un pezzetto di canfora . Questo può farsi , purchè non si omettino i gargarismi , dei quali uno dei migliori è l'infusione di piantagine , raddolcita col siroppo di malva .

Per guarentire gli occhi , si coprono con una pezza di tafetà verde , bagnata con alcune gocce di spirito di vino canforato , e che attaccato al berettone , ondeggi sulle palpebre . Se il malato ha tosse , berà di tempo in tempo una tazza d'infusione di tasto barbaSSO , e di margheritine (g) . Durante l'eruzione , i malati continueranno il regolamento sopradDETTO , e si umetteranno molto colla tisana comune , o coll'acqua d'orzo pura o mescolata col latte ; e se l'eruzione minacciasse di rientrare , affine di mantenerla alla superficie del corpo , si useranno i rimedj , che avranno facilitato l'uscita del vajuolo . Ciò è , che si deve fare nei due o tre giorni , che l'eruzione dura ; e s' ella venisse a retrocedere , converranno immediatamente per rispingerla , i varj mezzi raccomandati a tal effetto per la cura dell'eruzioni all'articolo dei sintomi febbrili .

Fatta l'eruzione , si avvertirà , che la stanza dell' ammalato sia temperatissima per tutto il corso

(g) Offia bellide . *Bellis perennis* Linnaci : Serve a guarentire gli occhi dal vajuolo , dice de MEZA ( *Compendium medicum practicum* , ) un frontale di canfora : Importa pure di tenere i vajuolosi in luoghi oscuri , o per lo meno lontani da una viva luce . Il Sg. de la LASSONE , primo Medico del Re di Francia , nelle pustole vajuolose con minaccia della cornea trasparente , usò con profitto il continuo fomento di acqua rosa nuovamente distillata , e moltissimo odorosa . Il Tr.



della malattia . Affine ch' ei non respiri l' aria infetta della sua propria traspirazione , si terranno aperte le cortine del suo letto , e rinoverassi un pajo di volte al giorno l' aria della stanza , aprendo alternativamente la porta o la finestra .

Nel caso che il vajuolo sia confluyente , od abbondante , o l' ammalato molto agitato ed irritato , prima o durante l' eruzione , dacche questa sarà compiuta , si cercherà di raddolcire gli accidenti che dipendono dall' infiammazione delle pustole . A tal effetto il malato berà molt' acqua d' orzo od orzata leggierissima , prendendo in ciascuna libbra della sua bevanda , cinque o sei grani di nitro ; ed i brodi , che gli si daranno , faranno lunghi . S' egli è irritato od incomodato da dolori , da inquietudini , da veglie o da delirio , prenderà verso le cinque ore di sera , l' emulsione calmante N.º 66. , ciò che continuerassi ogni dieci ore , nel caso che il malato abbia delle minacce alla testa , le quali se fossero accompagnate da violenta febbre , o che l' infiammazione fosse vivissima , si esiterà tanto meno a salaffarlo dal piede , quanto che la roschezza infiammatoria delle pustole , e piastre sarà forte , e la suppurazione poco avanzata (b) .

Siccome i mali di gola raddoppiano in questo periodo , il malato si gargarizzi spesso colla infusione di fiori di malva , raddolcita col mele rosato ; gargarismo di cui userà egualmente , se la salivazione cominciassse a diminuire .

Dacche le pustole sono bianche , e gli accidenti dell' infiammazione considerevolmente diminuiti , ciò

K 2

(b) Per mantenere viva e permanente la fioritura delle pustole vajuolose , si danno alcuni grani d' etiope minerale , come insegnano COTOGNI , e DIMSDAL. *Il Tr.*

che nel vajuolo succede comunemente nel nono giorno della malattia , e nel vajuolo confluyente ordinario , nel dodicesimo giorno , si abbandona allora il regolamento ed i rimedj indicati ; prendendo solo appoco appoco brodi più stretti ; la bevanda sia una limonea leggiere ; ed avanzata la suppurazione delle pustole all'abito del corpo , affine di diminuire il rigurgito del pus nel sangue , si accorda un pajo di volte al giorno , alcuni cucchiaj di gelatina di carne condita col sugo di cedro . S'egli fosse debole , si unisce alla limonea un dodicesimo di vino bianco leggiere , e due o tre volte al giorno , negl' intervalli dei brodi , la mistura cordiale N.º 124.

Durante questo medesimo periodo , si può rimediare alla costipazione col lavativo domestico N.º 108. ; e ciò è quanto si può fare , allorchè non nascono , durante la suppurazione , rimarchevoli accidenti . Ma se la remittenza della febbre fosse di una gran forza , si purga il malato colla pozione minorativa N.º 168. , e dopo l'operazione del lassativo , l'emulsione calmante N.º 66. Affine di mantenere libero il ventre , conviene nel medesimo tempo una sufficiente quantità d'acqua d'orzo , raddolcita collo sciolppo di viole ; continuandone l'uso di siffatta raddolcente bevanda , fino a che la febbre sia diminuita .

Alcune volte succede , che le remittenze sono accompagnate da profondo sopore , o da trasporti , o che la rossezza della pelle improvvisamente impallidisca e si appassisca , o finalmente che il tumore del volto , o quello delle braccia e delle mani , si abbassa ad un tratto . Cotesi accidenti insorgono assai frequentemente nel vajuolo discreto , fra l'ottavo e nono giorno , e nel vajuolo confluyente , il decimo o duodecimo giorno ; sopra tutto quando la salivazione venga improvvisamente ad arrestarsi , o

che si abbia trascurato, nei principj del male, di rimediare alla pletora ; o finalmente invece di rinfrescare l'ammalato, si porgono medicamenti caldi. In questi casi si fa un pronto salasso copioso dal piede, poi la pozione minorativa N.° 168., da replicarsi ogni due giorni ; prendendo in seguito il siero di latte o l'acqua d'orzo, in sufficiente quantità per mantenere libero il ventre, fino a che sia fuori di pericolo . Quando al contrario, i suddetti accidenti sono stati preceduti da una grande debolezza, o perchè il malato fosse piuttosto indebolito, che aggravato da un considerevole movimento febbrile, si esibiscono immediatamente i cordiali, ed i vescicanti, raccomandati per la debolezza, all' articolo dei sintomi febbrili in generale (i) . E se il caso è urgente, o che l'ammalato abbia alcuni sintomi di pienezza allo stomaco, dacche sarà stato rianimato coi cordiali, gli si darà la polvere d'ipecacuana N.° 192. In vista della distinzione fatta, si cercherà di rimediare ai suddetti accidenti, come pure alle ambasce, alla oppressione soffocativa, ai movimenti convulsivi, ed altri sintomi, che sono comunemente funesti in questo periodo vajuoloso ; e nel caso che tali accidenti succedessero al subitaneo disenfiamiento della faccia e delle mani, si fomenteranno queste parti col decotto di malva piuttosto un po' caldo che tiepido, affine d'invitare di nuovo il gonfiamento . Se la gola fosse talmente incomodata, che minacciasse soffocazione, si circonda il collo col cataplasmo mollirivo N.° 15., injetando nella gola

K 3

---

(i) Convengono pure la chinacchina, ed i lavativi di china colla canfora, e gli epitemi coll'erbe leggermente aromatiche infuse nell'aceto, applicati sull'addomine. Nei casi di convulsione nata nel vajuolo, si prescrive il muschio, o l'opio, o la china. Il Tr.

l'infusione di malva raddolcita col mele, affine di fare aprire le pustole, che intoppiano i condotti; e se il caso è urgente, si cercherà di salvare il malato, coll'emetico, o la broncotomia.

Affine di diminuire le cavità e le cicatrici del volto, dacche le pustole isolate sono mature, a misura che se ne scorgono di bianche, si aprono desframente nella loro base, e si fomentano continuamente con pannolino inzuppato nell'acqua di malva o di seme di lino un po' tiepida. In tal modo si facilita la perspirazione delle materie acri, col rilasciare la pelle, raddolcendole nel medesimo tempo, ed impedendo che non s'infossino (k).

Quando gli occhi del malato sono chiusi, non si deggiono aprire con forza, ma si fomentano spesso col decotto tiepido di malva o col latte di donna, aspettando che si scostino. Se le narici fossero piene di pustole ulcerate, vi si introducono tastre inzuppate d'olio di cera rettificato, olio d'uova, od in loro vece, butirro fresco.

A misura che le pustole seccano, si ugnano le croste diggià seccate coll'olio mandorlino; e quando sono cadute, si cuopre leggermente un paio di volte il volto colla pomata N.º 161. Sei od otto giorni dopo questi preliminari, il convalescente comincerà ad inumidire il volto mattina e sera col vapore di acqua calda, non solo per ammolliare i margini delle cicatrici, che potessero ritrovarsi, quanto ancora per dissipare le macchie.

Si comincia a purgare il convalescente, cadute affatto le croste del volto. A tal effetto si dà ai fanciulli la bevanda di manna N.º 167., in dose

(k) Come anche s'impedisce, che non nasca la febbre secondaria di cattivo sarattere. *Il Tr.*



proporzionata alla loro età ; ed agli adulti , la porzione lassativa N.º 166. , da replicarsi ogni cinque o sei giorni, due tre o quattro volte giusta il bisogno . Si accorda alle ore dei pasti , fra le due prime purgazioni , un poco di minestra e qualche frutto cotto , crescendo in seguito insensibilmente la quantità degli alimenti , talmente , che per alcune settimane , osserveranno il metodo prescritto sotto la lettera B. , riprendendo insensibilmente il loro ordinario metodo di vivere . Se vi fosse restato nel sangue qualche fermento vajuoloso , i convalescenti avvertiranno di regolarli con maggiore cautela , evitando di esporli all'aria ; prendendo per quindici giorni , mattina e sera , il latte temperato con eguale porzione di decotto di china dolce N.º 35. , e replicando altrettante volte la purgazione , quanto che saranno incomodati da flussioni , da furoncoli , da ulcere , o da qualche altro avanzo della malattia . Nella lunga diarrea che succede al vajuolo , converrà il salasso ed il fiero di latte .

Nel caso rimanesse gonfiamento alle cosce , si fomenteranno , dopo replicata purgazione , col latte , con entro bollito un pugillo di fiori di camomilla , ed una pari quantità di foglie di malva , diluendo nella colatura mezz' oncia di sapone bianco .

Per ciò che aspetta agli accidenti quì non mentovati , si troveranno riferiti sotto la cura dei sintomi delle febbri in generale .

## R O S O L I A .

**L**A rosolia (a) è comunemente preceduta da un brivido interposto da calore . Poco dopo il ma-

K 4

---

(a) La rosolia , volgarmente detta *ferfa* è un morbo affine al

lato ha più o meno di febbre; è abbattuto, alterato; i suoi occhi sono turgidi e lagrimosi; egli starnuta frequentemente, e gli sgocciola dal naso un umore linfatico. A questi sintomi si uniscono un po' di raucedine ed imbarazzo alla gola; egli tosse e risente più o meno di oppressione; prova supore e mali di testa, non che vomiti, diarrea, e perdita di sangue dal naso.

L'eruzione comincia ordinariamente il quarto o quinto giorno dopo il primo assalto d'indisposizione con macchie, le quali al principio rassomigliano molto a quelle del vajuolo; si moltiplicano prontamente in modo che in poco tempo l'eruzione è fatta, ed il malato è coperto da macchie affai larghe, e pertugiate da piccoli grani, che si distinguono più al tatto che all'occhio, ammeno che la rosolia non sia pustolosa, nel qual caso i grani sono visibilissimi. La tosse, la sete, i mali di testa, e le agitazioni continuano e crescono ancor dopo l'eruzione. Il sesto od il settimo giorno di malattia, la faccia è un po' aspra al tatto: verso l'ottavo, le macchie sono leggermente farinose ed all'indomani spariscono. I malati hanno allora una piccola remittenza di febbre, oppressione e tosse, ed invece di una perfetta convalescenza, sono sorpresi soventi dalla diarrea, o da un resto di tosse con piccola febbre, e soggetti sono ad ostinate flussioni.

Prima, durante, e dopo l'eruzione della rosolia, si regola come nel vajuolo benigno; ed affine di mitigare la tosse, il malato bea spesso una tazza del decotto pettorale N.º 33. mischiato con porzio-

vajuolo: è malattia contagiosa: ordinariamente non invade più d'una volta uno stesso soggetto: più facilmente attacca quelli di prim'età, che gli adulti. *Il Tr.*

ne eguale di acqua, e raddolcita col siroppo d' altea o col mele bianco. A questo medesimo effetto prenderà l'eglemma raddolcente N.º 44. (b), e s'egli ha male di gola, si gargarizzerà coll' acqua d' orzo raddolcita col siroppo di more; dissipate intieramente le macchie, si purga come i convalescenti del vajuolo. Si replica il lassativo due o tre volte ogni otto giorni, e dassi mattina e sera, negl' intervalli, latte mescolato col decotto di china N.º 35.

A questo modo si cura la rosolia ordinaria; ma se la costituzione epidemica di tale malattia fosse cattiva, si usino, secondo le indicazioni, ed innanzi che si faccia l' eruzione, il salasso, l' emetico o la purga, com' è stato raccomandato per la cura del vajuolo. Se l' infermo è molto agitato, dassi verso la sera l' emulsione calmante N.º 66. Nel caso che dopo essersi dissipata la rosolia, l' oppressione e la tosse fossero considerevoli o pertinaci, o che 'l convalescente fosse debilitato dalla diarrea, non si esiti di salassarlo, rimediando a questi diversi accidenti, col siero di latte, e con un regolamento raddolcente. Se la testa fosse incomodata da dolori vivi; che il malato avesse subdelirj, o che l' eruzione non fosse stabile, si rilasci il ventre col lavativo domestico N.º 108.; si applichi il senapismo N.º 16; e se questi sintomi fossero gravi, anche i vescicanti alle gambe. Se rimanesse qualche altro avanzo delle

---

(b) ROSENSTEIN suole usare in questi casi un eglemma composto con un tuorlo d' uovo, e due once per forte d' olio di mandorle dolci spremuto a freddo, di risana d' orzo perlato, e di siroppo cedrato. agitati assieme, fino a che la massa diventa bianca come latte. BORSIERI ne suggerisce un altro fatto con due dramme di gommarabica sciolta in tre once di emulsione di seme di melone, aggiugnendo un' oncia d' olio di mandorle dolci espresso senza fuoco, e dalle due dramme ad un' oncia, a proporzione dell' età, di siroppo di papavero bianco: dassi a cucchiariate. *Il Tr.*

rosolia, non si lasci di ripararvi coi rimedj necessarj, e replicare la purgazione dopo la malattia, a proporzione che la rosolia sarà stata pericolosa (c).

## FEBBRI MALIGNÆ.

**D**Affi questo nome a tutte le malattie febbrili, che accompagnate sono da sintomi gravi, straordinarj, e troppo rimarchevoli, per poter dipendere

---

(c) E' stato proposto dal Dottor Francesco HOME, celebre Medico del Collegio di Edimburgo d'innestare la rosolia. (*Medical facts, and experiments*, pag. 268.): le ragioni di questo Autore prodotte a favore di questa operazione, sono 1. Che coll' innesto si diminuisce, e si allontana la mortalità: 2. Si previene la tosse tanto incomoda per i malati: 3. S'impediscono le malattie degli occhi, e le altre cattive conseguenze, pur troppo facilmente succedanee alla rosolia.

L'innesto si eseguisce, col trarre da qualche parte del corpo di un ammalato di rosolia, alcun poco di sangue, inzuppandone un po' di cotone: questo cotone si applica così imbevuto sul braccio della persona da inocularsi, avendovi dapprima fatta una leggerissima ferita, per modo che ne trapeli un po' di sangue, e lo si ritiene con dolce fasciatura: Fatta quest'applicazione, si regola nel resto come per l'inoculazione del vajuolo, con questo di differenza, che vi si lascia il cotone per tre giorni senza levarlo: Verso la sera del sesto giorno dopo l'innesto, nasce una piccola tosse con febbre leggiera, non accompagnata nè da veglie, nè da ottalmia, ed altri sintomi infiammatorj; escono le pustole, le quali si squamano senz'altra cattiva conseguenza: E' stato pure proposto di adoperare invece del sangue, la saliva, o le lagrime, che colano nel tempo della crisi, oppure le squame furfuracee, che cadono sul finire della malattia. MONRO: *De ven. lymphat.*, pag. 58.

Siccome il grave pericolo della rosolia, dice TISSOT, nasce dall'infiammazione dei polmoni, prodotta dal veleno deposto su quest'organo, che pur troppo facilmente avviene, questa si toglie, o si diminuisce, applicando il veleno sopra una parte esterna. VOGEL (*De cognosc. & curand hum corp. affect.* §. 135.) consiglia l'uso di questo innesto nell'epidemie maligne:

Che che ne sia del merito di questa pratica, constando, che più di una volta la rosolia invade lo stesso soggetto. (DUBOSQ *de la ROBERDIERE*: *Journal de Médéc* Tom. 28., pag. 254.) sembra essere inutile cotesta operazione; tali sono almeno i sentimenti di ABR. MATTHIEU: *Hist. febr. malign. morbill.*, di BERTRANDI: *Opere cerussiche, ed anatom.*, e di BORSIERI: *Instit. med. pract. Il Tr.*



dal grado della febbre, che si rileva dal polso o dalle cagioni della malattia, che si sono potute conoscere.

Si distinguono le febbri maligne, in quelle che hanno un carattere di malignità sino dal loro principio, ed in quelle, nelle quali i sintomi della malignità nascono durante il corso, o nel vigore della malattia.

Rispetto alla febbre maligna di prima specie, ella è comunemente epidemica, e sembra dipendere da un fermento sparso nell'aria, e che si trova qualche volta nell'acqua e negli alimenti. Questo fermento essendo più o meno attivo nelle diverse costituzioni epidemiche, il corso della malattia varia per conseguenza, come anche secondo il temperamento, e la buona o cattiva costituzione delle persone, che ne sono invase.

Questa malattia comincia per lo più da scadimento di forze. Il malato è abbattuto, debole; ha le membra rotte; prova peso, stordimento, o mali di testa; egli è svogliato, triste; è di un umore molto ineguale; e le persone stabilmente astanti, rilevano che qualche volta fragiona un poco. Il suo polso è nel medesimo tempo quasi naturale, piuttosto piccolo che sollevato, ed ha degl' intervalli, nei quali si crederebbe più indisposto che attaccato da una malattia così grave. Questo stato dura più o meno di giorni: la circolazione e tutte le funzioni della natura languiscono, e si osserva fregolamento o diminuzione in alcune secrezioni. A questi sintomi succedono assai spesso mali di cuore, vomiti o spontanea diarrea: la frequenza del polso, la febbre e la debolezza crescono, ed il malato comincia ad avere delle remittenze senza o con freddo. Il germe che dapprima era inceppato, si sviluppa, diviene più attivo, e corru-

ga i vasi capillari, a segno che la circolazione faffi molto stentata. Il malato soggiace a svenimenti, a tremori, a subsulti, ed altri sintomi che provengono dall' impressione, che fa il fermento sui nervi; le secrezioni diminuiscono sempre più; la lingua diventa secca, aspra, e qualche volta nera; la traspirazione è soppressa; le orine sono crude, e cominciano le congestioni della materia morbosa negl' ipocondrij, la quale vi apporta un dolore od un gonfiamento accompagnato da ambasce, da oppressione, e da una secca tosse.

Quando la congestione faffi al cervello, allora i mali di testa raddoppiano, ed a misura ch' essi crescono, il malato se ne lamenta meno; egli è meno alterato; i suoi occhi sono smarriti; il colore della faccia è più animato; le labbra e le mani tremano; egli delira od è assopito, fino a che dura la congestione.

Se il fomite si getta sulle vie orinarie, sul petto ec., i sintomi ch' egli produce, variano secondo la sensibilità e la funzione della parte affetta. Sono le diverse congestioni della materia morbosa, che nascono, si dissipano, e ritornano alternativamente per tutto il corso della malattia; e che dipendono le burrasche e le calme ingannevoli, le quali rendono l' esito incerto e pericolosissimo fino al momento della convalescenza.

Se la congestione è considerevole o pertinace, il fomite s' infiamma, si sfacela o manda in putrefazione la parte sopra la quale ella si fissa; ciò che succede tanto più prontamente, quanto la materia è più esaltata e più acre. In mancanza di questi eventi, la febbre maligna si rallenta, si rimette, e strascina in lungo, fino a che il germe morboso sia scacciato con una eruzione, una evacuazione o con una metastasi critica; o che la materia morbosa sia

rintuzzata e scacciata insensibilmente per i diversi luoghi delle secrezioni : ciò è che vedesi frequentemente , quando nel vigore della malattia , la lingua diventa molle ed umida ; che le secrezioni state diminuite , crescono a misura ; e che le remittenze e gli accidenti della febbre diminuiscono nel medesimo tempo .

La febbre maligna di seconda specie , diviene tale per accidente . Le diverse febbri non maligne , delle quali si è parlato , ed in particolare quelle epidemiche , sono le più soggette a prendere un carattere di malignità , allorchè al principio della malattia si è omezzo di evacuare sufficientemente le prime vie ; o quando invece di diluire e temperare il fomite morbofo , si è invece accresciuta la sua attività coi rimedj caldi ed acri . Il cangiamento d'una febbre non maligna in febbre maligna succede ancora , quando qualch' eruzione , od evacuazione , che farebbono state favorevoli o critiche , sono state deviate e sopresse .

La malignità accidentale comincia a manifestarsi alla cessazione o diminuzione delle diverse secrezioni . Il malato è molto più abbattuto ; le remittenze , e gli accidenti della febbre , crescono , e comunemente la sete diminuisce . La lingua diviene arida , la pelle secca , le orine più crude e meno abbondanti . A questi sintomi si uniscono ben presto quelli che caratterizzano la febbre maligna di prima specie , e principalmente il delirio od il trasporto , il sopore e le affezioni convulsive , ed i varj accidenti riferiti all' articolo dei sintomi febbrili in generale , ed in particolare a quello della materia morbofa al cervello .

Siccome s'ignora la specifica qualità dei germi morbofi e dei miasmi che apportano le febbri maligne ; e siccome non si conoscono meglio gli antido-

ti, coi quali potere distruggerli prontamente, non puossi meglio operare, che di cominciare dall'evacuare prontamente le materie delle prime vie, e di rimediare in seguito alla plethora, affine di prevenire l'accrescimento della febbre, che potrebbe dipendere da queste due cagioni; tanto piu che al principio della malattia, il fomite della febbre maligna risiede per la maggior parte nello stomaco.

Per poco dunque che l'ammalato abbia la bocca cattiva, la lingua paniosa, o lo stomaco imbarazzato, conviene la polvere emetica N.º 178.; e dopo l'operazione del vomitivo, il clistere purgante N.º III. Ma se il febbricitante fosse decisamente di temperamento sanguigno o pletorico, e che la febbre fosse viva, od accompagnata da notabile dolore, si fa precedere al vomito una od anche due o tre cacciate di sangue; e questa non ostante la soffocazione e la piccolezza del polso. Fuori di questi casi non si salassa il malato, il cui temperamento sia sanguigno o pletorico, che dopo avere evacuate le prime vie. Comunque la cosa sia, non si tarderà a replicare senza indugio l'emetico anche sotto piccola indicazione, e sopra tutto se l'ammalato è stato sollevato dal primo; diversamente si purga colla pozione lassativa N.º 166., da replicarsi ancora del pari che il salasso, giusta il bisogno, e fino a che il polso e le prime vie sieno sufficientemente disimpegnate. Non si salasserà una persona di costituzione debole o flemmatica, se non dopo una maturata riflessione. Conviene ancora le più volte di non salassare simili infermi, sopra tutto quando nella medesima epidemia, avesse prodotto cattivi effetti in altri medesimamente ammalati. Guarderassi egualmente dal replicarlo, ammeno che non sopraggiunga qualche dolore infiammatorio od una congestione della materia morbosa al cervello, o sopra qualche al-



tro viscere, che richiedesse assolutamente il salasso, nei quali casi si preferirà sempre il piede al braccio, sopra tutto se l'ammalato prova gravi mali di testa .

Negl' intervalli dell' evacuazione, il malato non prenda che brodi mediocrementi stretti: bea nel medesimo tempo molta tisana comune N.° 210., od acqua d' orzo o di cedro tiepida; stia in una stanza piuttosto fresca e ben ventilata; e s' è stato fortemente irritato dai rimedj evacuanti, si dia prima dell' emetico o della purga, una presa delle gocce anodine N.° 89., da prendere, s' egli è molto debole, in un pajo di cucchiaj della mistura cordiale N.° 124.

Rimediato al putrido delle prime vie, si cerca di diluire, di snervare, di digerire e di dissipare insensibilmente il germe morbofo residente nel sangue. Dall' altra parte si previene la congestione della materia morbofa sulle viscere: si avrà cura di conservare le forze dell' ammalato, e di mantenere tutti i colatoj liberi ed aperti, fino a che la natura insegna la strada della crisi, o che la materia morbofa sia insensibilmente ma intieramente distrutta. A questo fine i malati di temperamento freddo, flemmatico e pigro, beranno molta tisana tiepida di scorzonera N.° 217., e gli altri abbondantemente della tisana comune o limonea leggiere ogni quattr' ore; un brodo fatto di vecchio pollo o con mezza libbra di coscia di vitello, e questo più o meno stretto secondo lo stato della febbre e le forze dell' ammalato; negl' intervalli dei brodi, la mistura diaforetica N.° 125. Si rimedierà altronde alla costipazione, od alla cessazione delle secrezioni, nel modo raccomandato per la cura dei sintomi, che sopravvengono nelle febbri; e nel caso che 'l malato abbia qualche eruzione od evacuazione spontanea, si

agirà secondo gl' indizj dati al medesimo luogo, avvertendo di non soffermare la diarrea, ammeno che non sia evidentemente nocevole.

Con tali precauzioni, e coll' uso frequente dei piediluvj caldetti, ed animati da una tazza di aceto forte, o da un mezzo cucchiajo di senape polverata, si prevengono tante volte le congestioni pericolose della materia morbosa. Se non per tanto insorgessero, il malato continuerà a bere molto, e vi si rimedierà immediatamente, osservando quanto al delirio, alle affezioni soporose, ed agli altri accidenti che ne dipendono, la distinzione, che è stata fatta, parlando dei sintomi che nascono nelle febbri.

Tolta la congestione, si ritorna all' uso dei medicamenti, stati sospesi per rimediarvi, che si continueranno fino a che la febbre sia terminata con insensibili evacuazioni, o fino a che sopraggiunga una eruzione, una evacuazione, od una metastasi critica. Se la natura manca, si eccita coi rimedj prescritti per la debolezza, che sopraggiunge nelle febbri.

Durante il vigore della febbre maligna, i brodi faranno di polti d' orzo o d' avena condite col sugo di cedro, e migliori, quando sarà stato considerevolmente indebolito dalla lunghezza della malattia, o dalle copiose evacuazioni, e sopra tutto s' egli è naturalmente di debole costituzione. I malati con segni manifesti di putridità, si riconfortano coll' uso moderato di un vino che non sia violento, piuttosto bianco che rosso e mescolato con limonea od acqua; e dacche la diminuzione della febbre lo permettano, si dà loro per cordiale e febrifugo, tre once del decotto antisettico N.º 22., ad ogni ora.

Rispetto alla febbre maligna accidentale, nel caso che il malato non sia stato sufficientemente purgato nei principj della malattia, e ch' egli sia ancora affetto da sintomi indicanti pienezza o putrescenza  
nelle

nelle prime vie , non si può far meglio , affine di arrestare i progressi della malignità , che di farlo bere molto , e di purgarlo prontamente secondo l'indicazione , colla polvere emetica N.º 178. , o colla pozione minorativa N.º 168. Se gravi mali di testa o qualche dolore ostinato e vivo , che l'ammalato provasse , o se la durezza del suo polso , la rossezza del volto , od altri sintomi di tale natura , indicassero una disposizione all' infiammazione , si premette alle evacuazioni sopra indicate , il salasso , replicando l'emetico o la purga sino a perfetto svuotamento delle prime vie , dopo di che si userà il decotto anti-setico sopraccennato .

Se per lo contrario il fomite maligno non fosse nelle prime vie , e che dipendesse da un sangue esaltato ed acceso per difetto di sufficiente bevanda , o per l'uso dei medicamenti caldi od acri , si salassi immediatamente , dando a bere molto siero di latte depurato , o leggierissima orzata ; poi la polvere temperante N.º 190. , e mattina e sera un lavativo di siero , o quello N.º 108.

Nel caso finalmente che la malignità provenisse dalla mancata salutare e critica evacuazione , o da una retrocessa eruzione , si regola secondo il prescritto per il regolamento di simili accidenti , all' articolo dei sintomi febbrili . In tutti questi casi si sostengono le forze dell'ammalato , e si combatte la ragione della malattia , sino a che sia intieramente vinta . Si usa per questo effetto , come per gli accidenti nati , ciò che è stato raccomandato per la febbre maligna di prima specie ; e tolta la malignità , trattasi la malattia giusta il carattere preso .

*Febbre putrido-maligna .*

Questa febbre che è sempre più o meno contagiosa , è endemica nei luoghi caldi ed umidi , dove



L'aria manca di elasticità, e dove le acque e gli alimenti inclinano alla putrefazione. Tante volte per le medesime cagioni ella diventa epidemica, ed invade qualche volta in inverno, nei climi freddi, le persone che passano da un gran freddo ai poli caldissimi: Questa malattia si annuncia colla maggior parte dei sintomi della febbre maligna. Il male di testa è considerevole fino dappprincipio, come anche il calore, il quale alterna col brivido: il malato ha la lingua molto lorda di una sozzura spessa e secca; prova peso allo stomaco con incomodissimi rutti di putrida amarezza: ha l'occhio molto animato e brillante, ed il bianco lucente, mentre che il corpo e lo spirito sono derelitti e spossati: Ben presto la sozzura della lingua diviene fosca: la lingua medesima trema nello sporgerla, e seccasi prontamente al segno che diviene aspra ed ineguale, piena di scalfiture. Questa secchezza è mantenuta dall' inaridimento delle fonti salivali. La pelle è così secca e così ardente che non può starvi lungamente la mano applicata senza risentirne il medesimo incomodo. Il malato ha sudori freddi, e costipazione, o se il ventre fa il suo uffizio, scarica materie di un puzzo insopportabile. Le orine sono crude, il polso frequentissimo e piccolo. A misura che la malattia s'avanza, la respirazione è laboriosissima, ed interrotta da profondi sospiri. Allora la cornea s'infiamma; ed assai volte appajono nel medesimo tempo macchie rosse o livide sparse sull'abito del corpo; ulcere nerastre nella bocca, e vescichette astose alla lingua. Quando la dissoluzione del sangue è arrivata al suo colmo, ne trapela una sierosità tinta di sangue; qualche volta ancora sopraggiunge emorragia da naso; il polso trema piuttosto che non batte; ed il malato, il di cui fiato è puzzolente, è reso come insensibile, e gettato in un



profondo sopore, con subdelirio, delirio e movimenti convulsivi. In questo stato nasce facilmente la gangrena alle estremità, ed alle parti naturali, o tumore nelle grosse glandole, particolarmente nelle anguinaglie, e presso l'orecchio nelle glandole parotidi.

La vera febbre putrido-maligna ha dei rapporti colla peste: ammazza sì prontamente, che un metodo ragionato non arriva a salvare l'infelice.

La prima cosa a farsi, è di trasportare il malato, se la stagione il permette, in una camera vasta, dove possa avere giorno e notte una corrente d'aria. Le persone campagnuole, sopra tutto se avviene molte attaccate nella medesima casa, si trasportano immediatamente sull'aja, oppure in una rimessa a due porte opposte, delle quali una resti aperta, e piuttosto alzato che coricato, sopra materasso di crine, o di paglia fresca, rinnovata tutt' i giorni, e coperto da un solo lenzuolo.

In questa malattia, il miglior cordiale, essendo un'aria fresca ed elastica; se la stagione non permette di esporre l'infermo all'aria aperta, bisogna rinnovare giorno e notte quella ch'ei respira. Questa precauzione congiunta all'uso abbondante di buon vino, guarentirà gli astanti dal contagio.

Siccome in questa febbre, i malati ricercano bevande acide, si fa bere abbondantemente ai ricchi la limonea unita con un ottavo di vin bianco; ed ai poveri l'officrato, fatto con un forte aceto unito a cinque volte più di acqua pura e tiepida, oppure la piccola birra. Per cibo basta, di quattro in quattro ore, una polte d'avena, di orzo, di riso nell'acqua, animata da un quarto di vin bianco, o condita con sugo di cedro o di zucchero.

Dacche l'ammalato è in istato di essere purgato coi sintomi indicanti un ammasso di putrescen-

za nelle prime vie, si dà la pozione emetico-lassativa N.° 165.; ed in mancanza di manifesta indicazione per l'emetico, o per troppa debolezza a sostenere cotale evacuazione, il decotto anti-fetico N.° 22., tre once ogni ora. Negl' intervalli bea un bicchiere di buon vino, temperato, s'egli è forte, con un terzo o metà d'acqua, ed in mancanza di vino, buona birra, o cedro, non desistendo mai da questi alimenti e da queste bevande. Rispetto ai sintomi urgenti, che puonno insorgere, si consulti a questo proposito ciò ch'è stato detto, parlando della cura dei sintomi delle febbri in generale. Si osservi sempre di evitare il salasso e di mantenere con grande avvertenza l'umidore, che potesse sopraggiugnere, il quale sarà sempre più benefico quanto più prolungato. Ecco perchè si deve sfuggire l'aria, ed insistere nelle suddette bevande tiepide.

Questa mortale malattia, in cui il sangue e le parti, sulle quali si fanno delle congestioni, si gangrenano prontamente, è brevissima. Quando si forma una congestione peripneumonica al petto, ammazza nel terzo giorno; di rado dura più di sette: Per salvare il petto, e togliere i dolori che inclinano all'infiammazione, bisogna applicare subitamente un largo vescicante o sul petto, o sulle altre parti che sembrano infiammate. I tumori che si formano sulle glandole, si trattano secondo l'indicato all'articolo della metastasi, parlando degli accidenti febbrili; ed affine di salvare la testa e di sostenere le forze coll'irritazione, si applicano di buon'ora i vescicanti alle gambe.

### *Febbre lenta.*

Ella si manifesta con una frequenza od alzata del polso, comunemente più sensibile verso la sera e

nel tempo della digestione. Tale malattia è ordinariamente lunga; e siccome i suoi accidenti crescono, e si moltiplicano insensibilmente, se ne distinguono tre periodi.

Nel primo, il movimento febbrile, e gli accidenti della febbre sono leggieri; le funzioni del corpo si eseguiscano a dovere, ed il malato è per lo più in istato di attendere ai suoi affari. Appoco appoco la febbre diviene più sensibile; il malato ha ciò non ostante dei buoni intervalli più o meno lunghi; il freddo febbrile è tante volte così leggiero, ch'egli si manifesta soltanto dal corrugamento della pelle. Il calore febbrile è in seguito più distinto e più lungo; il malato è alterato; ha rosse le guance; risente calore al palmo della mano od alla pianta dei piedi; e questi ritorni febbrili si terminano con un umidore, che lo indebolisce; le urine ch'ei rende, sono allora mattonose. Tali sono i sintomi del secondo periodo, durante il quale l'ammalato s'infiacchisce e smagra ad occhio veggente. Ha qualche volta appetito vorace, ma il più spesso svogliatezza e ripugnanza alle carni; digerisce male; ha la bocca cattiva e la lingua paniosa ed altri sintomi indicanti pienezza nelle prime strade. Allora egli soggiace a remittenze, le quali rassomigliano molto agli accessi della febbre continua o terzana doppia.

Quando la febbre lenta è permanente, o che le remittenze sono frequenti e considerevoli, si uniscono ai suddetti sintomi i sudori notturni ostinati e copiosi. Allora la febbre lenta è nel terzo grado. Si gonfiano ordinariamente le gambe; si perdono le forze; i capelli cadono; non vi sono se non le forze somministrate dalla febbre; gli organi sensuali s'indeboliscono, e l'ammalato s'incammina insensibilmente alla sua fine, e muore senz'accidenti, e



muore idropico ; tante volte manca sotto la diarrea od il sudore colliquativo.

Comunque sia il corso ordinario della febbre lenta ; tale malattia non lascia di essere suscettibile di grandi variazioni, tanto rispetto ai sintomi, come alla durata di ciascun periodo, ed alla difficoltà di guarirla. Ella differisce secondo la cagione, l'età e la costituzione dell'ammalato. In generale quand'è nel secondo periodo, è difficile a guarire; nel terzo l'ammalato si ristabilisce di raro.

Affine di curare questa malattia con buon successo, si ricerca scrupolosamente la cagione, che proviene qualche volta unicamente da un vizio nella massa umorale, unita ad una grande irritabilità dei nervi. L'irritazione sconvolge la digestione, e le secrezioni, ciò che dà luogo ad inzuppamenti impercettibili nelle glandole linfatiche, nei polmoni, ec. Ciò è, che costituisce la febbre lento-nervosa.

La febbre lenta è altronde prodotta da una favorra nelle prime vie ; da vermi che tolgono e viziano il chilo, o da qualche inzuppamento visibile od invisibile del ventre inferiore, il quale nuoce alla digestione, ed impedisce il passaggio del chilo nel sangue. Ma la più rea cagione di questa malattia, e che è pur troppo frequente, è una suppurazione, un ascesso, od un'ulcera nell'interno del corpo, che sono o non sono conosciute.

La febbre lenta che proviene dalla prima di queste cagioni, è familiare alle persone affette da un vizio scrofoloso, scorbutico, vajuoloso, o nelle quali si è ripercossa una malattia cutanea, o fermato qualche scolo abituale promosso dalla natura o stabilito dall'arte, siccome i cauterj, ec. Invade ancora le persone, le quali avendo un sangue disciolto, sono snervate da perdite sanguigne.

Se avvi luogo a credere che la febbre lenta



provenga dall'acrimonia della massa umorale, si consulti quanto si è detto a questo proposito. Si comincia la cura, coi diversi rimedj raccomandati per correggere questi diversi vizj dei liquidi, e si fanno nel medesimo tempo uno o due cauterj (a). Immediatamente avanti i suoi pasti, il malato prenderà 20. grani di chinacchina polverata; esercitandosi molto, s'egli è possibile, a cavallo, oppure in una carrozza aperta, a stomaco vuoto.

Se la febbre è prodotta da un germe particolare, vi si rimedia coi rimedj specifici. Se esistesse una ripercussione di qualche umore, o la cessazione di qualche colatojo, si provvede alla pienezza delle prime vie colle dolci purgazioni; tali che la pozione mannata N.º 167., o la minorativa N.º 168. Ri-

L 4

(a) Dassi il nome di cauterio a qualunque ulcera artificiale fatta con arte per procurare lo scolo della materia morbosa, ed agli istrumenti, coi quali si formano cedesse ulcere. Importa però di distinguerli, essendo gli uni gli effetti degli altri. Il cauterio come strumento, è ciò che chiamasi caustico; il cauterio come fontanella ( di cui intende parlare l'Autore ) è una piccola ulcera artificiale fatta o con lancetta o colla pietra da cauterio, o con il ferro riscaldato: I luoghi dove si formano queste fontanelle, sono ordinariamente il collo, le braccia, le cosce, e le gambe: Spetta al Chirurgo una tale operazione; è però dovere del Medico d'insinuare all'infermo di mantenere la più possibile nettezza della piaga, cambiare i pannolini ogni volta che si medica; medicare regolarmente due volte al giorno, ammeno che contrarie indicazioni non facciano al Medico decidere diversamente: Dippiù egli importa che gli ammalati sappiano essere pericolosissima cosa il chiudere improvvisamente un cauterio; nè ciò deggiono mai essi fare se non previo parere di un esperto pratico.

Fra i rimedj irritanti e stimolanti, che agiscono come la moxa, il fuoco, i vescicanti, i cauterj, ec.; è l'ago-puntura, consistente in una specie di puntura, che farsi con aghi, fatta sopra le parti viziate da qualche male: operazione molto usata nel Giappone, e che meriterebbe di essere fra di noi praticata, concorrendovi la ragione, a consigliarla. Vedasi a questo proposito TEN-RHYNE, de *Artibride*. Londini. 1693. cap. de *acupunctura*: DUJARDIN, *bistoire de la Chirurg.* Tom. I., pag. 89. HAEMPFER, *amenit. e vol.*, pag. 528. RIBOLI, *sull' uso del fuoco*. li 27.

dotte in buon essere le prime vie, si rinnovano i soppressi od inariditi scoli. In caso di serpigine, o di scabbia ripercosse, s'innesta il malato cogli analoghi fermenti, e si termina di guarirlo colla dieta lattea specificata sotto la lettera G. Si avvertirà sempre di dare ai malati di temperamento secco per sola bevanda il decotto di china dolce N.º 35., temperato con un terzo di latte. Prima dei passi prenderanno tutti, 15. grani di chinacchina polverata unita a cinque grani di rabarbaro; e cessata la febbre lenta, si curerà la scabbia, gli erpeti, ec. giusta il regolamento prescritto per la cura di siffatte malattie.

La febbre lenta che proviene dall' ostruzione del basso ventre, viene tante volte in seguito ad altre malattie, e particolarmente alla febbre d'accesso, come anche alla soppressione delle morroidi e dei menstrui, ed a tutto ciò che può accagionare alterazione ed ostruzione nelle viscere: Per curare questa malattia, si rimedia alla savorra delle prime vie, secondo il prescritto per la cura delle savorre, e delle malattie verminose, avvertendo però di usare i più dolci evacuanti.

Se l' ammalato soffre di evidente ostruzione, prenda in seguito, s'egli è nello stato di sopportarla, la polvere aperitiva marziale N.º 172., mattina e sera, soprabbevendo il brodo disostruente N.º 13.; ovvero il siero di latte coi sughi delle erbe N.º 193., o le acque minerali ferruginee leggerissime, nominate sotto il N.º 3. Se l' ostruzione fosse poco rilevante, e la febbre non per tanto di una certa qual forza, darassi mattina e sera, ott' once, o quanto potrà sopportare, del latte d' asina, mescolato con doppia dose d' acqua di Selz, od un terzo di quella di Vals, o d' altr' acqua minerale aperitiva, continuandone l' uso, fino a che la febbre lenta

fia del tutto dissipata . Si nutrirà leggermente di minestre, pesci salubri, cotti nell'acqua, o di un po' di carne bianca .

Se la febbre lenta fosse venuta in seguito alla soppressione delle morroidi, e de' mestruì, si usciranno contemporaneamente i rimedj compatibili, raccomandati per ristabilire il flusso di questi scoli; e nel caso fosse successa ad una febbre periodica mal guarita, questa rinascendo, si lascerà di soffermarla coi febrifughi, mantenendola in vece col metodo raccomandato a tal' effetto all' articolo delle febbri d' accesso .

Allorchè la febbre lenta proviene da un'ulcera, da una suppurazione, o da un'ascesso nascosto, si chiama comunemente febbre etica . CoteSta malattia succede ad una febbre continua, quando questa finisce con un deposito, o metastasi, per cui la materia morbifica rigurgita, o poca o molta nel sangue, ed apporta più o men febbre . Spesso ancora vien dietro alla febbre lenta, se l'acrimonia, che la produce, è tanto considerevole per produrre qualche flogosi, erosione, ed esulcerazione nei polmoni, od altrove; ma ella nasce frequentemente in seguito alle infiammazioni interne, terminate colla suppurazione, o da ulcera prodotta dalla corruzione del sangue stravasato . Da ciò ne proviene spesso l'emotisi, o sputo di sangue .

Le persone attaccate da febbre etica, oltre i sintomi generali della febbre lenta, provano varj accidenti, i quali dipendono dalla funzione del viscere, o della parte, che è ulcerata . Le loro orine sono coperte da una pellicola oleosa, lucida; e quando il male è avanzato, depongono tante volte un sedimento purulento . Altronde i progressi della febbre etica sono altrettanto più rapidi, quanto il sangue è più acceso, ed acre .



Se il deposito delle materie è esternamente accessibile, si cerca di ammolliare, e di maturare al più presto il serbatojo, coi cataplasmi ammollienti, e maturativi N.º 15. e 17. Si apre tosto, ch'è maturo, secondo le regole chirurgiche, medicandolo in seguito, com'è prescritto all'articolo degli ascessi. Se la suppurazione, ed il riassorbimento del pus facesse sussistere la malattia, dassi, mattina e sera, una mezza libbra della mistura composta di parti eguali di latte vaccino, e di acqua seconda di calce (b), osservando il regolamento latteo specificato sotto la lettera G.; o nel caso non potesse sopportarlo, si adatterà al metodo balsamico annunciato alla lettera F.

Se l'ascesso è interno, si cerca di ammolliare il fondo contenente il pus, col suddetto metodo latteo, col prendere mattina e sera un pajo di cucchiaj d'olio mandorlino, e siroppo d'altea, in parti eguali. Si provoca la rottura dell'ascesso, colla scossa della carrozza, del cavallo, o d'altri convenienti esercizi. Ecco ciò che si deve fare, quand'è presumibile la maturazione dell'ascesso; locchè succede ordinariamente alla fine del quarantesimo giorno. Rotto l'ascesso, si facilita l'evacuazione del pus per la via dalla natura preparata, prendendo in seguito mattina e sera, nella dose che uguaglia il volume di una noce moscata, di balsamo del Locatelli N.º 5. La bevanda ordinaria sia latte mescolato con parti eguali d'infusione balsamica N.º 100., o di due terzi d'ac-

(b) L'acqua di calce si fa col prendere otto boccali di acqua comune, che si versa appoco appoco sopra una libbra di calce viva di fresco calcinata: cessata l'effervescenza, si rimescola bene il tutto; si lascia riposare finchè la calce sia calata al fondo; si feltra per carta, e si conserva in bottiglie ben chiuse: l'acqua di calce seconda si fa col versare sopra il fondigliuolo, dopo che si è travasato, e tirato a chiaro, la prima acqua di calce, *Il Tr.*



qua di Selz; stando alla dieta bianca indicata sotto la lettera G.; e se il latte fosse contrario, quello balsamico specificato sotto la lettera F., e nel medesimo tempo la chinacchina pura, da unirsi al rabarbaro, se il ventre, che in tutte le specie di febbri lente deveſi mantenere moderatamente aperto, non ſi depone almeno una volta in trentasei ore. Nel reſto ſi facilita l'evacuazione delle materie purulente; e s'elleno procedeſſero dai polmoni, ſi tratta l'ammalato come nella polmonia.

*Confunzione.*

E' queſto il luogo di parlare di due altre malattie, le quali hanno relazione colla febbre lenta, in ciò ch' eſſe ſono di lunga durata; e che coloro i quali ne ſono affetti, languiſcono, ſi eſtenuano e ſi diſſeccano inſenſibilmente. Si tratta dunque della confunzione chiamata tiſichezza nervoſa, e del maraſmo.

La tiſichezza nervoſa comincia ſoventi da un leggiero gonfiamento nell' abito del corpo, il quale, tranne del pallore, raſſomiglia piuttosto a graſſezza, che ad enfiagione. Quelli che ne ſono affetti, provano avverſione a tutta ſorta di cibi ſolidi: rimettono poche orine, le quali ſono ordinariamente roſſe, e non ſono pallide ſe non quando ſono abbondanti. Le carni e le forze ſi conſumano appoco appoco, ſenza che il malato riſenta incomodo calore, o difficoltà a reſpirare, od altri accidenti febbrili, ammeno che la tiſichezza non ſi avvicini all' ultimo grado.

Queſta malattia proviene principalmente dall' impoverimento del ſangue, dall' abbaffamento dei vaſi capillari, dall' inerzia dei corpi glandoloſi, dallo ſcadimento del genere nervoſo. Quand' eſſa è

inveterata, l'ammalato sviene e muore senza penosi accidenti, a riserva di una piccola tosse secca, la quale incomoda moltissimo.

L'ammalato deve evitare i travagli dello spirito, e tutti gli esercizi, che diminuiscono le forze; usare dolce fregagione, per un quarto d'ora mattina e sera per tutto il corpo con una flanella; esercitarsi molto, in carrozza, e più a cavallo; vivere in un' aria campestre salubre, piuttosto umidetta che secca; e s'egli è molto debole, sostenersi con latte da donna.

In mancanza di questo regolamento, ei prenda mattina e sera, latte d'asina nella dose sopportabile, e prima di ciascuna presa, dieci grani della polvere anti-etica N.º 171. Se il latte gli fosse contrario, si puonno sostituire, i brodi N.º 14., emulsionati; il latte artificiale N.º 112.; o la gelatina di salab N.º 88., sopra tutto quando avvi sospetto di esulcerazione, nel qual caso il decotto di lichene islandico N.º 32., ne seconderà i buoni effetti. Durante l'uso del latte, o dei suoi succedanei, alle ore del pranzo e della cena, s'egli sopporta il latte, si accorda un po' di pane, bevendo appoco appoco una libbra circa del latte di vacca appena tratto: s'egli non lo soffre, ricorra agli alimenti i più leggieri dei metodi B. ed F. Tutte le volte di costipazione, prenda, prima dei due pasti, la polvere di chinacchina col rabarbaro, secondo che è stato consigliato per la febbre lenta; se nò, la sola chinacchina. Un pajo di volte per settimana, si bagni a digiuno, nell'acqua-crusca tiepida imbianchita di latte, dimorandovi per mezz'ora. Dacche farà istato di viaggiare, farà viaggi di lunga corsa nei climi temperati; ed acquistato miglioramento nella persona, si getti alle acque minerali acidette, e ferruginee, nominate sotto il N.º 2.; vivendo di ali-

menti i più facili a smaltirsi specificati sotto le lettere B. F. G. Affine di prevenire ogni recidiva, rinovi per più anni, in primavera, il latte d'asina, od i suoi succedanei già indicati. In autunno mangi molta uva bianca, ben matura, dolce, ma non troppo vinosa, nè troppo sugosa.

*Marasmo .*

Il marasmo è proprio dei vecchi decrepiti, e delle persone snervate da lunghe malattie, dalla dissolutezza, o dai travagli dello spirito. Questa malattia si conosce dalla secca magrezza, e debilità degli ammalati. La pelle è aderente alle ossa, i vasi capillari sono inariditi, e la circolazione non faffi che nei grossi vasi. La bocca altronde è secca, e la saliva tenace. L'ammalato è svogliato, ha fredde le estremità al tatto, mentre che internamente soffre incomodo calore: orina molto e spesso con dolore: il polso è duro ed elevato; la respirazione è un po' difficile, e la voce rauca: s'viene appoco appoco; e qualche volta finisce colla gangrena, la quale investe le estremità o le parti, sulle quali s'è obbligato di starsene coricato.

Il malato prenda due o tre volte per settimana, un bagno d'acqua-crusca imbianchita col latte; si nutrisca in oltre di brodi sostanziosi, di piccattigli, come anco dei brodi N.º 12., nei tempi nei quali potrà procurarseli, di cioccolata ed altri alimenti ristoranti, presi poco per volta, ma spesso. Si conceda più volte al giorno, un po' di vino prelibato, ed al bisogno si rianimi colla mistura N.º 124.; col fiutare acque odorifere, ed in caso urgente, lo spirito volatile N.º 75.; si lavino ancora i polsi e le tempia coll'acqua della regina o di lavanda. S'egli fosse molto debole per usare degli



alimenti ristoranti indicati , e che non per tanto sopportasse il latte, prenda per tutto pasto , di sei in sei ore, sei once di latte vaccino appena tratto, senz' altro cibo, se non che a mezzo giorno , una tazza di eccellente cioccolata , con alcune piccole fette di pane abbrustito , astenendosi da tutto ciò , che diminuisce le forze, e principalmente dai travagli dello spirito, che alterano dispiacevolmente .

Si rimedia alla costipazione col lavativo domestico N.º 108. ; ed affine di animare la circolazione, si fanno dolci fregagioni mattina e sera , con una flanella, sulle estremità, fatte dal basso in alto . Potrassi far prendere alle persone di costituzione fredda e flemmatica , i brödi di vipera .

## DELLE OSTRUZIONI IN GENERALE.

**D**Opo le febbri, il genere di malattia più familiare , è l' ostruzione , o l' intercezione , più o meno perfetta e considerevole del corso dei fluidi, nei vasi della parte viziata . Quando l' ostruzione è leggiera, chiamasi ingorgamento ; e l' ingorgamento che non è permanente, nominasi congestione . Quando la parte è costantemente ostrutta, al segno di essere palpabile , il male è chiamato ostruzione avvertata ; e quando la ostruzione è confermata al segno, che la parte è ostrutta e dura al tatto , resistente poco o nulla sensibile ; allora non rimane che poca o nessuna circolazione nella parte morbosa , e l' ostruzione prende il nome di tumore scirroso .

Nel primo caso, la circolazione è meno intercettata, che impedita, ed i diversi gradi d' ostruzione, che non sono palpabili , si manifestano ancora con più o meno di stitatura, di peso, d' imbarazzo, e di dolore, giusta la sensibilità, e la situazione della parte affetta ; ma sopra tutto per il difetto



delle funzioni , che sono proprie del viscere ostruito . Le conseguenze dell' ostruzione sono , l' infiammazione , la suppurazione , lo scirroso indurimento , l' aridezza della parte affetta , le affezioni idropiche o paralitiche , la confunzione e le febbri lente od etiche ; e rispetto agl' ingorgamenti , che si fanno nel basso ventre , le conseguenze loro più ordinarie sono l' ostruzione delle viscere , l' ipocondria , e tutto ciò che accompagna queste malattie .

Per facilitare la cura delle ostruzioni si divideranno in tre classi . Sotto la prima noi collocheremo i mali di congestione , cioè a dire , le affezioni catarrali , reumatiche e gottose : sotto la seconda , gl' ingorgamenti e le ostruzioni glandolose ; e nella terza saranno classificati gl' ingorgamenti e le ostruzioni delle viscere .

Siccome queste malattie sono tutte croniche , o non acute , ed atteso ch' elleno sono complicate colla fredda tenacità , calda od atrabile del sangue , o con l' uno o con l' altro dei vizj della linfa , dei quali si è parlato , egli è essenzialissimo di cominciare dal consultare ciò , che è stato detto sopra queste materie ; affine di adattare conseguentemente il metodo da seguirsi . Osservando questo andamento , e , se l' ostruzione si esterna , applicando sulla parte affetta , l' impiastro di sapone , si dissipano ordinariamente gl' inzuppamenti , non inveterati , e le recenti ostruzioni ; ed il sangue essendo in migliore stato , gli aperitivi sono più efficaci . In questo caso l' ammalato non può far meglio , che di osservare costantemente il metodo raccomandato per la specie di tenacità in lui esistente . La sua bevanda ordinaria sia la tisana aperitiva N.° 206 . , in una dose considerevole . Rispetto ai rimedj per lui convenienti , siccome la risoluzione delle inveterate ostruzioni richiede un lunghissimo tempo , regole-

rassi a questo effetto secondo le stagioni, ed in vista degli appresso rischiarimenti.

Per poco che l'ammalato sia pletorico o caloroso, si preferisca il salasso agli aperitivi. S'egli è sanguigno, o che la parte ostrutta sia irritata o disposta ad infiammarsi, si replica il salasso secondo il bisogno, durante il tempo della cura, e soprattutto all'avvicinarsi degli equinozj. In primavera usi per sei settimane il sugo dell'erbe aperitive N.º 193., soprabbevendo una tazza, od una quantità sopportabile di siero vaccino, e nel coricarsi, sino al venire della canicola, una presa dell'elettuario aperitivo marziale N.º 47.; ed alla mattina, il siero di latte calibeato N.º 147. Durante la canicola, beà tutte le mattine, o le acque minerali saponacee, che mantengono libero il ventre, o le acque ferruginee diuretiche e leggiere, nominate sotto il N.º 3.; ed in seguito, per una quindicina di giorni, le acque termali fondenti e moderatamente purgative; poi, prima del finire dell'autunno, ritorni al sugo dell'erbe aperitive sopra nominate.

In inverno prenda, alternativamente, per un mese, prima di coricarsi, quattro delle pillole gommose N.º 152., ed il mese susseguente, sei pillole di sapone N.º 159., soprabbevendo un brodo di coscia di vitello, alterato colla cicoria amara, ed al suo svegliarsi, quello del N.º 13., e contemporaneamente all'uso di siffatti rimedj, fra la giornata, e negl'intervalli dei pasti, bea una libbra di decotto, fatto con un'oncia e mezzo delle cinque radici aperitive, con una dramma della *terra fogliata di tartaro*; e tutte le volte ch'ei cangia rimedio, si purghi come anche nel cominciarli e finirli, col decotto lassativo N.º 31. In ciascuno di questi cangiamenti, si sospendano i rimedj per otto giorni, nei quali, se la stagione lo permette, prenda i bagni dome-

domestici tiepidi N.º 2., con entro disciolto un mezzo quarto di libbra di sapone bianco: sortendo dal bagno, berà il brodo N.º 11.

Nelle ostruzioni complicate con freddo condensamento del sangue, i bagni domestici sono meno necessarj, ed il salasso ordinariamente più notevole che utile. I sughi dell'erbe aperitive, i brodi amari N.º 10., le pillole gommose, l'elettuario aperitivo marziale, il siero di latte calibeato, i bagni e le acque termali fondenti, e leggermente purgative, sono i rimedj preferibili in questi casi.

Nelle ostruzioni accompagnate da condensamento atrabile del sangue, si preferisca il siero di latte raddolcito col mele, od il siero anti-scorbutico N.º 146., i bagni domestici e le acque minerali, leggere, saponose, acidette e ferrugine. Gli esercizi del corpo, ed i travagli dello spirito sian moderati; e l'ammalato bea molt'acqua di ruggine N.º 39. Nelle ostruzioni con condensamento della linfa, dopo i rimedj generali raccomandati per la tenacità della linfa, conviene una quindicina de' suddetti bagni: si purga in seguito ogni otto giorni, col siroppo lassativo N.º 197., e per sei settimane, nel coricarsi, si dà una presa della polvere di mille piedi composta N.º 174. Durante l'uso di questi ultimi rimedj, l'ammalato si guardi dal freddo, dai latticinj; bea molto decotto di china dolce N.º 35.: finalmente nel caso che si riesca di guarirlo, converrà continuare pazientemente i rimedj raccomandati per le ostruzioni in generale.

Nelle ostruzioni delle viscere del ventre inferiore, l'ammalato è soventi disposto all'emorroidi. In questo caso si preferiscono le sanguette all'ano; e più le ostruzioni sono inveterate, più lentamente si proceda; e si useranno gli aperitivi forti ed irritanti, con tanto maggiore circospezione, quanto che



la parte viziata si veda inclinare allo scirro, o sia irritata e disposta ad infiammarsi. In tutte queste specie di ostruzioni, si rimedia alla costipazione col lavativo domestico N.º 108.; conviene l'esercizio moderato, accrescendolo gradatamente; e preferendo quello fatto a cavallo che non in carrozza. Oltre la persistenza paziente nell'uso di tali rimedj, si praticherà tutto ciò che la medicina possiede di meglio per levare le ostruzioni; e siccome l'acqua che cade a goccia a goccia, trafora i più duri sassi, così arriverassi insensibilmente al termine, di dissipare le ostruzioni risolubili le più ostinate.

Nel caso che non si possa usare le acque minerali ferrugine, si supplisca, infondendo la palla marziale (a), nell'acqua minerale ant-acida aperitiva N.º 17., fino a che dessa sia tinta, ed abbia contratto un sapore leggiero di ferro. In sua mancanza si può prendere nel primo bicchiere di queste acque, dieci grani di sale di Marte. Nel caso, in cui le ostruzioni fossero scirrole, si abbandonino intieramente gli aperitivi, adoperando soltanto il siero vacchino e le acque minerali leggiere, pure, o mescolate col latte d'asina; e se lo scirro s'indolentisse, si solleva il malato col salasso, coi semicupj domestici, e l'emulsione calmante N.º 66., fino ad intiera calma dell'irritazione. Si sfuggano in seguito i rimedj, e tutto ciò che potrebbe riscaldare il sangue, od animare la circolazione, osservando solo il

(a) La palla marziale, chiamata ancora palla di Nancj, o palla vulneraria, è una composizione di una parte di limatura di ferro e due di cremore di tartaro, unite e collegate coll'acqua vite: se ne prende di questa palla la grossezza che piace; si pone in acqua tiepida quanto si vuole; scuotendola fuor a che l'acqua abbia contratto un colore giallo citrino; si leva la pallotola e si rivolge in pannolino, che possa assorbirne l'umidità ed impedire che non si dissolva. *Il Tr.*



regolamento latteo espresso sotto la lettera G. , potendo l'ammalato a questo modo vivere lungo tempo , esente da gravi incomodi (b) .

## DELLE CONGESTIONI CATARRALI .

**I** sintomi delle congestioni catarrali variano , secondo la copia , tenacità , acrimonia dell' umore catarroso . La corizza , il reuma del cervello , il gonfiamento pituitoso delle amigdale , e dell' ugola , che è accompagnata da difficoltà di trangugiare ; flussioni dei denti , delle guance , delle palbebre , o delle orecchie ; il torcicollo , e la curvatura , la raucedine ed il reuma di petto , sono prodotti dalla congestione catarrale su queste diverse parti : Si parlerà segnatamente delle due ultime , come pure della peripneumonia .

Per ciò che riguarda le altre flussioni , che le parti affette siano o nò tumefatte , ogni qual volta

M 2

(b) Non è sempre vero , che la grossezza delle viscere addominali dipenda da ostruzione , ossia da intasamento , e stagnazione degli umori tanto circolati , che separati nell' ultima estremità dei vasi ; ma le tante volte trae origine da dilatazione avvenuta nei vasi dei visceri medesimi , come benissimo ha rilevato colla scorta dell' anatomia l' illustre professore di Pavia , e valente anatomico Sig. REZIA , nel suo libro , che ha per titolo *Jacobi REZIAE olim anatoimes , nunc Physiol. Profess. in R. A. Ticin. Specimen observat. Anat. & Pathologicar.* Ticini 1784. 8.

Il cel. COCCHI parlando delle malattie del basso ventre disse anch' esso , che la milza è capace d' ingrandimento per la dilatazione delle sue cavità vascolari , ed è atta a creare in se durezza o freddo tumore per riempimento di esse cavità , e per la concrezione di parte dei naturali umori , e di materie estranee minute , e resistenti introdotte coll' alimento , e massime coll' ordinaria bevanda ; e n' è tanto persuaso questo Medico toscano dell' ingrandimento delle cavità vascolari , che dispera del beneficio delle acque termali ogni volta , che s' incontra la sola accresciuta mole di questa viscera senza la sua deformazione in pieno e non penetrabile tumore scirroso .  
*Dei Bugni di Pisa. Al Tr.*

fiano pallide, gonfie, niente riscaldate, poco dolenti e che l'ammalato sia senza febbre, si può esser certo che l'umore della flussione è freddo, e prodotto dal ristagno di una densa pituita, che si dissiperà colla traspirazione, e col facilitare lo sgorgamento degli umori catarrosi. A tal effetto si stia in sito caldo; prendasi mattina e sera, dopo essersi coricato, due cucchiaj della mislura diaforetica N.º 125.; ed in seguito una sufficiente dose d'infusione di fiori di sambuco, affine di provocare un dolce sudore. Se la flussione vizia alcune parti, che siano suscettibili di essere perfumate e fregate, si perfumino col zucchero, col carabe (a), o colle bacche di ginepro, e si freghino dolcemente con flanella perfumata delle medesime droghe.

Se l'orecchia è sorpresa da fredda flussione, vi si applica in diverse volte, un sacchetto caldo di parti eguali di fiori di camomila e di sambuco polverati, spruzzati leggermente con acquavita canforata; in cui mancanza, si supplisca colla midolla di una pan tella divisa in due, ed irrigata d'acqua della regina. Nell'intervallo di queste applicazioni, fassi colare nell'orecchie alcune gocce d'olio tiepido di camomilla.

Se la flussione è sugli occhi, si bagnano le palpebre coll'acqua tiepida mischiata con un decimo di acqua vulneraria, od acquavita: se ella viziasse la guancia o le gengive, si mastichi la radice di pietro, affine di facilitare lo sgorgamento degli umori, e si applichi sulla guancia il sacchetto nominato.

(a) Il carabe chiamato ancora, ambra-gialla, o fuccino, è un bitume che trovasi nel mar baltico, di color giallo più o men carico, odorifero, e tanto più quando si arde, infiammabile, elettrico, trasparente, fragile, di sapore acre spiacevole, insolubile nell'acqua, solubile negli olj, ed alcun poco nello spirito di vino, e miscibile coi tuorli d'uovo:

Dassi internamente come spettorativo, e più comunemente per fare suffumigj corroboranti, discuzienti, e correttivi dell'aria. *Il Tr.*

Nella rancedine e nel reuma del cervello, si fusi acqua tiepida mischiata ad una parte eguale d'acqua della regina o del sugo di porro, e prendasi alcune prese del tabacco cefalico N.º 109., o sale d'Inghilterra, o lo spirito volatile N.º 75., unguendo la radice del naso con sevo unito ad un po' d'olio moscato.

Per il gonfiamento dell'ugola e delle amigdale, si applichi un sacchetto di ceneri calde intorno al collo: si gargarizzi spesso con latte bollito con sufficiente quantità di pepe per renderlo piccante; e se la difficoltà d'inghiottire fosse accompagnata da rancedine, si respiri il vapore del decotto di fiori di sambuco. Per disimpegnare e sgorgare le gengive, si tenghi costantemente in bocca acqua tiepida.

Nel caso che queste diverse flussioni fossero considerevoli o molto fastidiose, si abbrevierà molto la loro durata con un vescicante applicato il più presto possibile alla parte affetta; e se ancora strascinarsero in lungo, si purgherà a diverse riprese collè pillole cefaliche N.º 151. Nell' affezione dell' orecchio si applichi un vescicante, dietro a questa parte in forma di mezza luna, o sulle tempia, se sarà sui denti, prendendo inoltre quattro o sei gocce d'olio di cajeput (b) con un pezzetto di zucchero, da lasciare

M 3

---

(b) L'olio di cajeput o di kaiuput si ottiene dall'albero nominato *melaleuca leucadendron* di LINNEO, *Mant. pl.* 105. Quest'olio si distilla in gran copia nell'isola di Banda, che rinchiuso in bottiglie si rimette in Europa. Egli è pellucido, sottile e spira fortissimo odore di cardamomo: Le sue virtù sono di riscaldare efficacemente, di agitare il sangue e gli altri umori, di rimolare i nervi e di attenuare colla sua qualità sottile i lenti umori. Egli è pure validamente sudorifero, onde la sua decantata virtù nell'edema e nell'idrope anasarca da CARTHEUSERO nella sua dissertaz. *de oleo kaiuput*. Egli è pure mirabile quest'olio a calmare i movimenti spasmodici e convulsivi. *Id. Tr.*



liquefare in bocca, avvertendo di fare scorrere la saliva sulle parti viziate senza timore d'ingojarla, ripetendo questo rimedio, fino a che sentesi sollevato.

Le recidive di queste congestioni catarrali essendo familiari ai fanciulli, ai vecchi, ed alle persone, le quali peccano di freddo condensamento del sangue o della linfa, si preserveranno col metodo e rimedj suggeriti per correggere questi vizj dei fluidi, come ancora mantenendo sempre libera la traspirazione.

Quando la parte investita dalla flussione è riscaldata, e sorpresa da forti dolori, da irritazione, da pizzicori, e da bruciore, la flussione è di natura opposta alla fredda. L'umore catarrale è in allora caldo ed acre, e proprio ad infiammare le membrane e glandole, che ne sono inzeppate. In tal caso conviene salassare il malato, esibire la mistura temperante N.º 130., e favorire lo svuotamento degli umori, rilasciando semplicemente i vasi. A tal effetto si fomenteranno continuamente gli occhi coll'acqua tiepida; se la flussione è sulle orecchie, sulle guance, o sul gorgozzule, si applichi sulla parte morbosa la fomentazione N.º 82., allorchè il dolore sarà vivo; diversamente, il cataplasmo mollitivo N.º 15., dopo aver fatto colare nell'orecchio dell'olio di fiori di verbasco, o di mandorle dolci. Per la flussione delle gengive si gargarizzi, e si risciacqui spesso la bocca coll'acqua tiepida. Nel reuma del cervello, ungasene la radice del naso, colla pomata raddolcente N.º 161, e si tiri su pel naso dell'acqua mischiata ad un quarto di latte. In questa specie di flussione, per cibo siano polti d'avena, di riso, d'orzo, frutti cotti ed erbaggi raddolcenti, beendo la mattina prima di levarsi, l'infusione dei fiori di sambuco unita a parte eguale a quella di tiglio, ed in sufficiente quantità per eccitare e mantenere una dolce traspirazione, e nel dopo pranzo



un' orzata molto leggiera e tiepida. Continuifi tutto fino al declinare della flussione, purgando allora il convalescente colla pozione minorativa N.º 163.

Se questa specie di flussione fosse ostinata, o nel caso di recidiva, si potrà conchiudere, che la massa del sangue o della linfa è acre, e non si otterrà la guarigione radicale, se non usando i rimedj raccomandati per correggere l'acrimonia, che domina negli umori, all' articolo delle acrimonie linfatiche.

Allorchè le flussioni sono mal regolate, o che i fermenti catarrosi sono molto acri ed attivi; la parte, su cui la flussione si è formata, s' infiamma effettivamente. Egli è allora che si manifesta con un segno di calore, di ardore, come ancora con un dolore vivo, e con spasimi nella parte viziata, accompagnati da febbre.

Se l' infiammazione arriva al principio, o nel corso della flussione, si deve fare un generoso salasso; e se si teme di suppurazione, o se la flussione alla gola è accompagnata da raucedine, si replica il salasso secondo il bisogno, ed a piccoli intervalli. Il regolamento dell' ammalato sia il fluido, della lettera H., e beva molta tisana comune N.º 210., o d' orzo N.º 213., oltre i topici, i cataplasmi, e tutto ciò che è stato raccomandato più sopra, per risolvere le parti inzuppate, continuando a prendere la mistura temperante N.º 230.

Se il male fosse nella gola, conviene il gargarismo comune N.º 86.; e se esistesse nel medesimo tempo la raucedine, prendasi di tempo in tempo un cucchiajo da caffè dell' eglemma radolcente N.º 44. Nel caso, che l' infiammazione non cedesse a un pajo di salassi, o fossero stati ommessi nei suoi principj, sarà inutile di trarre molto sangue, e d' insistere sulla risoluzione, soprattutto nelle flussioni delle

orecchie, e specialmente delle guance, atteso che non si farebbe che ritardare la suppurazione, la qual' è inevitabile. In tal caso conviene invitarla, continuando il cataplasma mollitivo N.º 15. Affine si apra internamente l'ascesso della guancia, e della gola, si terrà costantemente in bocca, latte bollito con alcuni fichi, e si gargarizzerà con questo decotto, fino a che l'ascesso sia aperto; allora si gargarizzerà, per detergerlo e guarirlo, coll'acqua di salvia, raddolcita col mele rosato. Se l'ascesso è aperto eternamente, si regolerà in tal caso, com'è stato insegnato all'articolo delle infiammazioni, che finiscono coll'ascesso.

*Raucedine, e reuma di petto.*

Quando gli umori catarrosi viziano la membrana mucosa, e le glandole della trachea-arteria, nasce la raucedine, e la mancanza della voce; e quando si gettano sulle ramificazioni dei bronchj, producono i reumi di petto.

La raucedine catarrale è ordinariamente accompagnata da qualche difficoltà d'inghiottire. Comunque la cosa sia, quando il malato è senza febbre, ardore, dolore, e forti irritazioni in gola, l'umore catarroso è freddo, e dolce; e per disimpegnare la trachea-arteria, basta mantenersi caldi, prendere i rimedj raccomandati più sopra per le flussioni fredde, fasciarsi il collo con fazzoletto di seta, o con sacchetto pieno di crusca, o di ceneri calde, bere l'infusione di salvia raddolcita col mele, ed inspirare spesso il vapore d'acqua bollente di fiori di sambuco; e se questa raucedine traesse in lungo, purgherassi l'ammalato colle pillole purgative N.º 156.

Quando al contrario la raucedine è accompagnata da secchezza, da asprezza, da dolore, da ar-

dore, da forti titilamenti, o pugnimenti nella gola, conchiuderassi, che la trachea-arteria è viziata, o per lo meno minacciata da flogosi, nel qual caso, se non vi si avverte, la raucedine porterà la cessazione della voce, e l'infiammazione sarà seguita da ulcera in questa parte. In tale specie di raucedine, farà sempre bene di salassare il malato, anche replicatamente, se la flussione fosse accompagnata da considerevol febbre; bere molto siero di latte depurato, e tisana tiepida di seme di lino N.º 212.: inspirare spesso il vapore d'acqua-crusca, e prendere la mistura temperante N.º 230. Se la gola fosse secca, aspra, o che gli umori della spettorazione fossero acri, si userà l'eglemma raddolcente N.º 44., od il loc bianco di Parigi (c), applicando al collo il cataplasmo ammolliente N.º 15.; essendo costipato, si applica il lavativo domestico N.º 108., astenendosi dalle carni e dal vino, e nutrendosi solo di polti di riso, d'orzo, di frutti cotti, e di erbaggi raddolcenti. Se per avere omesse tali

(c) E' composto il loc bianco di Parigi come segue: Prendete liquirizia ammascata: un danaro: acqua comune: once quattro: mandorle dolci N. 20.: gomma dragante polverata finamente: grani fedici: siroppo diacodio, e di malva: ana once mezza: olio di mandorle dolci: once una: acqua di fiori d'arancio: drame due.

Mettete in una boccia la liquirizia: versatevi l'acqua bollente; frattanto che fatti l'infusione, ponete le mandorle dolci nell'acqua bollente: lasciatele un momento: scorzatele, poi lavatele nell'acqua fredda: in seguito si pistano in mortajo di marmo con pestello di legno, spruzzandole coll'infusione di liquirizia: si passa questa emulsione per stamigna: si ripulisce il mortajo ed il pestello: Mettete la gomma dragante nel mortajo con un cucchiajo di latte d'armandole: agitate la mistura col pestello, fino a che sia ridotto in mucilagGINE: allora incorporatevi appoco appoco l'olio e lo sciloppo: agitate la mistura, fino a che sia divenuta molto spessa, bene incorporata, e che non v'appajono grumi. Diluite questa mistura col resto dell'emulsione, agitando il tutto con un pestello; e sulla fine aggiungete l'acqua di fiori d'arancio: mettete il loc in un vasc. *Il Tr.*



precauzioni, il malato sputasse, in seguito alla raucedine, materie purulente od intrise di sangue, non lascerà di gettarsi immediatamente al metodo latteo specificato sotto la lettera G., affine di prevenire i progressi dell'ulcera e della polmonia. Rispetto ai reumi di petto, la prima attenzione che deve aver, ella è, di bene esaminare, se il catarro è caldo o freddo, e se l'umore catarroso è acre o sensibilmente falso, affine di non isbagliare nella scelta dei rimedj assolutamente opposti.

I reumi caldi sono ordinariamente preceduti da brividi, seguiti da calore, da sete, da debolezza, e dalla perdita od avversione dell'appetito. I malati sono oppressi; sentono calore, dolore, o punture al petto; la tosse frequente piuttosto secca che umida, e le ramificazioni dei bronchi minacciate, o diggià investite dalla flogosi.

Quando i reumi sono freddi, l'ammalato è freddoloso ed intormentito: Questo reuma è comune specialmente ai fanciulli, ed ai vecchi di temperamento freddo e pituitoso; ed è sovente preceduto ed accompagnato da reuma del cervello, da un gonfiamento pituitoso delle amigdale, e dell'ugola, e da una distillazione d'umori pituitosi, che cadono sulla gola. La tosse è umida, e l'ammalato rimette materie pituitose piuttosto insulse che acri; è poco o niente febbricoso. Questa è la specie più ordinaria dei reumi.

Si abbrevierà questo reuma, tralasciando di riscaldarsi o di raffreddarsi; usando sobrietà nelle carni e nel vino; beendo molta tisana comune N.º 210., ed un pajo di volte per giorno, alcune tazze d'infusione pettorale N.º 104., od una leggiere infusione di veronica raddolcita col siroppo di capelvenere; Convien pure il sugo di liquirizia per facilitare l'espettorazione. Un dito di punck, di bishop, o



vino di Malaga , sono egualmente profittevoli per maturare questa specie di catarri (d). Tutte le volte che il reuma freddo farà lungo , ed accompagnato da un' espettorazione abbondante , è bene purgarli dolcemente e per più giorni di seguito coll' infusione pettorale lassativa N.º 104., ed alla fine , colla pozione lassativa N.º 166.

Nei reumi accompagnati da movimento febbrile , si rifletterà , se l' espettorazione è facile o stentata , e se le materie sono pungenti ed acri , o tenaci e glutinose : Più la tosse farà secca , più il malato berà delle suddette tisane , ed inspirerà spesso il vapore d' acqua-crusca bollente . Nel caso , che le materie , che si sputano , sieno sierose od acri , si danno nel medesimo tempo le paste d' altea , o l' eglemma raddolcente , od il loc di Parigi ; e se la tosse fosse frequente , o nel caso ch' ella raddoppiasse , affine di mitigarla , si prende nel coricarsi mezz' oncia di siroppo di papaveri , o quattro grani delle pillole di cinoglossa , astenendosi dalla carne , e dal vino . Ma se il calore fosse considerevole , l' ammalato potrà bere , dopo il mezzo giorno , limonea calda , od orzata leggiere e tiepida , e prendere il latte di gallina alla sera nel coricarsi (e) .

Quando al contrario la materia che si espettorava , è tenace e vischiosa , s' incide l' umore catarroso , e si facilita l' espettorazione , colla polvere pettorale

(d) Il punch , è una bevanda propria degl' Inglese , la quale si prepara al momento con acquavite , o spirito di vino , o rum , o rack , o cedro . o zucchero , il tutto allungato in una grande quantità di acqua .

Il bishop è una bevanda usitata in Inghilterra , che si compone coll' infusione degli aranci amari nel vino nero più prelibato . *Il Tr.*

(e) Si prepara il latte di gallina ( *lac gallinaceum* ) con disciogliere un tuorlo d' uovo in ott' once d' acqua bollente , colla giunta di sufficiente quantità di zucchero . *Il Tr.*

N.° 185., soprabbeverendo una tazza d'infusione della scorza di legno di sassafra, raddolcita col mele; e beendo molta infusione di veronica, o pettorale non lassativa; e, se verso la sera abbisogna, affine di mitigare la tosse notturna, si danno sei grani di pillole di storace. L'espettorazione divenuta facile, l'ammalato può accontentarsi di bere frequentemente una tazza del decotto pettorale N.° 33; ma s'ella fosse molto abbondante od ostinata, la si abbrevia con una presa della polvere vomitiva d'ipocacuana N.° 192., locchè ripugnando, affine di deviare gli umori dal petto, si prescrive per più giorni consecutivi, l'infusione pettorale lassativa. Tutte le volte, che i muscoli del petto saranno debilitati dalle scosse della tosse, si ugherà questa parte coll'unguento pettorale N.° 140.

Ciò è quanto si deve fare per ridurre a termine questa specie di reuma del petto. S'egli degenerasse in reuma caldo, si userà quanto siegue.

Siccome nei reumi caldi, la flogosi, che investe le ramificazioni dei bronchi, degenera facilmente in infiammazione, da cui può risultare la polmonia, conviene farsi immediatamente salassare. Il regolamento da osservarsi, sarà di prendere spesso una lunga poltiglia, beendo molto fiero di latte tiepido, e ben chiarito, raddolcito col siroppo di viole o d'altea, ed in mancanza del fiero di latte, la tisana di crusca N.° 218. Replieherassi il salasso secondo il bisogno, e nella quantità sufficiente, sino a che la febbre, la oppressione, i dolori ed i calori del petto siano sufficientemente diminuiti, stando, giusta lo stato della tosse, al metodo e rimedj raccomandati per il catarro di seconda specie.

Le persone soggette ai reumi freddi, si guerentiranno dalle recidive, seguendo le direzioni date per correggere il freddo condensamento del sangue,

ed esercitandosi molto a cavallo; e quelle facili ai reumi caldi, uferanno il regolamento ed i rimedj raccomandati per la calda tenacità del sangue.

Si distruggono i fomiti catarrosi, e si premunisce dai reumi, e dalle flussioni, che produce l'acrimonia della linfa, o semplice o complicata col condensamento di questo fluido, seguendo gli avvisi dati per correggere cotali vizj. Si acostuma a distinguere la tosse catarrale dalla stomacale, consultando l'articolo delle favorre; dalla spasmodica, ricorrendo all'articolo degli spasmi, e della tosse asinina; e finalmente dalla tosse etica e polmonica, dando un colpo d'occhio sulla descrizione che è stata fatta di queste malattie.

## DELLA CONGESTIONE CATARRALE SUL POLMONE

O

### PERIPNEUMONIA CATARRALE.

**Q**uesta malattia è comune nei primi freddi dell'inverno, e nelle subitanee alternative del caldo e del freddo. Proviene dall'inzuppamento catarroso dei vasi capillari del polmone, prodotto dalla retrocessa traspirazione unita alla viscosità della massa umorale. Invade frequentemente i vecchi, e le persone di temperamento flemmatico, soggette ai catarrhi ed ai reumi pituitosi.

La malattia comincia dai sintomi del reuma; la saliva è tenace e glutinosa; i malati sono molto oppressi, ed incomodati da' brividi, che alternano più o meno col calore. A cotali sintomi si congiungono l'oppressione, le inquietudini, le vertigini, un grande imbarazzo alla testa, ed una tosse accompagnata da espettorazione di materie vischiose, che si staccano con pena, e si sopprimono con faci-

lità. Le orine sono comunemente torbide, spesse e bianche; il polso imbarazzato e come soffocato, di modo che la febbre non annuncia punto il pericolo, che corre la persona attaccata da questa malattia, la quale conduce spesso alla tomba, senz'essere stata preceduta da sintomi indicanti un evento così fatale.

Le sue conseguenze sono una disposizione alla recidiva, ed ai tubercoli polmonari; qualche volta ancora degenera in peripneumonia infiammatoria.

Nei principj del male, è necessario salassare quelli, che sono evidentemente pletorici; cavando solamente sei a sette once di sangue, da replicarsi se l'oppressione e la rossezza del volto fossero considerevolissime. Si sbarazzi sempre lo stomaco al più presto possibile, colla polvere emetica N.° 178. (a), e gl'intestini col lavativo purgante N.° 111. Dopo queste evacuazioni devesi bere costantemente ogni quarto d'ora, una tazza di tisana di Sandali N.° 216., molto calda; inspirare spesso il vapore d'acqua bollente coi fiori di sambuco; prendere le polveri pettorali N.° 185., soprabbevendo una tazza della sud-

(a) Ciò si conforma alla pratica del celebre Medico Vienneſe STOLL, il quale non ſolo raccomanda nei mali di petto gli emetici, per iſbarazzare lo ſtomaco dalle ſuperflue lordure, ma coll'indicazione ancora di provocare la ſpettorazione:

Il ſolenne rimedio ſpettorante (*Solemne remedium expectorans*) di queſto Autore è compoſto di cinque once d'acqua di ſambuco, nn' oncia per ſorte d'oliſſimele ſemplice, e ſcillitico, e due grani di tartaro emetico; e nel caſo il malato poteſſe ſopportare, ſi accreſce fino ai tre grani, da prenderſi in 24. ore, diviſo in ſei doſi. Queſto eſimio ſcrittore tanto è perſuaſo del valore degli emetici nelle malattie di petto, preferentemente ancora ai purgativi, che ci laſciò ſcritto il ſeguente precetto: *Damanda praxis eſt, quæ adeo mollem medicinam facit, ut nunquam emeticum, ut ut indicatiſſimum, propinare audeat, ſed eccoproticis, veterumque minorativis ſæpius, & per epicraſin datis, morbum unico emetico jugulandum, perſæpe cum periculo ægri non exiguo, in longum trahit*: STOLL, *ratio medendi*, P. I.; e queſto precetto prevale affai più nelle pleuritidi e peripneumonie, così dette bilioſe. *Il Tr.*



detta tisana; applicare un giorno sì e un giorno nò, il lavativo purgante suddetto; e se l'oppressione resistesse a tali rimedj, o che la spettorazione d'imminuisse molto, aggiugnere a ciascuna presa delle polveri pettorali, un grano di kermes minerale. Se nelle 24. ore, cotal rimedio non sollevasse l'ammalato, prenderà ogni due ore uno o due cucchiaj della mestura anti-asmatica N.º 118.; e se l'espettorazione fosse poco meno che mancante, si applicheranno i vescicanti fra le scapole, ed alle gambe.

Rispetto al regolamento da osservare, si dia ogni quattr'ore, per tutto pasto, un buon brodo fatto con vecchio pollo sgrassato, o con una fetta di coscia di vitello, in cui farassi infondere un puggillo di cerfoglio, o di cicoria. Diminuito il male al segno, che s'avvicini alla natura del reuma, si useranno, secondo lo stato della tosse e dell'espettorazione, i diversi rimedj raccomandati per la cura dei reumi, avvertendo sempre di fare le distinzioni nominate alla fine del precedente articolo, e di purgare i convalescenti, due o tre volte, ciascuna con qualche giorno d'intervallo dapprima colla pozione mannata N.º 167., ed in seguito colle pillole purgative N.º 156, se incomodati fossero ancora da vischiosità; diversamente colla pozione minorativa N.º 168.

## DELLE CONGESTIONI REUMATICHE IN GENERALE.

**Q**Uando la linfa è inspessita, e carica di germi tartarosi, ereditarj od acquistati, cotali vizj degli umori dispongono ai reumatismi. La soppressione della traspirazione, del flusso emorroidale, o di qualche altra ordinaria evacuazione, la quale concorre a depurare la massa degli umori,

come anche la grandissima dissipazione delle parti più sottili del sangue, durante i gran calori, sono le consuete cagioni, che finiscono d'inspessire, e di rendere la massa umorale, terrea, acrimoniosa o flogistica, al segno di accagionare inzuppamenti reumatici.

Il reumatismo è semplice, quando l'inzuppamento faffi nelle membrane muscolari. Chiamasi artritico o gottoso, quando la congestione faffi sulle parti ligamentose delle articolazioni; e dicesi fissa, se l'inzuppamento è permanente sulla medesima parte del corpo. S'egli è di poca durata nel medesimo sito, e che i fomitì artritici si trasportino da un luogo all'altro, prende allora il nome di reumatismo vago.

Il reumatismo semplice può sorprendere tutta la parte muscolosa del corpo. I muscoli della testa, del collo, della spalla, dell'anca, dei lombi, delle braccia, e della coscia ne sono più frequentemente investite; e qualche volta ancora l'umore reumatico si getta sulla vescica, sugl'intestini, ec. Il reumatismo dell'anca prende il nome di sciatica, e quello che affetta i lombi, nominasi lombagine (a).

Le invasioni di queste malattie sono più frequenti in primavera ed in autunno che nelle altre stagioni. I muscoli, con inzuppamento delle membrane,

(a) Volgarmente il reumatismo cronico si distingue col nome di flussione; nome che le fu pure imposto dagli antichi scrittori. Flussioni nominò PLINIO i dolori reumatici; *fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant*, H. N. lib. xxii. c. 18., quasi che cotesti mali fossero prodotti da un flusso o discesa di umore del capo: Alcuni, anche tra Medici, confondono il reumatismo coll'artride, ciò che importa assai più di separare, e distinguere per l'ottima cura, come fra gli altri ci addottrina Isacco CATTIERI nella sua diss.: *de rheumatismo*, ed Antonio MENIOTTI, *diss. pathologica de rheumatismo*, ambedue stampate in Parigi, la prima nel 1653., e la seconda nel 1665. Il Zr.

brane, sono subitamente sorprese da una specie di dolore lacerante, che è sordo, se la parte malata è in riposo, e che per l'azione diviene tante volte vivo, al segno che il movimento dei muscoli affetti faffi con molta difficoltà e dolore, senza che esternamente appaja o rossore o tumidezza. Rispetto al reumatismo gottofo, egli è universale, quando invade in un tratto le articolazioni di molte estremità; dicefi locale per le ragioni contrarie.

La prima specie di reumatismo gottofo è ordinariamente preceduto o da reuma del cervello, da dolori vaghi, o da una specie di sensibilità, la quale fa sembrare di essere come legato negli abiti. L'invasione comincia da brividi che alternano col calore; dalla sera alla mattina il dolore raddoppia comunemente con inquietudini, e cresce ancora se s'irrita col moto la parte affetta. L'ammalato è molto disposto a sudare; a questi sintomi si unisce la febbre proporzionata alla violenza ed alla sensibilità delle parti, sulle quali l'umore artritico è fissato.

La caviglia dei piedi, i ginocchi, i gomiti, le spalle, la nuca, e le articolazioni delle dita, sono le parti più frequentemente invase dai fomi artritici; e quando il reumatismo gottofo è fiso, succede al dolore la roschezza con gonfiamento della parte viziata. Allora il parosismo termina insensibilmente; i fomi artritici si dissipano col beneficio della traspirazione; e le parti state viziate, rimangono per qualche tempo deboli ed intormentite.

Le conseguenze ordinarie dei forti insulti reumatici sono le disposizioni alla recidiva, od un cronico risentimento di dolore, il quale si raddoppia col freddo: Qualche volta ancora succede al reumatismo gottofo l'anchilosi, che è una privazione del movimento della parte stata ammalata.



Che il reumatismo sia semplice o gottoso, fisso o vago, tutte le volte che l'insulto sarà recente, vivissimo ed accompagnato da febbre, o che l'ammalato sarà sanguigno, ben nutrito, accostumato al salasso; o che si faranno sopresse le morroidi, i menstrui, ec.; e finalmente quando il malato avrà il sangue riscaldato, od inspessito dal metodo di vivere, dalle veglie, dalle grandi fatiche, non si ometterà giammai di farlo salassare generosamente, e nel piede specialmente nella soppressione de' menstrui o delle morroidi. Il giorno appresso al salasso, purgherassi colla pozione minorativa N.º 168. Se il primo sangue fosse stato coerenoso, od i dolori non fossero notabilmente diminuiti, si replicherà il salasso il giorno in seguito alla purga; e se il malato fosse soggetto alle morroidi, od incomodato da lombagine, si sostituiranno a questo salasso le sanguiughe all'ano. Nel reumatismo muscolare, poco profondo, dopo il primo salasso, si applicano sulla parte viziata molte sanguiughe, o più meglio le ventose scarificate; beendo nell'intervallo di queste operazioni, molta tisana comune N.º 210., e la sera e mattina, essendo a letto, alcune tazze d'infusione di fiori di sambuco, affine di animare, e mantenere la traspirazione. Stiasi levato o coricato a piacimento, ma tranquillo, e prendasi per principale nutrimento, una poltiglia, od un brodo alterato col cremore di riso o d'orzo; ed alle ore dei pasti, un pomo cotto, o l'uno o l'altro degli alimenti più leggieri e più dolci del regolamento prescritto sotto la lettera H. Si applica sulla parte affetta, se il dolore non è profondo, tela fina o taffetà inzuppato nella cera fusa. Se il dolore fosse vivo, fomentasi fra 'l giorno la parte ammalata, con flanella piegata in quattro, inzuppata d'acqua di seme di lino calda, ed imbianchita colla schiuma di sapone riscaldato sulla



bragia. Con questi mezzi i dolori si calmano, o per lo meno l'infiammazione reumatica diviene meno forte: si dissipano insensibilmente i fomi-  
ti artritici, dando dopo il secondo salasso, ogni  
quattr' ore, una presa delle polveri canforate N.º 173.,  
soprabbevendo una tazza della tisana comune N.º 210.

Si provvede alla costipazione coi lavativi dome-  
stici N.º 108. L'ammalato bea fra la mattina, una  
pinta di siero di latte, e dopo il mezzo giorno,  
molto della tisana suddetta, od orzata cotta e leg-  
giera. Affine di calmare i grandi dolori, puossi  
applicare sulla parte malata, per alcune ore la fo-  
mentazione N.º 82., od il cataplasmo ammolliente  
N.º 15., e verso l' ora del sonno, l'emulsione cal-  
mante N.º 66. La stanza sia temperata, e l'amma-  
lato leggermente coperto ma in modo però di man-  
tenere la traspirazione. Devesi continuare siffat-  
to metodo pazientemente, fino a che i dolori siano  
considerevolmente diminuiti; allora si fregheranno  
mattina e sera le parti nelle quali non vi rimanesse  
che gonfiore e debiltà, con flanella calda profumata  
di tacamahaca (b) o con bacche di ginepro; terrà  
sempre tali parti, ravvolte nella flanella fino all'in-  
tera dissipazione della gonfiezza. Si purgheranno i  
convalescenti colla pozione lassativa N.º 166., of-  
servando per più settimane consecutive il regolamen-

N 2

---

(b) La tacamahaca è un albero, che prospera nel Messico, ed a  
Madagascar, chiamato da LINNEO, *populus balsamifera* ( *Syst. Nat.*  
*Regn. Veget.*, pag. 656. ), dai cui rami o per arte, o naturalmente  
scola una resina, chiamata *resina tacumabaca*, che ci si rimette sotto  
forma concreta, friabile, odorifera, amara, infiammabile, insolubile  
nell'acqua, e quasi intieramente solubile nello spirito di vino:

Si prescrive da taluno internamente come risolutiva dei tumori  
del fegato e della milza, e per vincere le congestioni reumatiche:  
eternamente vale in unguento per risolvere i tumori duri indolenti;  
• per fare suffumigi. *Il Tr.*

to specificato sotto la lettera B., od il latte mattina e sera, se fossero molto flenuati.

Affine di ristabilire l'elasticità, e la flessibilità delle parti state ammalate, il convalescente usi nella bella stagione, un bagno naturale saponoso, oppure, una quindicina di bagni d'acqua tiepida, con entro stemperate due once di sapone, e macerati alcuni pugilli di serpillio. Se la stagione non fosse propria per i bagni, si fregheranno mattina e sera per quindici giorni le parti state viziate, con flannela calda, e si laveranno dolcemente con mezz' oncia di sapone bianco, raspato, disciolto, sulle ceneri, in sei once di buon' acquavite.

Quando al contrario in un ammalato affetto da reumatismo, e di temperamento flemmatico e senza febbre, non gli convenisse il salasso; si alimenta moderatamente di carni bianche, di frutti, e d'erbaggi della lettera B., beendo molto decotto di china dolce N.º 35., purgandosi ogni otto giorni colle pillole purgative N.º 156., e nell'intervallo delle purghe, i brodi anti-scorbutici N.º 9. presi a digiuno, e dopo il mezzo giorno i bagni aromatici N.º 1., per mezz' ora. Dal bagno passi al letto, e gli si dia una dose della mistura diaforetica N.º 125., soprabbevendo sufficiente porzione d'infusione calda di scorza di sassafrasso. Ad effetto di animare la traspirazione, e di mantenere un dolce umidore, si frega ancora un pajo di volte al giorno, la parte stata ammalata, con flannela calda, perfumata di bacche di ginepro; e dappoi s'involge in una pelle di coniglio, o di gatto selvatico, o nella lanugine. A misura che i dolori si dissipano, si trattano le parti viziate, com'è stato prescritto per il reumatismo caldo. Affine di compire all'indicazione di dividere la linfa, e per prevenire le recidive, i convalescenti prenderanno ancora per alcuni giorni, i bagni sopra

indicati, purgandosi tre o quattro volte ogni otto giorni colle pillole purgative; e se l'invasione è stata lunga ed ostinata, non ometteranno di prendere, nella bella stagione avvenire, uno dei bagni delle acque termali sulfuree o marziali riferite sotto il N.º 3.

Rispetto ai dolori reumatici, fissati sopra un muscolo, quando il male è sopportabile, ed il malato è senza febbre; se il tafetà cerato non lo sollevasse, le ventose guariranno i malati di temperamento sanguigno, ed i vescicanti produrranno il medesimo effetto nei flemmatici. Se ciò non ostante questi rimedj fossero insufficienti, si prenderà per un lunghissimo tempo per bevanda ordinaria, la tisana di pareira-brava N.º 214., e nel medesimo tempo mattina e sera, dieci grani d'antimonio crudo d'Ungheria. Nel caso che questo reumatismo fosse gottoso ed ostinato, quattro grani d'estratto d'aconito, intimamente unito con mezz' oncia di zucchero, produrranno un buon' effetto. Dapprincipio prenderassi mattina e sera per ciascuna volta sei grani di questa mistura in un cucchiajo d'acqua tiepiduccia, e si accrescerà appoco appoco la dose sino ai venti grani, avvertendo di prendere una terza ed anche una quarta presa due ore prima di ciascuna pasto; nè si può far di meglio per ottenere la guarigione, che continuare questo rimedio, il quale tiene libero il ventre ed animata la traspirazione. Importa di riflettere, che il sangue, che si leva nei reumatismi, si cuopre d'una cotenna più o meno tenace, bianca, gialla o verdastrea; e che, nel reumatismo, più la cotenna è tenace e fitta, più conviene di replicare il salasso a piccole riprese.

Il reumatismo lombare, quello dell'osso sacro, come ancora la sciatica, essendo sovente prodotti dalla soppressione delle morroidi, si tenterà in que-



sto caso, di prevenire la recidiva coi rimedj indicati per promuovere il flusso emorroidale (c).

Siccome i dolori del reumatismo, che viziano i muscoli del petto, il diaframma, gl' intestini, lo stomaco, e la testa sono pericolosi, si replica prontamente il salasso, ed in seguito un vescicante sulla parte offesa, o nella sua vicinanza. Vi sono dei dolori reumatici, i quali sono l'effetto di un vizio celtico, o scorbutico, ai quali si rimedia coi rimedj specifici di questi mali.

I dolori reumatici accompagnati da un senso di freddo, il reumatismo ereditario, quello articolare che passa da un' articolazione all'altra senz'essere accompagnato da considerevole gonfiezza, come pure quello che si fissa alla pianta dei piedi, sono lunghi e difficili di guarire.

Si rimedia alla contrazione dei legamenti, ed alle anchilosi, che succedono al reumatismo gottoso, docciando spesso e per lungo tempo coll'acqua tiepida, o col brodo di budella, le parti affette, ungendole in seguito col linimento di lumache N.º 214.; locchè non riuscendo, si fumigano spesso e per lun-

(c) Convienè quì annunciare quella specie di sciatica, pur troppo familiare, chiamata nervosa, di cui il cel. Medico napoletano Sig. COTOGNI ne ha parlato con moltissima dottrina: Questa specie di sciatica è continua, od intermittente; si esacerba per lo più verso sera, e col calore del letto, per cui gl' infelici passano la notte in affannosa inquietudine: Tante volte questo male porta la paralisi della coscia e del piede ammalato, o l'atrofia, od il perpetuo zoppicamento: I rimedj dicevoli della sciatica nervosa sono principalmente un ampio vescicante sull'osso del femore; il fonticolo nella coscia dolente; la scossa elettrica, DEHAEN; il fuoco, PETRINI, nuovo metodo di guarire la sciatica nervosa; e l'opio internamente preso a generosa dose:

Io trovai efficace il seguente impiastro in due ammalati, orribilmente tormentati dalla ischiade, applicato al capo del femore:

Recipe di pece navale, once quattro: trebentina di Venezia, once mezza: mastice, e succino, due dramme per sorte: solfo comune, mezza oncia: Si faccia impiastro secondo l'arte. *Il Tr.*



go tempo le parti anchilosate col vapore d' olio di seme di lino distillato goccia a goccia sopra un mattone arroventito. Nei reumatismi accompagnati da febbre, i sudori abbondanti sono contrariissimi, e la traspirazione è invece favorevolissima.

I narcotici, gli unguenti, e gli spiriti, dei quali si serve esternamente, sono sempre nocevoli durante la forza degl' insulti, sopra tutto quand' essi sono accompagnati da febbre e da rossore alla parte viziata. I temperamenti flemmatici si guerentiranno dalle recidive, esercitandosi molto e frequentemente. Le persone di costituzione calda ne useranno moderatamente, e tutte dovranno evitare la soppressione della traspirazione, come ancora di bagnarsi i piedi, e di esporli alle intemperie subitanee dell' aria. Lasceranno tardi, e riprenderanno per tempo gli abiti d' inverno. Un pajo di volte per settimana, si faranno spazzolare tutto l' abito del corpo con una spazzola inglese. In inverno porteranno una camiciuola di cotone sulla pelle; e se soggiacciono alla lombagine ed alla sciatica, porteranno abitualmente una fascia, la quale prenderà dalla forcella dello stomaco sino all' osso sacro.

Tutte le volte che l' umore reumatico assalirà vivamente una parte, dalla quale convenga sloggiarlo, lo si farà, se questa parte non è profondissima, coi vescicanti immediatamente applicati sul luogo dolente, od al più presto possibile. Se ella fosse profonda, come nella lombagine e nella coscia, vi si applicherà, sopra tutto nei malati sanguigni, sino a tre volte, a due giorni d' intervallo per ciascheduna, una mezza dozzina di ventose. Nel caso di un male invecchiato, converranno i bagni e le docce d' acqua termale sulfurea. In loro mancanza, la moxa (d),

N 4

---

(d) La moxa è una lanugine o peluria dell' artemisia: Si ridu-

il flusso spontaneo delle morroidi, e la dieta bianca hanno pure prodotti buoni effetti. Ma ciò che un abile Medico può fare di meglio, dopo avere giudiziosamente esaminato il temperamento, la savorra, il vizio di consistenza, e l'acrimonia che dominano nell'ammalato, come pure lo stato di elasticità dei solidi, sarà di travagliare sistematicamente alla distruzione di cotali vizj, in vista dei principj, e metodo sopra indicati.

## G O T T A .

**Q**uantunque la gotta abbia molta relazione col reumatismo, i fomiti gottosi sono sempre di una natura diversa. Quando la gotta è legittima, si manifesta con un dolore, il quale invade principalmente i legamenti delle ossa dei piedi, e particolarmente i muscoli del grosso pollice, con spasmo lacerante o frizzo, che a momenti si raddoppiano, seguiti poco dopo da rossiezza e gonfiore alla parte malata. In questo periodo l'infermo è inquieto, riscaldato; soffre veglia, od alterazione febbrile, ed anche febbre. Questi accidenti diminuiscono, come pure la rossiezza, a proporzione che cresce il gonfiamento; e se l'umore della gotta non è trasportato altrove, il parossismo finisce insensibilmente colla traspirazione, per l'ordinario accompagnata da prurito: appoco appoco si staccano dalla pelle piccole squame, le quali cadono in farina, se la gotta è leggiera. Nella gotta confermata, appare sotto

---

se questa peluria in forma piramidale, la cui base del diametro di un pollice circa si attacca alla cute per mezzo della gommaraibica, ed all'altra parte vi si attacca il fuoco, che si dirige prudentemente sulla parte affetta. In sua vece si può adoperare ancora il cotone.

*Il Tr.*

queste squame , una materia cretacea , più o meno dura ed abbondante . Dopo gl' insulti di questa malattia , rimane per qualche tempo gonfiezza , e debilità alla parte .

Chiamasi gotta chiragra , quella che viene alla mano , e conagra , quella dei ginocchi ; quando si fissa sopra l' una o l' altra di queste parti , non è meno pericolosa della gotta legittima , che si determina sul piede .

La gotta è illegittima , quando i fomite gottofi scorrono per tutto il corpo ; ed i sintomi ch' essi producono , variano a ragione della sensibilità , e delle funzioni della parte , ch' essa invade . Se è lo stomaco , l' ammalato soggiace ad una convulsione di quel viscere con nausea , e vomiti . I visceri , sui quali cade la gotta , sono in generale affetti da dolori spasmodici ; e se è il petto , ch' ella assalisca , ne risulta oppressione , soffocazione , tosse convulsiva , l' asma , i dolori pleuritici , ec . Se la gotta risale alla testa , eccita comunemente mali di testa violenti , accompagnati da vertigini , da movimenti convulsivi , da delirio , o da sopore . Qualche volta ancora promove insulti apopletici , paralitici , ec .

Quando l' umore della gotta vizia la vescica , gl' intestini , od altri visceri , la parte offesa agisce con dolore , o rimane inerte ; e se non arrivasi a sloggiarlo , il viscere s' infiamma , e viene in seguito la gangrena .

La gotta legittima è poco pericolosa , quando comincia all' età dei cinquant' anni . Con una vita sobria e regolata , i suoi insulti non sono nè frequenti nè lunghi , e per conseguenza sono sopportabili . Questa gotta , la quale rinasce una o due volte l' anno , obbliga ad un regolamento , e rimedj generalmente utili alla salute ; quindi diviene una benefica indisposizione .



Per il contrario se la gotta comincia nel fiore dell'età, i parossismi divengono insensibilmente più lunghi e più frequenti; le forze diminuiscono nell'intervallo dei parossismi; fra gli uni e gli altri insulti, i malati provano dolori vaghi; le parti state più volte affette, rimangono deboli, e le articolazioni restano inceppate da una linfa grossolana, la quale sempre più si condensa, al segno che le giunture si anchilosano, o sono viziate da nodosità e tumori, i quali qualche volta s'aprono, e gettano una materia simile alla creta od al tufo. A misura che i vasi capillari linfatici delle estremità si ostruiscono, la traspirazione si sopprime nelle parti, dove l'umore gottoso dovrebbe fissarsi: i grossi vasi diventano varicosi; ed i fomi gottosi che non ponno trasferirsi all'estremità, risalgono ai ginocchi, alle estremità superiori, o si depongono prontamente sulla parte nobile più indebolita; di modo che quando non si arriva a subitamente sloggiarli, l'ammalato è in pericolo della vita.

Affine di raddolcire e di abbreviare i parossismi della gotta legittima, si applica al primo avvertimento dell'insulto, il lavativo domestico N.<sup>o</sup> 108.; e se la gotta si fissa con qualche difficoltà, farassi, dopo aver reso il lavativo, il piediluvio d'acqua-crusca, un po' più calda che tiepida, con un pajo di cucchiaj di senape polverata e stemperata nell'acqua bollente. Da questo bagno si passa in un letto secco, e leggiermente riscaldato. La stanza sia temperata; si offervi una rigorosa dieta: in tempo dei più vivi dolori, i quali sono i periodi dell'infiammazione, non dassi per tutto pasto che un brodo sottile ogni quattr'ore, ed al pranzo, la zuppa, ed un uovo cotto da bere, e la sera qualch'erbaggio salubre od un pomo cotto; la bevanda sia molt'acqua panata tiepida, o la tisana di cedro N.<sup>o</sup> 209.,

e verso la sera , se i dolori e le inquietudini sono considerabili, porgesi l' emulsione calmante N.º 66. Con questi mezzi congiunti ad una grande tranquillità di spirito e replicando spesso il lavativo secondo il bisogno, succederà ben presto allo spasimo, la gonfiessa, e l' umidore , ciò che annuncia il declinare del parossismo , da mantenersi con brodi caldi, e con alcune tazze di thè lungo imbianchito col latte, lasciando la tisana di cedro, e stando all' acqua panata presa in quantità e tiepida . Affine d' invitare e di mantenere l' umidore ai piedi, s' involgano in un saione di Frisia; se ciò incomodasse, si tengano le gambe giudiziosamente coperte d' una leggiera lanugine, ed i piedi riavvicinati l' uno all' altro, per comunicarsi reciprocamente la traspirazione col calore naturale. Dissipati i dolori, si fregheranno e si spazzoleranno dolcemente, mattina e sera, le parti state viziate, ed affine di rimediare al gonfiore ed alla debiltà, i convalescenti accresceranno insensibilmente il loro alimento, non levandosi, nè riprendendo il loro metodo ordinario, se non quando potranno camminare senza dolore .

Ecco come dovressi regolare negl' insulti di una gotta ordinaria, colla differenza però, che nella gonagra e chiragra, si applicheranno i topici alle ginocchia ed alle mani. Se il dolore è vivissimo, si può mitigarlo, applicando per un pajo d' ore, sulla parte affetta, il cataplasmo ammolliente N.º 15. Nel caso di minaccia di un insulto gottoso, immediatamente dopo gli eccessi della tavola, o che all' avvicinarsi del parossismo vi fosse pienezza al basso ventre, si faccia precedere al metodo indicato, il lavativo purgante N.º III. ; o se questa pienezza fosse considerevole, la prozione minorativa N.º 168., affine di prevenire i disordini, che la gotta congiunta alla favorra delle prime vie, potrebbe accagionare..

Quando al contrario la gotta è illegittima , o ch' ella risale , s' insisterà d' invitare l' umore gottoso ai piedi , od alle estremità , sulle quali era costumata di fissarsi . A quest' effetto , all' avvicinarsi del parossismo , si esercita l' ammalato in modo di promuovere la traspirazione , ed in mancanza d' esercizio , la fregagione forte generale , immergendo per una mezz' ora le gambe nel bagno sopraccennato ; e se la gotta fosse accostumata di fissarsi sulle estremità superiori , vi s' immergono anche le mani . Ciò fatto prendasi un po' di vin cordiale ; si corichi in un letto caldo ; e s' egli traspira difficilmente , si esibisca , affine di facilitare la traspirazione , un pajo di prese della mistura diaforetica N.º 125. , soprabbevendo molte tazze d' infusione di scorza di sassaparilla , raddolcita col zucchero . Ciò malgrado , se la gotta cominciasse a farsi sentire , si replichi il suddetto bagno , ed il senapismo N.º 16. , beendo nel medesimo tempo ogni quarto d' ora una tazza della tisana calda di sandali N.º 216. , con cui di rado mancherà che la gotta vaga non si fissi sulle estremità , dov' ella era abituata di alloggiare . Diversamente nel caso che i dolori erranti fossero vivi e pungenti , e che 'l malato fosse pletorico , nel fiore dell' età , o riscaldato dal vino , dalle veglie , ec. , non si esiterà un momento di salassarlo dal piede , traendo otto in dieci once di sangue , e che si replicherà nella gotta risalita , applicando immediatamente i vescicanti alle gambe . Questi mezzi richiameranno la gotta ai piedi o sull' estremità , dov' ella dimorava ordinariamente : può avvenire ancora , che l' umore gottoso si dissipi senza comparire altrove .

La gotta una volta fissata , durante il suo corso , si regoleranno i malati giusta il sopra ordinato , accordando ai deboli , ed a quelli nei quali la gotta non è stabile , alle ore dei pasti un uovo da forbi-



re, ed anche un po' di carne o gelatina, ed un po' di vino scelto; e fra gl' intervalli dei pasti, si fortificheranno con alcune prese del giulebbe cordiale N.º 107.

Siccom' egli è pur troppo vero, che i frequenti insulti della gotta sono tutto al più un buon effetto d'una cagione egualmente cattiva e pericolosa, egli è da desiderare, che si trovi un rimedio di una specifica virtù per distruggere questa cagione tuttora molto problematica. Quanto più questa cagione resterà incognita, non dipenderà che da un felice azzardo, il ritrovamento di questo specifico.

Quantunque il gran numero dei rimedj tanto vantati per questa malattia, abbiano tutti mancato, egli è non pertanto vero, che vi sono mezzi sicuri per indebolirla senza pregiudizio della salute, purchè si adoprinò colla richiesta distinzione. Si faranno dunque immediatamente le necessarie perquisizioni per sapere, se la gotta è ereditaria, od acquisita. Nel caso che i genitori, o soltanto gli avoli del malato fossero stati soggetti a tale malattia, non si potrà far meglio, per isnervare i fomenti senza nocumento della salute, che replicare una volta all'anno, fuori dei tempi dei parossismi, il già raccomandato per correggere l'acrimonia della linfa non accompagnata da considerevole tenacità. Il gottoso si alimenterà costantemente cogli alimenti del regolamento B.; e s'egli fosse maltrattato da questa malattia, userà per più estati la dieta bianca G., avvertendo di corroborare il suo stomaco coll'uso frequente dell'elisire viscerale N.º 58., esercitandosi ogni giorno moderatamente, o facendosi invece spazzolare tutto il corpo colla spazzola inglese, per invitare la traspirazione.

Quando al contrario la gotta è acquisita, bisogna adoperarsi a correggere pazientemente i vizj dello

stomaco e della linfa, giusta le regole date per la cura delle favorre, del condensamento e delle acrimonie della linfa (a).

(a) Non è ancora bene definito dagli Autori, quale sia la cagione della gotta. CULLEN pretende che questa malattia dipenda dall'abuso delle cose acide od acescenti. LINNEO ha detto che gli Svezzezi siano esenti dalla gotta, perchè non beono vino, e soltanto cervogia; ma soggiugne QUARIN, che i contadini, e plebei della Germania non soggiacciono pure alla gotta, quantunque molte volte abusino del vino acido.

Alla gotta sono più soggetti i maschi delle femmine; quelle soltanto ne sono incomodate, che soffrono strabocchevole menstruazione. CULLEN: ne sono per lo più esenti gli cunuchi, i fatui, le persone laboriose, temperanti, o che sudano o pisciano molto. QUARIN: sono all'incontro sottoposti quelli di temperamento robusto, di ampia corporatura, di abito di corpo grasso pieno, e che la costoro cute è ricoperta da un denso reticolo mucoso. CULLEN.

E' stato detto ancora che la materia della gotta sia la medesima, che forma il calcolo. STAHL; su questa supposizione è stata proposta l'acqua di calce, il sapone, le terre assorbenti, ec., come i più valuti scioglienti di questa materia. Sino ad ora però non vi sono sufficienti prove per deciderne costantemente del loro valore; ed il cel. CULLEN disse, che non li arrischiò di continuarli, *veritus, ne diuturna eorum administratione succi corporis corrumpantur.* (*Prima lin. med. praxeos*); ciò è pure confermato da FOURCROY, il quale asserisce che l'acqua di calce, continuata per qualche tempo produce nei fluidi un alterazione quasi simile allo scorbutico.

Un altro rimedio riputato specifico della gotta, e dichiarato nuovo in medicina, (ciò che non è vero), si è la tintura di gomma guajaco preparata nel seguente modo.

Recipe di taffia tre pinte, cioè a dire once trentadue (in sua vece si prende altrettanto di spirito di vino rettificato): gomma guajaco polverizzata, once due: si pongono in vase bene coperto al sole per sei od otto giorni, agitando spesso il vase; poi si feltra per carta, e si pone in vetro esattamente chiuso: se ne prende un cucchiajo ogni mattina a digiuno, da continuarsi per molti mesi, ed anni interi.

In una non volgare dissertaz. di GRUNER, riportata nella raccolta di BALDINGER, col titolo *de specifico anti-podagrico americano*, ec., dopo aver parlato analiticamente del valore di questo rimedio, crede l'Autore, che possa ridursi l'uso di esso a que' podagrosi, nei quali predomina una tenace, e crassa pituita, operando come risolvente.

Nella Siberia, come dice PALLAS, che ha viaggiato in quelle contrade, si adopera con profitto il *rhododendrum chrysanthemum* del LINNEO, nel reumatismo, e nella gotta. HOME ne dà l'infusione fatta da mezza dramma fino alle tre dramme. Lo stesso HOME parla degli effetti dell'olio di trementina, e mele nella sciatica, preparati nel seguente modo.

I gottosi osserveranno il regolamento suddetto, variato con quello del latte. Nel caso di bisogno, rimedieranno alla pletora col salasso, ed alla pienezza delle prime vie, colla dieta e la polvere di rabarbaro N.º 187., piuttosto che colle purgazioni forti. Abbandoneranno tardi gli abiti, e specialmente i calzari d'inverno, e li riprenderanno di buon' ora. Eseguiranno tutto ciò che viene prescritto per animare e mantenere la traspirazione, facendo spesso il piediluvio d'acqua-crusca tiepida; e nella buona stagione, o in un tempo o nell'altro, i bagni domestici N.º 2.: sfuggiranno le pene e le passioni dell'animo, come anche gli eccessi del travaglio dello

---

Recipe d'olio di trebentina, dramme due: mele, once una: si faccia loc, di cui l'ammalato ne prenda un piccolo cucchiajo mattina e sera, soprabbevendo qualche tazza di decotto leggermente diaforetico: Io me ne sono servito di cotesto rimedio, in un gottoso di temperamento flemmatico, dando a soprabbere un saturo decotto di falsaparilla. Sia l'uno, o l'altro dei nominati rimedj che abbia prodotto il desiderato effetto, il fatto sta di questa maniera, che l'ammalato, dopo avere usati inutilmente infinitissimi rimedj interni ed esterni, con questi guarì mirabilmente: Giova pure, già che si fa cenno dei rimedj proposti da HOME, riferire quello ancora dal medesimo proposto per la lombaggine, che consiste in un crotto fatto con un denaro di canfora sciolta in due dramme d'olio di trementina: sale di corpo di cervo, grani quindici: semi di ciminio polverati, dramme due: unguento nervino, once mezza: sapone comune, once mezza: Mescola.

Rimedj decantati efficaci contro la gotta, e sue malattie affini, sono anche l'uso interno ed esterno del mercurio; il mercurio dolce secondo PITCARNIO; il decotto dei legni sudoriferi; i validi e replicati purgativi; la polve del Duca di Portlandia; o della Miranda; la dicta latteia; il vitto pitagorico, ec., oltre i molti rimedj esterni topici, che presso i Medici, e molto più appo il volgo sono infinitissimi.

La gotta è una malattia difficilissima a togliersi, per non dire impossibile. *Incurabilis fere vaetenus habita est podagra, nisi paucis empiricis*, disse il grande BOERHAAVE; e l'immortale SIDENAMIO, che fu per una molta serie d'anni vittima infelice della gotta, lasciò scritto: *Therapeia radicalis. Et usquequaque perfecta, qua quis etiam a diathesi ad hunc morbum foret liberatus, adhuc in Democriti puteo latet, atque in naturae sinu reconditur, nescio quando, aut a quibus in lucem extrahenda*: Se avvi a sperare, che i parossismi siano meno



spirito, e quelli dell' amor fisico (b). Coloro specialmente che non voranno accomodarsi alla dieta bianca, dopo essersi preferentemente purgati colla suddetta polvere di rabarbaro, prenderanno per sei settimane, quando le vacche saranno all'erba, alla mattina tuttora coricati, una libbra di latte appena tratto. Le persone soggette a tenacità linfatica, prenderanno il latte con egual parte d'acqua di Selz, otto o dieci minuti di spazio da una tazza all'altra, e due ore dopo avere leggermente cenato, due dramme circa dell' elettuario viscerale N.° 55., con cui allontanare, abbreviare, e raddolcire gl' insulti di tale malattia, locchè otterranno ancor meglio, sostituendo ogni tre dì a questo elettuario, una delle pillole indicate per servire di supplemento al vino N.° 225.

La

feroci, più tardi a comparire, ciò dipende da un costante rigidissimo metodo di vivere, col quale solo abbiamo esempj negli annali della medicina, che alcuni infelici gottosì ne guarirono anche perfettamente; e principalmente molti di que' tali, che da uno stato di comoda ricchezza sono caduti nella più indigente miseria: Avvertano però i gottosì di non affidarsi ai topici rimedj volgarmente usati per calmare la fievolezza dei dolori. COSTE (*Traité pratique sur la goutte*) disapprova per fino l'uso dei cataplasmi, e suggerisce soltanto d'involgere le parti molestate dal dolore in un molle pannolino, con cui premovendosi la traspirazione, il dolore si calma, restando frattanto a letto, come lasciò scritto SIDENAMIO: *Si dolor admodum saeviat, aeger rectius sibi consulat, se in lecto continendo, donec is aliquantisper remiserit, quam si anodynis utatur*; con ciò uniformandosi coi precetti dell' illustre LIEUTAUD, il quale conchiuse il suo articolo sopra la gotta con queste parole: *Pluribus praestest decubitus in lecto, bene tecto corpore, ut blanda foveatur diaphoresis, juvante quovis potu calido, nec posthabita dieta tenuissima. Il Tr.*

(b) Crisostoro BALISTA, parigino (*Concertatio in Podagram*) raccomandando l'ilarità, e la musica così lasciò scritto.

*Aures te fidibus juvet oblectare canoris,  
Mucidaque artificis tangere fila manu.  
Cantus enim ex animis curarum discutit aestus,  
Et validum corpus meus hilarata facit.*

Il Tr.

La debolezza e 'l gonfiamento che sussistono dopo la gotta, si dissipano colla frizione secca, e coi bagni tiepidi, presi per cinque o sei minuti mattina e sera, composti di due parti di decotto di fiori di sambuco, e di una di vin bianco: Se la gotta fosse complicata colla renella, si unisce, in questo caso, al latte, invece dell' acqua di Selz, una egual porzione di tisana di pareira-brava N.º 214., e sostituendo all' elettuario viscerale le pillole di sapone N.º 59. (c).

Tom. I.

O

(c) La pareira brava è stato un rimedio decantato contro la gotta; ma a vero dire, un lungo uso di essa sotto gli occhi degl' imparziali osservatori, e veri Medici è sempre stata infruttuosa. Il grande BOERHAAVE così lasciò scritto di questo rimedio: *Pareira brava parum efficit, multum laudatur. Cur? Rara est: commendatur a medicis nugacibus, qui arte vacui semper quærent, quia, quo dato ultimum fecisse nihilque omisisse videatur.* Epit. ad Bassandum Francisci I. Archiatrum. Vedi QUARIN: l. c.

Da tutto il fin qui detto si raccoglie, che avvi poco a sperare dai rimedj per la cura della gotta: i soli ciarlatani vantano legretti sicuri; nè mancarono taluni di assicurare la guarigione dei gottosì colla virtù della magia. PETRARCA, scrivendo al BOCCACCIO ( Senil lib. V. ep IV ) una lunghissima lettera, in cui descrive la vanità e la pompa de' Medici de' suoi dì, viene poi a contare, che Galeazzo VISCONTI fece venire dalla Valesia un vecchio Medico, perchè il guarisse dalla podagra, colla promessa di tre mila cinquecento sordi d' oro, oltre le spese del viaggio, e di un magnifico alloggiamento: *Questi spedì innanzi, che si tenesser pronte uova fresche, e non so quali altre cose per farne un beveraggio all' infermo* ( sono parole del PETRARCA ). Ma Galeazzo invano tentò ogni rimedio di questo gran Medico, che anzi ne peggiorò. Il Medico allora disse, che erano inutili i rimedj dell' arte, e che bisognava ricorrere ai libri magici: Così ( ripete il PETRARCA ) quella gran fama e quella strana aspettazione e quella iminatura sollecitudine di avere rimedj, è finalmente andata a terminare in magia. Vedi TIRABOSCHI. Storia della letteratura Italiana: Tom. IV. Il Tr.

## DEGL' INGORGAMENTI E TUMORI GLANDOLOSI.

**I** tumori delle glandole che non sono infiammato-  
ri, ponno dividersi in quelli che viziano le gian-  
dole linfatiche ed in quelli formati nei corpi glando-  
lofi, ricoperti da una membrana comune.

Rispetto alla prima specie, la natura avendo destinato una infinita quantità di glandole al raffinamento della linfa, un gran numero di esse sono sì piccole, che non sono percettibili, se non quando sono gonfiate; ed a misura ch' elleno cessano di fare le loro funzioni, ne risulta appoco appoco un pregiudizio confiderevole a tutta l'economia del corpo. Dapprincipio i sintomi di tale malattia sono così poco sensibili, che quand' essa si riconosce, è diggià invecchiata. I fanciulli vi soggiacciono più che gli adulti. Nei primi ella è ordinariamente preceduta dalla rachitide, e chiamiamo nodosi quelli che ne sodo attaccati, perchè appunto le articolazioni sono tumide e nodose.

L'inzuppamento generale delle glandole è accompagnato da una dura tumidezza al ventre inferiore, e dai sintomi descritti all' articolo dell' ostruzione del mesenterio. Coteste ostruzioni si manifestano da piccoli tumori indolenti e mobili, i quali non portano comunemente alcun cangiamento nel colore dei tegumenti, e si scuoprono sotto la pelle, particolarmente nelle parti poco guerentite dal freddo, od in quelle in cui abbondano le glandole; tali che il collo, la nuca, il di sotto del mento, le anguinaglie e le ascelle, dove si trovano qualche volta riunite, come una corona, dai vasi linfatici gonfiati, i quali passano da una glandola all' altra.

Quando il numero delle glandole ostrutte è con-



fiderevole, i malati hanno la saliva vischiosa, appetiscono bene, e smagrano invece di rifar carne; risentono senso di pienezza nel basso ventre; i loro escrementi sono glutinosi; le orine crude o depo-  
nenti un sedimento bianco e mucoso; cessa l'agilità del corpo e la vivacità dello spirito; sono pallidi ed hanno la faccia o solamente il collo tumido. Se si espongono al freddo, o si esercitano violentemente, provano un dolore sordo nella regione delle glandole inzuppate; e siccome la linfa s'inspessisce sempre più per difetto delle sue funzioni, che risul-  
no da questo inzuppamento, e che d'altronde ella s'inagrisce per lo ristagnamento e diminuzione delle secrezioni; il mesenterio e tutto il sistema delle glandole si ostruiscono più o meno rapidamente, ed i polmoni contraggono dei tubercoli. I malati ac-  
quistano flussioni ostinate; e se si lascia di soccorrerli in tempo, facilmente diventano etici od idropici. Molte volte le glandole inzuppate s'irritano insen-  
sibilmente, s'infiammano e si esulcerano; ciò che succede assai spesso nelle persone, la cui linfa è acre, o che hanno portato colla nascita germi scrofolosi nel sangue.

Siccome l'inzuppamento delle glandole linfati-  
che, che è leggiero e recente, proviene per lo più dal semplice condensamento della massa linfatica, vi si rimedia in tal caso col metodo raccomandato per la tenacità della linfa, applicando sulle glandole ostrutte della lana untuosa, o l'impiaastro di cicuta.

Se questo metodo fosse infruttuoso, o che l'o-  
struzione fosse considerevole, inveterata o prodotta da germi scrofolosi, la guarigione, nel primo caso, è difficile e lunga, nel secondo lunghissima ed in-  
certissima. La migliore strada che si possa battere nel primo caso, è quella indicata per rimediare all'acrimonia della linfa complicata col condensamento

di questo fluido, ed applicare sulle glandole ostrutte, l'impiaastro di cicuta (a) impastato con parte eguale d'impiaastro di Vigo con quadruplo mercurio (b). Nell'uso di questi rimedj, se sopravvenisse in qualche glandola un dolore assai considerevole, quantunque remoto sia il dubbio dell'inflammazione e della suppurazione, si salassa il malato, e si applica sulla glandola irritata il cataplasma ammolliente N.º 15., sospendendo i fondenti e gl'irritanti. Se la suppurazione fosse inevitabile, si pratica l'ordiuato per ridurre in ascesso il figetione; si apre l'ascesso colle precauzioni insegnate al medesimo articolo, e si medica in seguito coll'unguento basilico unito al precipitato rosso in proporzione di mezza dramma sopra un'oncia di basilico. Durante la suppurazione continuerà l'ammalato a prendere i rimedj interni suddetti, affine di risolvere l'ostruzione delle glandole linfatiche. Nei casi ostinati, e dove non vi sia principio scrofoloso, dopo avere purgato l'ammalato, s'egli è adulto, colla polvere purgativa N.º 186., e s'egli è fanciullo, col siroppo N.º 197., si dà secondo l'età, mattina e sera, in un pomo cotto dai tre agli otto grani di panacea alterante di Plumer (c),

(a) Ecco la ricetta dell'impiaastro di cicuta chiamato impiaastro di cicuta colla gomma-ammoniaco del SCHROEDERO.

Prendere cera gialla, once dodici: olio d'iosciamo, once quattro: sciolti vi si aggiunga sugo di cicuta inspessito, once sei: gomma-ammoniaco polverizzata, e polvere di cicuta, once otto per forte. Si unisca il tutto esattamente e si faccia l'impiaastro. *Il Tr.*

(b) L'impiaastro di Vigo col mercurio, è un composto dell'impiaastro di questo nome, mercurio crudo, storace liquido e trementina. Estinto il mercurio collo storace e la trementina in mortajo di ferro, si aggiugne l'impiaastro che si è fatto liquefare alcun poco; si agita il mescuglio col pistello di ferro e si peña come una massa di pillole, finchè sia giustamente ridotto; si cava fuori dal mortajo e se ne fanno maddaleoni. *Il Tr.*

(c) La ricetta della panacea alterante, o polvere di PLUMER è la seguente.

e molto decotto di china N.º 35., con un quarto di latte, da continuarsi fino a perfetta guarigione, osservando un esatto regolamento, come ancora di non esporri al freddo, e di purgarsi, come si è detto più sopra, ogni otto giorni. Un cotal metodo riesce ancora nei tumori glandolosi, che nei fanciulli rassomigliano alle scrofole, e che provengono da un germe venereo, imperfettamente distrutto nei genitori o nella nutrice.

Rispetto alle vere scrofole, qualche volta questo male è ingannevole e crudele; quand'è ereditario, risparmia un fanciullo, ed anche una generazione intiera; ma ciò non è se non apparentemente; imperciocchè si manifesta di nuovo nella susseguente generazione (d). Egli sarebbe dunque un gran vantaggio per l'umanità, che gl'individui che ne sono viziati, si maritassero fra di loro, fino a che la provvidenza accordi agli uomini uno specifico, che distrugga radicalmente questo flagello: Le pillole N.º 157., che purificano gli umori, e disotturano il

O 3

Prendete calomelano, o mercurio dolce, sublimato sei volte: solfo dorato d'antimonio, ana parti eguali. Si riducono in polvere finissima. *Il Tr.*

(d) Le scrofole, dice l'illustre professore FRANCK nell' esimia sua opera *Polizia medica*, sono una viziosa qualità degli umori, che ostruisce i vasi minimi delle glandole, corrompe insensibilmente il sangue, e colla facilità medesima si propaga ai figli ( p. 352 ); quindi con tale malattia ( p. 360 ) il pensiero del matrimonio è un oltraggio recato all'umanità, un attentato contro la propria vita, ed a quella de' posterì; quindi non avvi mezzo più valevole a ristorare il vigore e la prosperità dell'uman genere; e quindi di rendere più florido uno Stato, che di ridurre in miglior sistema l'affare della generazione, allontanandone coloro, che nati sono a spargere sul terreno della società, semi soltanto infetti, e togliendo il diritto a uomini contagiosi, e meschini di sacrificare alle proprie voglie insensate buona parte della società.

Le scrofole, o strume, volgarmente chiamati tumori freddi, dai latini *struma*, dalla parola *struere*, ammucchiare, perchè questi tumori sono per lo più ammucchiati e raccolti insieme, invadono di



sistema glandoloso e la panacea di Plumer, da prendere dai sette agli otto grani mattina e sera, sono

---

rado i bambini, ma bensì quando si arriva all' età dei due, sino all' sette anni. Non è ancora deciso, che questa malattia sia contagiosa. CULLEN: ordinariamente le scrofole traggono origine dalle glandole del mesenterio: Varj rimedj sono stati proposti per la cura delle scrofole, siccome i decotti sudoriferi, i mercuriali, i potenti idragoghi, gli antimoniali, il solfo dorato d' antimonio, l' etiope minerale, l' olio di tartaro per deliquio nell' acqua fontana da LEVRET, i mille piedi, la cicuta. CULLEN propone il sugo espresso dalla farfara, od una satura decozione delle sue foglie. LALOVETTE esibisce i marziali, sul finire della malattia, dopo avere già coi rimedj incilivi affottigliata la linfa. Nelle dissertazioni dell' Accad. di Chirurgia, p. 39, t. 3. leggesi una memoria coronata di FAURE, Cernusco di Lione, in cui si decanta l' appresso ricetta, come specifica contro le scrofole.

Prendete di sapone d' alicante dai quindici grani fino alla dramma: della polvere di spugna calcinata dai dieci grani alla mezza dramma: della polvere delle due scofolarie dai sei grani allo scropolo: di limatura d' acciaio dai sei grani allo scropolo: il tutto li mescoli con 5. q. di sciloppo delle cinque radici.

Nel caso che questo rimedio riesca inoperoso, l' Autore suggerisce di unirvi la polvere viperina: la bevanda ordinaria per i malati dev' essere l' acqua seconda di calce fatta con acqua fontana, in cui vi sia bollito un pugillo di cime di ramerino; avvertendoci inoltre di non esser facili nell' uso dei validi purgativi, potendo bastare per mantenere sciolto il ventre, l' uso interpolato della manna, e della confezione ameck.

RUSSEL (*de tabe glandulari*) raccomanda l' uso del sal marino; e LORRY accerta di averne ottenuti ottimi effetti in molte malattie di questa natura. E' inutile parlare dell' ento di Venere, dell' arcano del ROTROU, dell' uso delle frizioni mercuriali, e di tanti altri rimedj non accertati da costanti effetti, ed il più delle volte anzi pericolosi. E' celebre pure nella storia il privilegio dei re di Francia di toccare le scrofole e di guarirle. *Il Re vi tocca, e Iddio vi guarisce. Roberto, figlio d' Hugues Capet*, nell' anno 996., è il primo re di Francia, a cui Iddio, diceasi, abbia accordato questa grazia. DANIEL, *hist. de France*, t. 1., p. 1032. POLIDORO VIRGILIO, *hist. d' Anglet: lib. VIII.* pretende, che i re d' Inghilterra, come re di Francia godevano anch' essi di una tal grazia; anzi gl' Inglesi pretendono, che questo particolare favore abbia incominciato da *Edovardo il Confessore*, contemporaneo di *Filippo primo*. Il popolo pretende ancora, che un settimo figlio nato da un medesimo padre, e da una stessa madre di seguito, (*un settimino*) goda del medesimo privilegio. Che che ne sia della verità di questi fatti, pare però almeno provare che il contatto dei corpi freddi possa valere nella guarigione delle scrofole benigne; ond' è ch' è stato proposto questo quesito. *An strumæ, vel scrophulæ, hoc etiam sæculæ curantur? P'sint solo attactu regum Galliæ, Angliæ, &c. Il Tr.*

forse i soli rimedj più efficaci, purchè se ne continui l'uso, osservando il medesimo metodo sopra raccomandato.

I tumori glandolosi, ravvolti in una membrana chiamata cisti, sono di diversa grossezza; sono ordinariamente indolenti, cagionano poco o niun cangiamento nel colore della pelle, e prendono diversi nomi secondo il loro vario sito, configurazione, come anche rispetto alle materie, che la focca contiene e dei mali ch'essi producono. I lupi (*e*) formano principalmente nelle cellule adipose, e nei follicoli delle piccole glandole, insensibilmente dilatate da un deposito di materie grossolane: Si chiamano porri e meloni, quando il tumore finisce in coda; ganglio, se la guaina d'un tendine della mano o del piede forma il sacco del tumore; e gozzi, se i tumori viziano i contorni della trachea-arteria (*f*). Si distinguono ancora questi tumori a ragione di loro durezza: nominansi ateromi, quando sono molli, e contenenti una materia simile alla pappa; meliceridi, se la materia ha la consistenza del mele; e steatomi, se il tumore è forte, duro al tatto, e contenga una materia simile al sevo.

Per ciò che riguarda le scrofole, sono tumori duri, indolenti dappprincipio, formati precipuamente nelle parti glandolose, che attorniano il collo. Lo scirro, propriamente detto, altro non è che l'indurimento perfetto di una parte glandolosa che vie-

O 4

(*e*) Il lupio, o lupia è un tumore cistico, che viene sulla pelle, che si alza in figura rotonda, e qualche volta cresce ad una prodigiosa grossezza. *Il Tr.*

(*f*) Il gozzo così detto volgarmente, e con termini d'arte chiamato *brucoccele* è malattia endemica, ossia propria degli abitatori delle Alpi, e de' Pirenei, onde disse GIOVENALE: *Quis tumidum guttur miratur in Alpibus?* sat. XIII. ver. 162. *Il Tr.*

ne in seguito all' infiammazione : questa specie di tumore è durissimo, renitente, indolente o poco sensibile. Cotești diversi tumori cistici sono chiamati maligni, quando per la cattiva qualità degli umori, o per l' uso dei rimedj troppo attivi, s' irritano. I tumori scirrofi cominciano a degenerare in carcinoma, dacchè il dolore è permanente, con ardore e frizi considerevoli. Allorchè il carcinoma si esulcera, acquista il nome di cancro, ed a misura che i tumori cistici si estendono, e s' ingrandiscono, diventano aderenti e comprimenti le parti vicine, da cui risultano molti accidenti, varj giusta le funzioni delle parti compresse. Quando il tumore o le parti aderenti sono irritate da umori acri o da rimedj troppo attivi, s' infiammano, cadono in ascesso, o degenerano in ulcere ribelli; ciò che succede comunemente nelle scrofole e negli scirri.

Tutte le volte che questi diversi tumori cistici faranno recenti, indolenti e molli, si cercherà di risolverli coll' uso successivo dei rimedj interni ed esterni, raccomandati per l' ostruzione delle glandole linfatiche; si fumigheranno nel medesimo tempo mattina e sera, il più lungo tempo possibile col vapore d' aceto bollente, distillato sopra un mattone arroventito, dirigendo questo vapore sulla parte affetta coll' ajuto di un cannello; e se fossero lupi o gozzo, si fregheranno prima di fumigarli. Applicherassi in seguito sul gozzo un sacchetto di sale bruciato e caldo, e sugli altri tumori indolenti l' impiastro di cicuta impastato con un terzo di fele di bue inspessato. Se questi mezzi diminuissero il tumore senza molto irritarlo, si continuano fino a perfetta guarigione, avvertendo frattanto, non che dopo l' uso di cotali rimedj risolventi, di diluire e raddolcire la massa linfatica, giusta le direzioni date per la cura dell' inspessimento ed acrimonia di



questo fluido . Nel caso che siffatti tumori s' infiammassero sotto l' uso di questi rimedj , si sospendino ; e se si teme di suppurazione , si useranno i varj mezzi prescritti per operare la risoluzione delle infiammazioni in generale . Se al contrario la suppurazione fosse inevitabile o conveniente , si cercherà di provocarla , seguendo il raccomandato all' articolo della suppurazione , che sopravviene alle infiammazioni .

Quando i tumori cistici faranno antichi , durissimi , scirrofi , disposti a divenire carcinomatosi , o che l' uso di più settimane dei rimedj raccomandati per la risoluzione , il tumore rimanesse non pertanto nel suo primiero stato , non avvi migliore espediente che l' estirpazione , praticata secondo l' arte , qualora sia praticabile . Ciò non eseguirassi però , se non dopo avere sufficientemente disposto il malato con i convenienti rimedj proprj della sua costituzione , e fatti per correggere i vizj della massa del sangue . Se al contrario il tumore fosse stato cagionato da qualche accidente esterno , si procederà immediatamente all' operazione , ritenuto sempre che l' ammalato sia altronde d' ottima costituzione .

Nei casi , in cui il numero , la situazione , e la natura dei tumori , o la costituzione dell' ammalato , togliessero ogni speranza di poterli risolvere , o fondere colla suppurazione , o finalmente di estirparli con successo ; affine di prevenire il loro accrescimento e le altre cattive conseguenze , si cerca di essiccare questi tumori ; a tal effetto , si fomentano per lungo tempo coll' acqua di calce , facendo sciogliere sopra ciascuna libbra mezz' oncia d' allume di rocca . I malati osservino un rigoroso sistema ; la bevanda ordinaria sia il decotto di cina N.º 35. , unito ad un quarto di latte ; sfuggano con eguale avvertenza di raffreddarsi e di riscaldarsi ; si facciano

salaffare : purgare in primavera ed in autunno, prendendo dappoi il latte d' asina . Seguendo un tal metodo puonno premunirsi dagli accidenti , possibili a temersi , lasciando però nel medesimo tempo tutti i medicamenti interni ed esterni che potessero irritare il male . Se non pertanto il tumore divenisse carcinomatoso , lo si estirperà al più presto possibile , avvertendo di correggere il sangue prima e dopo l' operazione ; ed allorchè l' estirpazione non sarà praticabile , si applicherà fra 'l giorno sul tumore , della raschiatura di carrotte gialle stufate in una terrina ; e la notte , l' unguento anodino N.º 231.

Per ciò che riguarda il gozzo in particolare , s' egli non cedesse ai rimedj suddetti , si ricorra allo specifico, che è la spugna di mare non calcinata , in decotto , e calcinata ed infusa con aromi nel vino ; od in opiatà , siccome quella sotto il N.º 145. (g) ; ma , durante l' uso di tale rimedio , conviene purgarsi ogni otto giorni colla pozione N.º 166. Le persone , le quali ripugnassero questo rimedio , guariranno egualmente dal gozzo , portandosi a vivere in un clima meridionale vicino al mare , come Marsiglia , ec. Comecchè riguardasi qua-

(g) Si prepara la spugna col lavarla bene nell' acqua , poi seccata si pone in vaso di terra non vetriato e ben coperto , ed esattamente sigillato si espone ad un fuoco graduato , fino a che la materia sia ridotta di color bruno ; allora si toglierà il vaso dal fuoco , e raffreddata la materia , si polverizzerà da conservarsi : la dose ordinaria è di sei grani fino ad una dramma incorporata con siroppo o mele .

Vi sono anche le tavolette per il gozzo fatte colla stessa spugna nel seguente modo .

Prendete un' oncia di spugna marina bruciata : ossi di Sepia preparato , mezz' oncia : semi di finocchio , uno scropolo : cannella , mezza dramma : zucchero bianco , once due . Tutto polverizzato finamente , se ne forma pasta con bastevole quantità di mucilagine di gomma dragante , che dividefi in tavolette da conservarsi in luogo asciutto . La dose è da uno scropolo ad una dramma . *Il Tr.*

le cosa assicurata dall' esperienza, che i rimedj contro i tumori cistici operano con maggiore successo nel declinare della luna, non è male in ciò seguire l' introdotta opinione. Ciò che avvi di vero, egli è, che di quando in quando conviene cangiare i rimedj esterni; e che i tumori ammoliti, o vicini a dissiparsi, ostinandosi nei medesimi rimedj, riprendono qualche volta ad un tratto il loro primiero essere, e rendono con queste alternative, più lunga la cura (b).

*Ingorgamenti delle glandole mesenteriche ed intestinali.*

Il mesenterio, il qual è destinato a dar passaggio al chilo, ed a sottilizzarlo, è moltissimo fog-

---

(b) Producono buoni effetti per la cura del gozzo, dice l' illustre professore di Pavia Sig. NESSI, due o tre cucchiaj di aceto distillato presi ogni mattina per qualche settimana, ovvero alcune once d' acqua seconda di calce. Alcuni anno fatto consistere la cura del gozzo nell' uso delle polveri delle lucertole, e ramarri, dell' osso Sepia, del sal gemma, solo o uniti insieme colla giunta dello zucchero candido, e di un poco di radice di piretro. La dose di questa polvere è di mezza dramma fino a due scropoli ogni mattina a digiuno. E' stata provata utilissima ancora la polvere seguente: si facciano abbrustolare in un vaso di terra verniciato e ben chiuso, fave nere otto parti, zucchero candido quattro parti, e spugna di mare, sei parti, e se ne dia mezza dramma mattina e sera. Le polveri azidette possono ridursi in forma di tavolette, impastandole colla mucilaggine di gommarrabica, o d' oppiata mescolandola col mele. NESSI: *Instit. di Chir.*, p. 20., t. 2.

Quando il gozzo è arrivato ad essere scirroso, carnosio, o steatomatoso, vi sono alcuni arditì Cerusici, che non esitano a farne l' estirpazione, ciò che ordinariamente produce la subitanea morte. HALLER parlando dell' operazione del gozzo, così si esprime. *An vero ideo in tanta mole vasorum, que cum ipsa glandula crescit, in tanta vicinia jugularis internæ venæ. Et arteriæ carotidis, in tanta frequentia communicantium arteriarum thyroidearum superiorum, Et inferiorum, amputatio inter probabiles operationes sit, ego quidem vehementer dubito*; ed il cel. BERTRANDI lasciò pur dello scritto, che i gozzi steatomatosi, ateromatosi, e sarcomatosi, di sostanze ossee, pietrose, o cartilaginose in tutta, o in qualche parte composti, hanno quasi sempre tali aderenze e tante, che per verità non si individuano il caso, nel quale l' estirpazione conviene e se ne possono leggere i funesti esempj nel TULPIO, nello SCULTETO, e in altri. *Al Tr.*



getto ad ostruirsi, e le ostruzioni di questo viscere apportano molto pregiudizio a tutta l'economia del corpo. Questo male, che è comune a' fanciulli, non è però men raro negli adulti, come si crede. Nei suoi principj è difficile di conoscerlo; insensibilmente si manifesta col pallore, e colla gonfiezza della faccia, e da una specie di languore del corpo e dello spirito: gli occhi sono languidi, la saliva vischiosa, la bocca impaniata, le orine torbide, il secesso irregolare, le fecce glutinose sconnesse, lo smagramento di tutto il corpo, la insensibile diminuzione delle forze, mentre che il solo ventre rimane grosso e teso, ed il malato è incomodato da un senso di pienezza.

Quando l'ingorgamento delle glandole mesenteriche è considerevole, gl' infermi dopo i passi risentono interni calori, accompagnati da un po' di febbre, e da alterazione: si osserva al tatto, ai dintorni dell'ombilico, ammassi di figura e grossezza di un pugno, formati dall'ostruzione delle glandole.

Le conseguenze dell'ingorgamento del mesenterio sono l'atrofia, la rachitide, l'ingorgamento di tutte le glandole linfatiche, frequenti rilasciamenti di ventre, l'affezione celiaca, la febbre lenta, l'idrope ascite, o le affezioni scirrofe al mesenterio.

Quando l'ingorgamento delle glandole mesenteriche è piccolo e recente, vi si rimedia, col metodo e rimedj raccomandati per l'inspessimento della linfa.

Se è considerevole, od invecchiato, la guarigione è lunga: conviene osservare un rigoroso metodo di vivere e prendere i rimedj proposti per levare le ostruzioni in generale, preferendo gli aperitivi raccomandati per l'ostruzione complicata col freddo condensamento. Nel caso che non appaja speranza di guarigione, o che siavi a sospettare, che la ca-

gione della malattia dipenda da fomiti scrofolosi o venerei, si usi il prescritto per rimediare all'acrimonia della linfa complicata con questi mali. Si copra il basso ventre coll'impiastrò di sapone impastato con un quarto di siele di bue inspessito; ed affine di prevenire l'infiammazione e la suppurazione delle glandole ostrutte, si proceda dolcemente e passo passo all'uso dei fondenti, sospendendoli ogni otto giorni, per purgare il malato, s'egli è adulto, colla pozione N.º 166.; e se fanciullo, col siroppo N.º 197.: nei due giorni seguenti, l'ammalato faccia un semicupio; mantenga sciolto il ventre col lavativo domestico N.º 108.; e finiti i bagni, ritorni all'uso degli aperitivi e fondenti summentovati.

*Ingorgamento, e scirro del pancreas.*

Quando il pancreas, il quale è un grosso corpo glandoloso, annesso alla parte posteriore del fondo dello stomaco, è ostrutto, i malati digeriscono male; provano imbarazzo alla forcella dello stomaco, con mali di cuore, e nausea, dopo i pasti. Allorchè il pancreas è ostrutto in tutta la sua estensione, si rileva al tatto, a stomaco vuoto, un tumore bislungo, profondo ed un po' mobile, che sporge in fuori, e si estende dalla forcella dello stomaco fino all'estremità dell'ipocondrio sinistro. I malati, il cui pancreas è molto ostrutto, rimettono gli alimenti presi; smagrano considerevolmente, e se'l tumore è duro e renitente, diviene scirroso ed incurabile.

Si rimedia ai diversi gradi di ostruzione di questo viscere, come alle ostruzioni del mesenterio; e visto che l'ostruzione antica delle glandole intestinali, produce un impaniamento alle pareti del ca-

nale degl' intestini, che essiccandosi, diviene tenacissimo e qualche volta coriaceo, bisogna fomentarlo giornalmente col lavativo domestico N.° 108., animato da un po' di schiuma di sapone; e dacchè si osservano nelle scariche, albumi ricotti o membranosi, si raddoppia l' uso dei lavativi, in ciascheduno dei quali si sciolgono due dramme di sapone bianco, da continuarsi fino a che gli albumi sian spariti. Per confermare la guarigione, si prende per un mese o sei settimane il siroppo di sapone N.° 195., ed ogni quattro giorni si purga colle pillole lassative N.° 154.

*Inceppata circolazione del sangue nei vasi  
che mettono capo nella vena porta.*

La circolazione del sangue, nel sistema dei vasi, che sboccano nella vena porta, è tante volte impedita ed inceppata, per cui ne risultano molti mali ed incomodi. Il sangue che cola in queste vene, ha perduta la sua fluidità, arrivato che sia nei vasi, che si riuniscono per ricondurlo dalla vena porta al cuore; e questi vasi del basso ventre sono ancora soggetti ad essere compressi dagli alimenti, dalle fecce, e dai flati. Questo difetto nella circolazione è familiarissimo alle persone letterate o sedentarie. Egli si dichiara da un peso alle reni, ed agl' ipocondrij, i quali sono più o meno gonfi o tesi. I malati soggiacciono a svenimenti, o subitanei calori, specialmente dopo i pasti, e quand' essi sono raffreddati o riscaldati, provano ancora sfordimenti, mali di testa e palpitazioni al cuore od agl' ipocondrij. Il ventre è incomodato da un senso di pienezza, in gran parte prodotto dai flati; la cui esplosione solleva moltissimo; e quando questa indisposizione è inveterata o considerevole, il malato risente fasti-



dioso prurito al podice , e morroidi o veramente un senso di tensione alla vescica , allorchè le ramificazioni dei vasi che vi sono distribuiti , sono più particolarmente ingorgati .

I malati sono altronde inquieti , inclinati alla tristezza , soggetti ad improvvisi gonfiamenti , a flati e sopra e sotto , ed alla costipazione , la quale è altrettanto incomoda , quanto che si sentono sollevati dopo essere flati al cesso . Oltre tutti questi mali , i quali sono giornalieri , risentono ancora movimenti febbrili e dolori reumatici .

Quest' affezione dispone all' ingorgamento delle viscere del basso ventre , alla dilatazione varicosa dei vasi emorroidali , il cui flusso spontaneo in tal caso è singolarmente salutare ; determina ancora moltissimo all' ipocondria ed alla malinconia .

Si provvede immediatamente alla plethora col lassativo ; si purga colla pozione minorativa N.° 168. ; ed in seguito , la mattina a digiuno , colle gocce lassative N.° 94. , in sufficiente dose per iscaricare due volte al giorno , soprabbevendo una pinta di siero di latte ; alla sera , il lavativo N.° 109. , e tutto ciò per tre settimane , ed anche più , se abbisogna . Tutte le mattine , si frega dolcemente per un quarto d' ora il basso ventre ; si cavalca a stomaco vuoto ; ed affine di schiudere le intercette flatuosità , si esibiscono , nella infusione dei fiori di camomilla , le gocce carminative N.° 92 . Presentandosi varici emorroidali , si applicano le sanguisughe . Convienne desistere dalla vita sedentaria , sfuggire i travagli dello spirito , osservare i metodi B. ed E. , non caricarsi lo stomaco , e distrarsi e vivere con persone allegre e socievoli ; e per vieppiù consolidare la guarigione , si prendono nella prossima bella stagione , le acque acidette marziali N.° 3. ; o se 'l ventre non è sgombro e disimbarazzato , le acque minerali

marziali e lassative, riferite sotto il medesimo numero della materia medica.

### *Ingorgamento della milza.*

La struttura e la situazione di questo viscere lo dispongono a facili gonfiamenti ed ostruzioni, più o meno ostinate e considerevoli. Frattanto che la milza non è che gonfiata, l'ammalato prova nell'ipocondrio sinistro, un sordo dolore, peso, e stitature, che raddoppiano nei primi momenti, ch'egli è a cavallo od in carrozza, e soprattutto quando si mette a correre. Respira allora con difficoltà, gli batte il cuore; e quando il gonfiamento è considerevole, si uniscono a questi accidenti, ambascie, e flatulenze, che quasi lo soffocano; sospira involontariamente; è spesso di cattivo umore; l'appetito è buonissimo, ma come che la digestione è cattiva, egli è ordinariamente dopo i pasti che si sente più indisposto. Inoltre è oppresso; soffre peso alla testa, e questi diversi incomodi sono giornalieri sino a tanto che la milza non è gonfiata (i).

Quando

(i) Si è disputato moltissimo, se la milza era un viscere accessorio all'uomo, e molti hanno sostenuto essere affatto inutile: *lien inutilis incola*: alcuni sostennero, che la milza non serviva che di contrappeso al fegato: altri che destinato era questo viscere a rendere l'uomo allegro, inclinato al riso, essere *la sede dei piaceri del secolo di Saturno, il trono del riso, ec.*, per la ragione che ad ogni viscere era accordato una particolare virtù.

*Cor ardet, pulmo loquitur, fel commovet iras,*

*Splen ridere facit, cogit amare jecur.*

L'animale a cui sia tratta la milza, diviene più lascivo: quegli animali che non hanno la milza, sono più voraci: coloro, ai quali si è tolto questo viscere, diventano tristi, abbattuti, vili d'animo, ec.: tali, ed altre molte cose si sono dette intorno a questo viscere, alcune fondate, altre erronee, ed immaginarie, che inutile lavoro sarebbe il riferirle, o confutarle. Egli è però certo che se si consi-

dera

Quando al contrario questo viscere è ostrutto, si osserva, allorchè il malato è coricato sul suo dorso, un permanente tumore nell' ipocondrio sinistro, il quale occupa una porzione della parte superiore e sinistra del basso ventre. In questo caso, il peso, e lo stiramento ch'ei prova, non che i varj sintomi del gonfiamento della milza, corrispondono al volume del tumore; e se questo è considerevole, l'ammalato non può stare coricato a piacimento; dimagra, e si debilita; è incomodato da tosse secca, da frequenti palpitazioni di cuore e da mali di testa.

L'ostruzione della milza è giudicata scirrofa, quand'è inveterata, e che il tumore è circoscritto, duro, e renitente al tatto; allora si manifesta gonfiamento alla caviglia del piede sinistro; l'ammalato è di cattivo colore, di spirito triste ed abbattuto; prova decadimento in tutto il corpo, ed insensibilmente diviene etico od idropico.

Se l'gonfiamento e l'ostruzione della milza sono recenti, vi si rimedia eseguendo il prescritto, per l'imbarazzo della circolazione, nei vasi che mettono capo nella vena porta. S'egli è inveterato, si prolunga e si replica, fino a perfetta guarigione, l'uso di ciò che è consigliato nel medesimo articolo, esercitandosi nel medesimo tempo col cavalcare, e coprendosi l'ipocondrio sinistro coll'impiastrò di cicuta animato dalla gomma-anmoniaco.

*Tom. I.*

*P.*

dera la situazione della milza nell'addome, e le sue aderenze per mezzo dei vasi, e della sua membrana, collo stomaco, il diaframma. l'epiploon, il peritoneo, ec., si rileva facilmente che è un viscere assai importante per l'economia animale; che la estirpazione, riputata così facile, e molto più sulla falsa credenza di svelle- re un viscere inutile, espone al pericolo di morire o per emorragia sul fatto stesso, o poco dopo per insorta infiammazione dei visceri; coi quali egli ha rapporto mediato od immediato. *Il Tr.*



Rispetto alla cura dell' ostruzione della milza, comeccie i sintomi di questo male si moltiplicano e crescono per accesso, il malato faccia i piediluvj d' acqua-crusca tiepida, con disciolto un po' di sapone, e prenda il lavativo carminativo N.º 109. Nelle agitazioni accompagnate da riscaldamento, daffi ogni due ore una presa della polvere temperante N.º 190.; e se non è riscaldato, un pajo di prese della polvere assorbente e carminativa N.º 170., soprabbevendo due tazze d' infusione di fiori di camomilla. Per facilitare la guarigione, si comincia dal salasso del braccio, e all' indomani le sanguisughe al podice, in seguito una dozzina di semicupj, e due ore dopo ciascun bagno, il lavativo domestico N.º 108. Nella notte, cuopresi l' ipocondrio sinistro col suddetto impiastro, e nel giorno, che avrà cessato dal bagno, si applica il fomento risolvente N.º 83., da rinnovarsi ogni volta, che sarà freddo e secco.

Terminati i bagni, si purga ogni otto giorni colle gocce lassative N.º 94., e nell' intervallo delle purghe, daffi ogni dì 2 digiuno, l' elettuario aperitivo marziale N.º 52., soprabbevendo i brodi disostruenti N.º 13., od una libbra di siero calibeato N.º 147. Tutte le volte di costipazione, al dì là delle trentasei ore, si rimedia col nominato lavativo; usando inoltre tutto ciò che può convenire allo stato dell' infermo, com' è stato prescritto per gl' imbarazzi, che sopravvengono nel sistema dei vasi della vena porta: gli alimenti siano i più leggieri, i più aperitivi dei metodi specificati sotto le lettere B. ed E., esercitandosi moderatamente ciascun dì nel modo per lui sopportabile.

Se, dopo avere usato per sei settimane di tali rimedj, l' ostruzione non fosse ancora tolta, conven-  
gono allora, secondo le stagioni, i diversi rimedj prescritti per le ostruzioni in generale. In questi

casì è meglio preferire gli aperitivi raccomandati per le ostruzioni accompagnate da freddo condensamento; per bevanda ordinaria, l'acqua di ruggine N. 30., spruzzata nei pasti con un po' di vin bianco, e cavalcare quanto può soffrire; con questo metodo, si arriverà insensibilmente, a togliere le ostruzioni più ostinate. Nel caso l'ammalato contraesse una febbre d'acceso, non si deve arrestarla, stante che le febbri intermittenti, ed in ispecie le quartane, quando sono saggiamente curate, dissipano insensibilmente le ostruzioni. Se questa ostruzione sarà complicata con molta disposizione alle emorroidi, si applicheranno tutti i mesi le sanguisughe.

Se la milza presentasse al tatto una fardella durissima (k), il male sarà allora incurabile; ma non pertanto potrà l'infelice vivere lungo tempo, senza provare ancora accidenti molto cattivi, purchè osservi esattamente il metodo prescritto sotto la lettera B. La sua bevanda ordinaria sarà la tisana comune N.º 210., evitando tutt' i rimedj ammollienti tanto interni quanto esterni, e specialmente quegli irritanti, come anche quelli che riscaldano ed agitano il sangue.

Allorchè lo scirro sarà considerevole, si sosterrà con una fascia, e si salasserà il malato; e ciascuna volta che la parte scirrofa sarà sensibilmente irritata con dolore e calore, e si temesse il carcinoma, si starà per ogni resto di vita alla dieta bianca specificata sotto la lettera G., calmando le irritazioni coll' emulsione calmante N.º 66., o colle gocce anodine N.º 89.

P 2

---

(k) Cresce tante volte la milza, non che il fegato a sì smisurata mole, che pareggia la grossezza di un feto, come trovasi espresso in PLAUTO. *Nunciam quasi zona liene cinctus ambulo, geminos in ventre habere videor filios, nihil metuo, nisi medius disrumpar miser.*  
II Tr.

*Ingorgamento del fegato.*

Il fegato è propriamente destinato dalla natura al lavoro della bile. Questa parte che riceve un sangue spogliato delle sue parti più fluide, soggiace spesso ad ingorgamenti. Ma si parlerà particolarmente nell' articolo dell' itterizia, dell' ingorgamento dei vasi biliari.

Quello che si forma nei capilari sanguigni, si manifesta da un imbarazzo, il quale si estende dalla forcilla dello stomaco all' ipocondrio destro. Questa regione è incomodata da stiramenti e da piccolo peso o da sordo dolore, che cresce più o meno, quando si esercita un po' violentemente. I malati sentono per intervalli leggiera strettezza di cuore, qualche difficoltà di respirare ampiamente, e di tempo in tempo una tosse secca: sono oppressi e pesanti; sentono subitanei calori e rossezze al volto; la bocca è secca ed amara; anno avversione e qualche volta nausea, ed inquietudine nel sonno. Nei principj della malattia, le orine e le fecce sono ben colorite, in seguito le prime diventano fosche, e le fecce biancastre.

Oltre le medesime conseguenze riferite all' articolo dell' ostruzione della milza, questa malattia dispone ancora all' itterizia, ed a diversi altri mali dipendenti dalla mancante secrezione ed escrezione della bile. A misura che la malattia degenera in ostruzione permanente, se l' ammalato è coricato a ventre vuoto, si rileva al tatto verso la forcilla dello stomaco ed all' ipocondrio destro, un tumore, più o meno duro: egli risente stiramenti in questa regione, quand' è da lungo tempo sdrajato, e con pena giace sul lato sinistro; le orine sono mattonose; ha il ventre o rilasciato o costipato, e le



fecce alcun poco colorate di bile. I sintomi indicanti l' ostruzione, appajono in seguito più distinti; la faccia diviene insensibilmente squallida, piena di bitorzoli, con generale prurito, ed eruzioni cutanee, somiglievoli alla rogna, od alle impetigini; smagra considerevolmente; e se non si arriva a togliere l' ostruzione, l' infermo fassi itterico, etico, o muore dall' idrope o dalla diarrea colliquativa.

Lo scirro del fegato si manifesta nell' ipocondrio destro quasi cogli stessi sintomi di quello della milza. Egli è più da temersi che quest' ultimo. L' ammalato non può giacere sul lato sinistro; prova nausea e vomiti frequenti; movimenti febbrili e spandimenti di bile. L' itterizia nera o l' idrope ascite sono le conseguenze dello scirro al fegato.

Si rimedierà all' ostruzione del fegato, seguendo le direzioni date per la cura delle ostruzioni in generale, e per quella della circolazione inceppata nei vasi, che mettono capo nella vena porta in particolare.

Nell' ostruzione del fegato, si purga il malato, colla pozione lassativa N.º 166.; e se fosse pletorico, si salassa dal braccio, o si applicano le sanguisughe al podice, prendendo in seguito per quindici giorni a digiuno le pillole di sapone N.º 152., soprabbevendo due libbre di siero di latte, o i brodi disostruenti N.º 13.; due volte per settimana, dopo il mezzo giorno, un semicupio tiepido; e nell' intervallo, e dopo questi bagni si applica sulla regione dell' ipocondrio destro, l' impiastro di sapone del Barbetta (1); esercitandosi inoltre in carrozza od a

---

(1) L' impiastro saponaceo del BARBETTA chiamato anche del TACHENIO, e saturnino del DIGBY, si compone come segue.

cavallo, se ciò è possibile; la bevanda ordinaria sia l'acqua di ruggine N.º 31., da mischiarsi nei pasti con un quarto di vin bianco; i cibi siano i più leggieri e i più aperitivi della lettera E.; per una quindicina di giorni in seguito, si prescrive l'elettuario aperitivo marziale N.º 47., continuando a bere i suddetti brodi; alla costipazione, si rimedia col lavativo domestico N.º 108.

Se dopo questo tempo l'ostruzione non è tolta con siffatti rimedj, convengono, secondo la stagione, i diversi aperitivi raccomandati per la cura delle ostruzioni in generale, sempre preferendo quelli prescritti per le ostruzioni complicate colla tenacità atrabile.

Si cura lo scirro del fegato, come quello della milza, colla precauzione però di purgare tutt' i mesi il malato colla pozione minorativa N.º 168., mantenendo nel resto del tempo sciolto il ventre col lavativo suddetto: si sfugga tutto ciò che può irritare il male, ciò avvenendo in questa malattia più facilmente che non nello scirro della milza; e quando vi farà a temere d'infiammazione, di suppurazione, o di uno scirro in questo viscere, si consultino i rispettivi articoli.

---

Prendete olio rosato, once dodici: minio, cerusa, ana, once sei: cuocete secondo l'arte a consistenza; poi si aggiunga: sapone di Venezia raspatto, once quattro; si agitano fino a che la massa sia fredda; poi vi si aggiugne, mezz' oncia di canfora disciolta in un po' di olio. *Il Tr.*

## ITTERIZIA IN GENERALE (a).

**O**ltre le itterizie sintomatiche, che sopravven-  
gono nell' infiammazione e nello scirro del fe-  
gato, e che distinguerassi dai sintomi, che sono ri-  
feriti parlando di queste malattie, avvengono tre altre  
specie ancora d' itterizia, originarie da altre cagio-  
ni. La prima è l' itterizia, chiamata spasmodica,  
perchè dessa è l' effetto di un increpamento spasma-  
dico del fegato, il quale accagiona subitaneo rigur-  
gito della bile epatica nel sangue. Questa specie  
d' itterizia viene in seguito a violenti trasporti, a  
strabocchevoli escite di corpo, a forti accessi isterici,  
ipocondriaci, o ad altre affezioni spasmodiche del  
basso ventre (b).

La seconda specie d' itterizia insorge, allorchè  
i vasi biliari sono otturati dall' inspessimento della

P 4

(a) Ossia spargimento di fiele, dai Latini *icterus*, *aurigo*, ed anche *regius morbus*.

*Regius est vero signatus nomine morbus,  
Molliter hic quoniam Celsa curandus in aula.*

Il Tr.

(b) Una delle cagioni pur troppo famigliari della itterizia è la  
spasmodia del fegato, come benissimo avverte il nostro Autore, e  
come viene pure osservato dal Sig. de CHAUX nella sua *Memoria  
sopra i differenti mezzi che si possono mettere in uso per guarire l' it-  
terizia*, che trovasi riportata nella *Biblioteca fisica d' Europa*, tom.  
III, che si produce in Pavia per associazione, compendiata da chia-  
rissimi Scrittori: De CHAUX fa vedere con copia di erudizione,  
che fra le moltissime specie d' itterizia, vi è anche quella spasmodi-  
ca. VANHELMONT, e RIVERIO, dice l' illustre Autore della  
memoria, hanno osservato che le affezioni dell' anima producono l' it-  
terizia: MEAD. attribuisce l' itterizia prodotta dal morso della vi-  
pera alla spasmodica contrizione della vescichetta del fiele, e del  
condotto coledoco. Ciò posto, ne viene per chiara conseguenza,  
quanto siano indicati i rimedj calmanti ed anodini in siffatte itteri-  
zie, ricorrendo, se abbisogna allo stesso opio, come ne addottrina-  
no il cel. CULLEN, e WILLIAM, *an essay on the Jaundice*, ec.  
Il Tr.



materia biliosa, o compressi in modo che resta sospesa la secrezione o l'escrezione della bile nel condotto epatico. La terza specie deriva dai calcoli contenuti nella vescica del fiele, che otturano il condotto, per cui la bile si evacua negl' intestini; donde ne risulta, che la bile non potendo colare nell' intestino duodeno, rigurgita nel sangue la materia biliosa, e ne lo imbratta (c).

In generale la itterizia è preceduta da scadimento di forze, e da una specie di tensione e di strettezza all' ipocondrio destro ed alla forcilla dello stomaco. Il bianco degli occhi, la fronte, le tempie, qualche volta le unghie medesime s' in-

(c) Questi calcoli, dice HOFFMANN si trovano anche nelle piegature dell' intestino duodeno. Sono essi simili alla bile fatta seccare; si accendono facilmente; e sono sì leggieri che galleggiano sull' acqua: Questo fenomeno però del loro galleggiare nell' acqua, non è sempre costante, mentre si sono trovati tante volte de' calcoli fellei precipitare immediatamente al fondo; della quale varietà volendo darne conto il MORGAGNI, crede potere ciò dedurre dalla più o meno specifica gravità del calcolo; mentre che se la sostanza del calcolo, scarso sia di particelle oleose, abbondante di salino-mucose, e così tra di loro unite, che poche porosità vi si frappongono, ecco che il volume del calcolo paragonato con uno eguale dell' acqua, è più pesante, e per conseguenza necessitato a precipitare. Fallace si vuole pure il segno adottato da molti per conoscere il calcolo bilioso, preso dalla sua infiammabilità. Il pascolo del fuoco è l' olio: la bile ne contiene di molto: dunque spogliata ch' ella sia di parti acquose, come avviene nel calcolo, sarà infiammabile. Quantunque ciò appaja vero, non puossi però stabilire una proposizione negativa, che quello il quale non concepisce fiamma, non possa essere calcolo cistico, poichè l' HALLER fra gli altri: (*Opusc. pathol. obs. XXXVIII.*) annovera certi calcoli cistici, chiamati calcarei, di color nero, i quali resistono al fuoco; ed il cel. MORGAGNI ne ritrovò ancora di quelli, che calcarei non erano, eppure non s' infiammarono. (MORGAGNI: *Epist. Anat. med. XXVII. Art. 26.*): Il segno diagnostico della esistenza dei calcoli è anch' esso molto equivoco. BAGLIVIO male a proposito costituisce l' itterizia recidiva per segno infallibile. Molti esempj vi sono, e tanti sono riportati dal MORGAGNI, di persone vissute lungamente con calcoli fellei senza evidente indizio di loro esistenza; cosicchè crede il precitato Autore non esservi più sicuro spediente per assicurarsene, che di crivellare esattamente le fecce, come suggerì VALLISNERI. *Il Tr.*

gialliscono come il zaffirano; e quando la malattia è inveterata, e nella sua forza, tutti gli oggetti che si presentano alla vista dell' ammalato, appajono gialli: gli escrementi sono bianchi come l' argilla, o cinerici; le orine giallo-scure, o torbide, e tingono del colore di zafferano la carta, o i pannolini bianchi, che vi s'inzuppano.

Quando la itterizia dura per qualche tempo, la saliva e la bocca diventano amare: i malati provano frizzi agli occhi, e prurito generale; lo spossamento cresce; sono tristi, svogliati, alterati, e più o meno anfasti al moto; il polso è irritato, frequente con considerevole smagramento.

La itterizia spasmodica si distingue dalle altre per le cagioni, che la producono, e di già indicate. Ella si manifesta subitamente, ed è di corta durata.

La seconda specie si conosce dai sintomi indicati per l' ostruzione del fegato. Ella formasi appoco appoco, ed è permanente ed ostinata.

La terza si annuncia da un piccolo dolore permanente e fisso alla bocca dello stomaco, e che raddoppia per accesso. In quest' ultimo caso i malati sono soggetti ad insulti di colica, ed al vomito, con difficoltà a stare ritti nella persona, e passeggiare. Questa specie d' itterizia va e viene a misura, che i calcoli retrocedono, sfuggono, e s'innicchiano di nuovo nel condotto sopracennato (d).

Allorchè la materia biliosa rigurgitata nella

(d) La itterizia prodotta dal morso della vipera; ( fenomeno che il Sig. BROGIANI ripete da una subita e veemente contrazione dei canali della bile, ed il Sig. FONTANA. dalla convulsione del duodeno, o da un affottigliamento di bile ), non è così frequente negli uomini avvelenati, come alcuni scrissero, forse più per uno spirito di meraviglia, che di osservazione. CARMINATI: *Saggio di osservanz. sul veleno della vipera. Il Tr.*

massa del sangue, è porracea, ed atrabile, produce ciò, che chiamasi itterizia nera. Allora il bianco degli occhi, la fronte, il volto, e tutto il corpo contraggono un color nerastro che volge al verde: le urine sono nerastre; i malati, oltre diversi altri sintomi dell' itterizia, hanno il polso più irritato, il ventre tardo, e rendono fecce verdastre, secche, ed abbruciate: sono intormentiti, deraduti di forze e di spirito, tristi, assopiti; la traspirazione, e l' alito pute, e ad ogni menomo chè facilmente estenuati.

Le conseguenze dell' itterizia nera sono principalmente la febbre lenta, la consunzione, l' idrope ec.

La itterizia che accompagna l' infiammazione del fegato, si dissipa col metodo e rimedj indicati per la risoluzione dell' infiammazione di questo viscere. Allorchè questa specie d' itterizia diviene cronica, gli è perchè l' infiammazione ha degenerato in scirro; allora questa itterizia non che quella proveniente da un' ostruzione scirroso del fegato, sono incurabili, e non conviene, che la cura palliativa raccomandata per lo scirro della milza.

Rispetto all' itterizia spasmodica, svanisce con maggiore facilità. Il malato prenda immediatamente due lavativi domestici N.º 108., continuandone l' uso mattina e sera: bea molta infusione di malva, ed ogni quattr' ore la mistura N.º 128., fomentando l' ipocondrio destro col fomento N.º 82. Se in capo a due o tre giorni questa itterizia non fosse considerevolmente diminuita, il malato si purghi, un giorno sì e un giorno nò colla pozione minorativa N.º 168., e prenda nel medesimo tempo il siero di latte calibeato N.º 147., od una delle acque minerali leggermente ferruginee N.º 3., da continuarli fino a perfetta estinzione dell' itterizia (e).

---

(e) Importa moltissimo di avvertire alla diversa specie d' itteriz-



Vi sono persone , altronde sane , le quali sono soggette a leggieri insulti d' itterizia ; ciò che proviene dalla soverchia quantità di materia biliosa nel sangue , che per iscemarla , basta che si nutrano per un pajo di mesi di frutti fondenti crudi e cotti , e di erbaggi sani : si purghino una volta la settimana colla tintura di rabarbaro temperata N.º 204. , e bevano negl' intervalli dei pasti della limonea calda . Dissipata questa itterizia dassi di tempo in tempo la tisana di cremore di tartaro N.º 211. in quantità sufficiente , per iscaricare due volte , con cui dimettere la soverchia bile (f) .

---

zia , per la diversità dei metodi , che conviene impiegare ; imperciocchè gli è uso comune , p. e. , di esibire , sopra tutto , le acque termali , minerali , ec. ; e queste , come ci addottrina il valente Proto-medico di Bergamo, *Andrea PASTA*, non convengono in ogn' itterizia , nè in ogni tempo dell' itterizia , perchè nelle isteriche itterizie , delle quali ragiona il *SIDENAMIO* , e nelle ipocondriache ancora , che d' ordinario sono accompagnate da ferocissimi dolori , da frequenti , e faticosi vomiti , e da tensione di ventre , l' uso di queste acque è del tutto contraria ; siccome è ancora nocivo in ogni itterizia , che avvenga per crise . Non convengono nemmeno in quelle itterizie , che sono avanzate in più mesi , e congiunte con magrezza notabile , e con debolezza di forze , o con uscite frequenti , e stemperate di corpo , o con febbre continua , benchè lenta , e dimessa .

*BOERHAAVE* anch' esso disapprova l' uso delle acque minerali nell' itterizia accompagnata da rilasciatezza delle fibre , da atonia del ventricolo e delle intestina . *Il Tr.*

(f) Potrebbero convenire nella specie d' itterizia quì nominata , le pillole così chiamate da noi di *Erera* , o *pillole dissolutive* , la cui base principale è l' aloè . La preparazione di queste pillole è stata dal *REDI* confidata al *VALLISNIERI* ; ed i Gesuiti che ne avevano acquistata la cognizione , sapevano sì bene prevalersene , che sulla loro mensa si vedeva sempre un piccolo barattolo coperto con quattro o sei di queste pillole , perchè i PP. se ne servissero a lor talento , convenendo esse opportunissimamente alle persone studiose e sedentarie : Ecco la ricetta delle pillole in origine nominate *pillole famose del REDI* .

„ Aloè succotrinno , vero , lucido , rubicondo , e frangibile disciolto in acquavite di prima distillatura con calore aggiustato ; poi colato per feltro , acciò sia depurato , e poi sfumato a cottura di mele in modo che si possa far pillole di mezzo scropolo l' una , e si usano la sera avanti cena , una , due , tre , e quattro ancora , secondo li corpi , e secondo chi vuol più , e chi vuol meno evacuare . ”

Nell' itterizia proveniente da ostruzione dei vasi biliari, applicasi, dopo il mezzo dì, il lavativo domestico N.º 108., da continuarsi fino a che si protrae la cura; poi si danno le pillole N.º 152.; alla mattina due libbre di siero di latte calibeato o i brodi aperitivi N.º 11., ed alla sera un femicupio, per un' ora, un po' più caldo che tiepido, di acqua-crusca. Divise e diluite le materie biliose sufficientemente, ciò che succederà dopo l'uso continuato per una quindicina di giorni di questi rimedj, purgasi ogni quattro giorni col decotto aperitivo e lassativo N.º 30., e, secondo la stagione, si esibiscono gli aperitivi raccomandati per le ostruzioni complicate col condensamento atrabile. Sul finire della cura, dassi mattina e sera, una presa dell' elettuario marziale N.º 52., applicando contemporaneamente sull' ipocondrio destro l'impiastrò di sapone del Barbetta: si raccomanda molto esercizio di carrozza o di cavallo; alla costipazione si provvede col lavativo sopra esposto, nutrendosi di cibi, e specialmente di erbaggi e de' frutti i più leggieri ed i più fondenti della lettera E., e per bevanda ordinaria, l'acqua di ruggine N.º 32., mescolata nei pasti con un terzo di vin bianco. Si deve continuare a regularsi in questa maniera fino a perfetta guarigione, la quale si consoliderà colla bevuta delle acque minerali ferrugigne N.º 3.

L' itterizia originaria da ostruzione dei vasi biliari del fegato, si cura nel modo sopraddetto, oltre i femicupj prolungati assai tempo.

Nell' itterizia prodotta dai calcoli della vescica

fellea , la cura farà puramente meccanica durante i parossismi dei dolori e della colica , che insorgerranno tutta vo'ta , che un calcolo aspro sarà innicchiato nel condotto colledoco . Affine di facilitare il suo passaggio nel duodeno , dopo il salasso dal braccio , il malato prenda ogni quarto d' ora , due cucchiaj della mestura fatta con parti eguali di siroppo d' altea e d' olio di mandorle dolci , soprabbevendo una tazza d' infusione di radice d' altea : Si applichi sull' ipocondrio destro il fomento N.º 82. ; due volte al giorno , un lavativo di un saturo decotto di seme di lino ; i brodi sian grassj e lubrici , e per cibo , una fetta di pane abbrustolita coll' olio d' olivo ed un po' di zucchero . Se il parossismo fosse lungo e violento , dopo avere levato un' altra volta dal braccio una decina d' once di sangue , si mette in un bagno di brodo di budella fresca , o nell' acqua-crusca o di seme di lino molto saturata delle sue farine ammollienti (g) , ed al fortire dal bagno , si applichi sulla regione degl' ipocondrij una flanella inzuppata nell' olio caldo d' olivo , dando nel medesimo tempo , ogni due ore , sino a che il parossismo sia calmato , una dose delle gocce anodine N.º 89. : se ciò tardasse a succedere , si darà il vomitivo N.º 192., e sul fine della sua operazione , il lavativo domesti-

---

(g) Leggesi nel Giornale di Medicina di Francia , *Tom. XLIV.* , pag. 272. una Memoria di MORIN , sul valore dei bagni e dei diluenti per iscacciare le pietre biliari : BERGIO raccomanda l' uso dell' olio ricino : QUARIN preferisce l' opio , sì perchè mitiga l' acerbò dolore , come perchè acquieta lo spasmo , da cui forse proviene la strettezza del condotto cistico , e comune . WHITT propone come specifico disciogliente dei calcoli fellei la mestura fatta con due parti d' etere virriolico , ed una d' olio distillato di terebintina , di cui se ne porgono dalle dodici alle venti gocce , e più con un po' di zucchero , soprabbevendo sei once di siero di latte chiarito , od altrettanto di acqua d' orzo . Devesi questo rimedio continuare per più mesi , e siccome è molto riscaldante , si prescrive una dieta refrigerante , e le abbondanti bibite rinfrescative . *Il Tr.*



co , che in allora sarà per lo più reso con piccoli calcoli .

La guarigione di questo male è difficilissima , ed incertissima . Il malato osservi costantemente il suddetto regolamento : si purghi ogni otto giorni colla pozione mannata N.º 167. Nell' intervallo delle purghe , prenda , a digiuno e nel coricarsi , le pillole di sapone N.º 159., soprabbevendo alla sera una mezza libbra di tisana di pareira brava N.º 214., ed alla mattina , le acque ferruginee acidette N.º 3., ed un giorno sì e l'altro nò verso la sera un semicupio tiepido di acqua-crusca imbianchita col latte ; prima del pranzo , l'esercizio a cavallo od in carrozza , e per poco che siasi costipato , un lavativo di brodo di budella, od in sua vece, quello domestico N.º 108.

Se dopo l'uso , per un mese , di questi rimedj , il malato comincia a risentirne gli effetti salutari , si continuino , altrimenti si sostituiscono le acque termali fondenti , per bevanda e per bagno da usarsi molto tempo , purgandosi ogni otto giorni , colla pozione mannata sopraddetta .

Rispetto all' itterizia nera , s' egli è possibile di guarirla , vi si perviene col regolamento rinfrescativo ed anti-putrido della lettera D. Alla costipazione si rimedia coi suddetti lavativi , e prendendo a digiuno , e quattr' ore circa dopo il mezzodì , sei once del sugo espresso di parti eguali dell' erbe fresche di dente di leone e di acetosa , da mischiarsi dopo averlo depurato , con parte eguale di brodo di coscia di vitello o di siero di latte : faccia generale fregagione mattina e sera , ed in particolare sull' ipocondrio destro ; bea molta limonea calda , e si eserciti più che sia possibile in carrozza od a cavallo . Per poco che si provi sollievo , si continua questo metodo con tutta la costanza , mangiando in

estate molte cerese acidette, ed in autunno molta uva bianca e naturissima.

Il sugo di betula, che in primavera, distilla copiosissimo dai rami novellamente tagliati, e che si riceve in bottiglie, che vi si appendono, preso per lungo tempo mattina e sera alla dose di sei ad otto once, ha dissipato itterizie, refrattarie ad ogni altro rimedio (b).

L' itterizia critica che nasce nelle febbri, e quella delle donne incinte, non esigono che poco o nessun rimedio.

Più il colore giallo è fosco e rimarchevole nella parte capelluta della testa, più la itterizia è difficile a guarire.

Le diverse specie d' itterizia, tranne quella prodotta dall' infiammazione del fegato, e dai calcoli, di rado abbisognano del salasso: E' successo che ribelli itterizie si sono dissipate, prendendo mattina e sera, un uovo crudo col suo guscio, ed un cucchiajo di cerese nere, secche e pistate col suo nocciuolo, e ridotte in conserva coll' acqua distillata di cerese (i).

(b) La betula, *bouleau* dai Francesi, e da LINNEO, *Betula alba*, *foliis ovatis acuminatis serratis*; Spec. pl. 1393., è un albero che prospera sui monti di Como: è conosciuto per la sua candidezza, e per le sottili vermene, che getta, usitate da pedagoghi, onde il nome di *scettro dei maestri*, o d' *albero della sapienza*.

In primavera stilla con arte un sugo limpido, dichiarato efficace depurativo degli umori, disciogliente dei calcoli, urinario, ed usitato moltissimo in Russia contro le malattie delle reni e della vescica. Si asserisce ancora, che sia vermifugo. *Il Tr.*

(i) MARET e DURANDE anno proposto uno specifico dell' itterizia, di cui ecco ciò che ne dicono gl' illustri compilatori dell' annunziata *Biblioteca fisica*.

WIHTT ( come si è detto alla nota g. ) aveva scoperto, che lo spirito di vino era il dissolvente delle pietre biliari, e credeva che mescolandolo colla terebintina, egli formerebbe un miscuglio capace di far penetrare le proprietà di quello rimedio fino nell' interno del riserbatojo e dei canali biliari.

## MALE IPOCONDRIACO.

**I**L male ipocondriaco, conosciuto sotto nome di *Spleen* (a), o vapori, è più incomodo che pericoloso. Dacchè è radicato, si manifesta con un sì gran numero di sintomi, che i malati, i quali leggono, od ascoltano il dettaglio di una malattia, hanno la immaginazione riscaldata al segno, che si credono di esserne predominati: provano strettezza, tensione, o stiramenti agl' ipocondrij, e nel tempo della digestione, un peso allo stomaco, e sfordimenti, tante volte accompagnati da svenimenti, da calore alla faccia e da zuffolamento d' orecchi. Spesso sono incomodati da venti, che sortono dallo stomaco e da flatulenze, che producono in essi qualche difficoltà

DURANDE travagliando nel medesimo tempo di WIHTE sullo stesso oggetto, ha trovato, che lo spirito di terebintina non faceva che ammolire le pietre biliari, ma che l'etere le discioglieva; per conseguenza egli ha composto il suo fondente anti-itterico d'etere e di terebintina; imperocchè s'egli credeva la prima di queste sostanze atta a sciogliere il calcolo, la seconda la riguardava come necessaria, per involgere l'altra, e per servire di veicolo, onde pervenire fino ai ricettacoli della bile.

Ma come mai sostanze così volatili, quanto l'etere, e la parte aromatica della terebintina ponno conservare le loro proprietà nel lungo tragitto del canale alimentare; e come mai dopo essere penetrate nelle seconde vie, non subiscono esse veruna decomposizione?

Accordando al rimedio di MARET e DURANDE qualità differenti, egli è facile di concepire, ch' esse non si possono penetrare, che in certe circostanze, in cui l'itterizia, e la congestione biliare sono prodotte da un inspessimento glutinoso, o fangoso, che non avrà potuto cedere agli ordinarij aperitivi.

Rispetto all' uovo crudo, QUARIN ci assicura di averlo prescritto senza profitto: *Ova cruda a quibusdam in ictico com. curata absque successu exhibita fuisse memini, quæ immo non nullis casibus fuere, & in alia remedia negligebantur, quibus adhibitis fortasse recuperassent salutem agri.* Animadver. pract. in diver. morb. II Tr.

(a) *Spleen* è parola inglese, che vuol dire milza o melancolia: *Spleen, or melancholy*; e fra noi dal volgo *mal del padrone.* II Tr.



soltà a respirare, od un dispiacevole strignimento al gorgozzule: sputano ed orinano molto, e nei parossismi, le orine sono chiare come l'acqua; la bocca viziata da ingrato sapore; l'appetito per lo più buono; qualche volta sono voraci, e risentono ardori allo stomaco stando lungo tempo digiuni; sono costipati con pizzicori morroidali; il sonno li opprime; hanno rutti dispiacevolissimi; sono concentrati in se medesimi, tristi ed occupati dalle loro miserie, che fanno loro qualche volta versare delle lagrime: sono tetri, pensierosi, diffidenti, senza speranza di guarire, irresolutissimi, od incocciati in una particolare idea: hanno dei momenti di languore, nei quali sono in una grande debolezza; inclinano alla solitudine; diventano timidi ed incapaci di qualunque esercizio di corpo e di spirito; sono giornalieri nei loro mali, i quali variano spesso da un' ora all' altra, come anche il polso, di cui il carattere è di essere piccolo ed irritato. A misura che l'ipocondria s'avanza, il malato acquista un color plumbeo; sputa continuo; ed inquieto insensibile al freddo, e' passeggia per la camera.

Le conseguenze di questa malattia, quand' è mal governata, sono la malinconia, il delirio con singolari idee, la itterizia, anche nera; frequenti insulti di colica; le ostruzioni al ventre inferiore, i tumori emorroidali interni ed esterni, ed incomodissimi, l'edema alle gambe, ammassi e vomiti di materie caustiche, il piscio sanguigno, le vertigini, le affezioni spasmodiche e paralitiche, la mania, ec.

Per curare con successo questa malattia, la quale è considerata come lo scoglio della medicina, si deggiono distinguer bene le differenti cagioni che la producono. Ella proviene il più delle volte da un impedimento di circolo nei vasi, che sboccano nella

vena porta, e dall' ingorgamento dell' uno e dell' altro delle viscere del basso ventre, e specialmente della milza.

In questi due casi, il male ipocondriaco è complicato coi sintomi dei mali nominati, e vi si rimedierà nello stesso modo.

Quando al contrario i malati sono esenti da simili affezioni del basso ventre, questa malattia, la quale è sempre meno pericolosa che incomoda, è prodotta da crudezze, da umori, e fomiti austeri, od acidi ammassati nelle prime vie, e che si riproducono fino a che non ne sia distrutto il suo principio. Questi fomiti, per la irritazione ed incremento che producono, alterano la digestione, non che il moto peristaltico degl' intestini, e la circolazione del sangue nelle viscere del basso ventre.

Cotesta specie d' ipocondria è comune alle persone letterate: è preceduta ed accompagnata dai sintomi dell' una o dell' altra delle favorre summentovate; di modo che egli è il basso ventre, che trovasi principalmente e primativamente viziato, e non già il genere nervoso e la immaginazione.

Siccome quest' ipocondriaci sono molto giornalieri nei loro mali, e soggetti ad avere dei parossismi, durante i quali sono molto irritati, e soffocati dai venti, si solleveranno allora col lavativo ammolliente e carminativo N.º 109., coi piediluvj d' acqua-crusca tiepida, e colla polvere assorbente carminativa N.º 170., soprabbevendo sopra ciascuna presa, due tazze d' infusione di fiori di camomilla, non dando, per tutto passo, che brodi conditi con un poco di comino (b),

---

(b) E' un seme, che ci proviene dall' Egitto e dalla Palestina, assai diverso da quello conosciuto dagli antichi; internamente prescritto come carminativo; esternamente come risolutivo degli umori. *Il Tr.*

Rispetto al regolamento di questa specie d'ipocondria, i malati mangeranno, poco per volta, zuppe, carni, erbaggi e frutti, i più leggieri e i meno flatulenti delle lettere B. ed E. Se la pienezza dei vasi, o la congestione del sangue alla testa sembrassero esigerlo, si salassi dal piede; e dopo purgasi colla pozione emetico-lassativa N.° 165.; ed in seguito, mattina e sera, una presa della polvere di magnesia N.° 181., soprabbevendo alla dose della mattina, l'acqua antacida N.° 37.: sospendasi ogni applicazione di spirito, esercitandosi in modo da non stancarfi, preferendo l'esercizio del cavallo, e cercando di condurre vita varia e dissipata (c).

Dopo l'uso di tre settimane di questo regolamento, se avvi un sensibile cangiamento in bene, il malato ne continui l'uso fino alla guarigione; altrimenti prenda di nuovo la pozione emetica suddetta. Si cerchi d'individuare attentamente la natura della favorra, dalla quale è incomodato, la quale si arriverà a dissipare radicalmente, seguendo la direzione prescritta all'articolo delle favorre.

Ciò eseguito, l'ammalato prenda ai due pasti, nel primo cucchiajo di zuppa, quattro o sei grani di limatura abbruciata N.° 113., e s'egli fosse incomodato da ostruzioni in qualche viscere, e fosse presumibile, che non fosse ancora perfettamente tolta, userà le acque minerali ferrugine e purgative nominate nel sopraccitato numero; e se si manifestassero emorroidi, o disposizione alle emorroidi, gli si applicheranno le sanguisughe al podice.

Q 2

---

(c) *Equitatio stomacho, & costis utilissima*, disse PLINIO; e SIDENAMIO lasciò scritto, che il cavallo è la china degl'ipocondriaci. *Il Tr.*



Durante l'uso dell'uno o dell'altro di questi rimedj, si applica sulla regione degl' ipocondrij l'impiaastro di galbano ; e si rimedia alla costipazione coi lavativi sopraccegnati.

Sarà ancora essenzialissimo, che qualunque traversia potesse occorrere , i suoi amici si adoprafferò a non parteciparglierla, risparmiandogli ogni inquietudine , procurando anzi di divertirlo e distrarlo al segno, che non abbia tempo d'intrattenerli nei suoi mali .

Per accelerare considerevolmente la guarigione, e prevenire la recidiva, deve l'ammalato eseguir e i proprj doveri ; giuocare al volante, od al bigliardo , alla palla ed al pallone ; spazzare la propria camera, segare legna , e tutte le volte ch' ei non può così esercitarsi , fare fregagione sul basso ventre , al suo primo svegliarsi ; divertirsi col *tremoussoir* che consiste in due verghe di piombo tenute nelle mani, dimenando le braccia per ogni verso .

Nella specie d' ipocondria che succede ad una grande commozione del genere nervoso, prodotta da qualche passione viva dell' anima, o per conseguenza di una grande povertà di spiriti ; o perchè sorprenda persone di temperamento debile , che digeriscono male, e il cui sistema dei nervi sia gracile , ed il sangue impoverito ; lo spirito essendo più ammalato che il corpo, sarà bene di metterle sino dapprincipio al regolamento della lettera B. , ed in seguito affine di ristorarle, a quello A. Si useranno tutt' i mezzi possibili, perchè sieno allegre, distratte, ricreate ed assicurate sul loro stato , ed allontanata dagli oggetti dispiacevoli ; cambieranno aria e paese, facendo lunghi viaggi, e non prenderanno altri rimedj, se non le acque minerali acidette e ferruginee ; si facciano lavare tutto il corpo con acqua un po' temperata, ma di giorno in giorno sempre più fredda,

fino a che siano in istato di prendere i bagni freddi, dai quali si troveranno molto bene, avvertendo di tuffarvi prima la testa. Sfuggiranno più che sia possibile i Medici e più ancora i rimedj farmaceutici (d), come pure il salasso, e tutti gli evacuanti, non eccettuati i lavativi, i quali appena al bisogno, faranno d'acqua tiepida; ed arrivati in istato di condurre una vita rustica, non lasceranno di farlo e di continuarlo, fino a che la loro salute sia bene accertata.

Q 3

(d) Questo preeetto si accorda con quello tante volte ripetuto dal REDI, parlando di cotesto male: egli non è guarito (dice questo esimio scrittore in un suo consulto per persona ipocondriaca), perchè nè egli, nè la sua natura, nè 'l suo male non hanno bisogno di medicamenti; e che la sua sanazione ha da nascere e dal tempo, e dalla quiete dell'animo, e da una regolata maniera di vivere corrispondente al suo bisogno; ed il cel. *Andrea PASTA* continua a dire sui sentimenti del REDI, che se gl' infermi (ipocondriaci) insistono pertinacemente nel volere lattovarj, pillole, tinture, e sciropi, come la maggior parte fanno, allora o procurino i Medici saggi d'ingannar l'ammalato con robe che pajono, e non sono medicinali, o li prescrivano cose medicamentose bensì, ma meno che possono, e le più semplici, e le più innocenti: PASTA, *voci e maniere di dire* cc., alla cui citazione unitamente conviene aggiugnere quella dell' altro *Giuseppe PASTA*, il quale, fralle altre sue opere pubblicate con applauso di tutta la veneranda Scuola de' veri Medici, si è prodigiosamente distinto con quella intitolata *Tolleranza filosofica delle malattie*, in cui, dopo un vivissimo e ben delineato quadro dei sintomi ipocondriaci, viene a conchiudere, essere il male ipocondriaco, il meno inteso, il più negletto di tutti, e il più turbato da inopportuni, ed incongrui medicamenti; essendo rarissima la combinazione d' un docile, e costante infermo di questo male, che non disperi e non si abbandoni alla perniciosa credulità, e di un dotto Medico che ne conosca, e ne spieghi la natura, e per inveterata perizia sappia, che molti più sono gl' istromenti dell' arte, che nucono all' ipocondria, che quei che giovano; e che particolarmente l' accrescono l' evacuazioni, e gl' incitamenti spiritosi, se non siano ben moderati, e remoti:

Conchiuderò dunque colle parole di STUBENDORF: *est verissimum axioma nulla medicina interdum optima, & prudentis, atque circumspecti Medici officium est, ab omni medicamentorum usu, prorsus abstinere, cum ægrotus non sine periculo assumi queat: Diff. qd vita in morb. prorsus insanabilib. prolonganda. Goetz. 1787. Il Tr.*

Durante le agitazioni e le inquietudini, prenderanno le gocce anodine N.º 87., o nell'acqua di tiglio, venti gocce del liquore anodino-minerale dell' Hoffmann. Nei languori, si darà loro una simile dose di essenza dolce di Halla (e), nell'acqua di fiori d'arancio, o nella mestura cordiale N.º 124.; ed ai pasti per perfezionare la digestione, 25. gocce dell'elifire viscerale N.º 58., o dieci grani di chinacchina polverata.

## DELLE INFIAMMAZIONI IN GENERALE.

**L**A massa del sangue è un mescolamento di parti rosse e bianche; la parte bianca che si mostra alla vista è composta di siero e di linfa. Si è osservato col microscopio, che il volume dei globetti fierosi è sei volte più piccolo che quello dei globetti rossi, e che i vasi sanguigni hanno delle ramificazioni, i di cui orificj sono troppo piccoli, perchè i globetti rossi possano penetrarvi nello stato di salute (a).

(e) L'essenza dolce di Halla, e nominata ancora tintura d'antimonio acra dell' HOFFMANN si compone nel seguente modo: Prendete once 4. di regolo d'antimonio, di nitro crudo once 3. polverizzati e detonati, si lasciano in fusione per un'ora intiera; si versano in un mortajo, e dacchè saranno ridotti in consistenza, si polverizzano, aggiugnendovi spirito di vino rettificatissimo once 12. stiano a digerire per alcuni giorni in bagno d'arena e si feltri la tintura rossissima.

Se lo spirito di vino prima si digerisce per due giorni con due once di sapone disciolto nel lissivio caustico e di nuovo inspessato, formasi la tintura d'antimonio saponacea di SCHULZ, la quale risulta di un colore più vivo e più efficace. *Il Tr.*

(a) Moltissimo si è disputato in ogni tempo sopra la causa efficiente dell'infiammazione; nè quì dispiacerà trovare epilogoato, ciò ch'è stato principalmente scritto, tratto dalle eruditissime *Instituzioni Chirurgiche* MM. del rinomatissimo Sig. Don Pietro MOSCATI.

PRASSAGORA ed ERASISTRATO dissero, il primo, che la sede dell'infiammazione era nelle vene, poichè credeva nelle arterie non contenersi sangue; l'altro che l'infiammazione si faceva qualunque volta sangue morbosamente penetrava nelle arterie, non



Quando questi globetti rossi vengono ad insinuarsi nei detti ultimi vasi, o che l'inspessimento flogi-

Q 4

---

destinate dalla natura per contenerlo. IPPOCRATE lasciò scritto, farsi l'infiammazione per morbofo influxo del sangue nella parte affetta. GALENO disse, che s'infiammava una parte qualunque, quando in essa si accumulava un sangue più caldo del naturale, spintovi con tanta forza morbosa da farlo trasudare pe' pori dei vasi a gocce a gocce ne' circonvicini spazj cellulari a guisa di rugiada; inoltre che tale trasudamento si faceva ora con molta celerità, e com'è lasciò scritto, *per fluxionem*, ora più lentamente *per congesionem*: per ultimo che non sempre puro sangue accumulavasi, e trasudava nelle infiammazioni; ma alcune volte era misto con alcuni degli umori dalla scuola galenica ammessi come elementi del sangue, cioè la bile, la pituita, e l'altra bile; onde la diversità e la divisione delle infiammazioni in stemmonose, e risipelatose, ec. Vennero in seguito i Chimici, i quali vedendo da per tutto, e perciò anche nel sangue, gli acidi, gli alcali, i principj sulfurei, non mancarono d'introdurre per elemento dell'infiammazione una immaginata morbosa effervescenza di questi contrarj principj, o in troppa copia per malattia raccolti nel sangue, o per morboso accidente mescolati insieme. Ernesto STAHL, trovando poi insufficienti questi principj dedotti dalla chimica per spiegarne l'infiammazione, disse esserne causa l'azione dell'anima conservatrice della vita, la quale accortasi di qualche morbofo ostacolo in qualche parte, quasi dotata di forza elastica, spingeva col mezzo dell'irritato cuore il sangue con maggior forza verso la parte affetta: a questa teoria si sottoscrisse il celebre Medico francese SAUVAGES, impugnato fortemente da EISTERO, HALLER, PUJATI, ec.: Contemporanea alla teoria di STAHL nacque la teoria meccanica dell'ostruzione, e dell'errore di luogo, come cagioni delle infiammazioni, attribuita comunemente a BOERHAAVE, perchè egli con molta precisione la esprime, e la confermò con molte ragioni; ma prima di lui MUSTANO, BELLINI, e PITCARNIO proposero l'ostruzione come causa dell'infiammazione; e VIEUSSENIO dato già aveva un'idea del così detto errore di luogo: teoria che fu confutata dallo stesso scolaro di BOERHAAVE, Gio. GORTER, ed in appresso da moltissimi altri. Una nuova dottrina dell'infiammazione è comparsa in Italia nel 1775, in una dissert. del Sig. VACCA, che si riduce alle seguenti proposizioni. Considera l'Autore il sangue come un fluido in istato di continua blanda accensione, ch'è la causa della sua fluidità: questo fuoco dipende dalla fisica solvente forza dell'aria, come nascono tutte le altre accensioni dei corpi: l'esca di esso è il chilo, dal quale per mezzo del contatto dell'aria si sviluppa nei polmoni la sostanza infiammabile, mentre ivi si dispongono materie acquose ed acide, che infestano poi l'aria già respirata: questo fuoco animale cresce e si manifesta più nelle locali infiammazioni, qualunque volta indeboliti i vasi, si raccoglie in essi maggiore quantità di sangue, e li distende fino ad oltrepassare anche nei vasi linfatici: l'indebo-

ftico del fangue, o qualche altra cagione efterna od interna, produce un ingorgamento nelle più piccole

---

limento dei vafi procede da un affluffo maggiore di fangue richiamato dalla non ben conofciuta azione degli ftimoli fopra i nervi: per ultimo l'aumentato calore nel fangue preternaturalmente accumulato in un tumore infiammatorio, fi attribuiſce dall'Autore all'azione dei nervi, o perchè deſſi ftimolati eccitino frequenti morboſe oſcillazioni nelle parti folide infiammate, o perchè i nervi ftimolati ſcarichino negli ammaſſati umori maggior copia del fluido elettrico, che contengono, e che diſpone gli umori medefimi a vieppiù accenderſi, come l'elettricità accende lo ſpirito di vino, il calore accende i foſfori, lo ſpirito di nitro le ſoſtanze oleoſe: Un'altra molto ingegnola teoria delle infiammazioni ſi legge nelle iſtituzioni Chirurgiche di KALISSEN, ſtampate nel 1777: l'Autore fa conſiſtere ogn'infiammazione nella irritazione del ſiſtema arterioſo nata da qualunque ſtimolo eſterno, od interno; della quale irritazione l'effetto è una morboſa dilatazione delle arterie irritate: queſto ſtimolo applicato, o comunicato alle arterie, le fa dilatate, ed ammettere un ammaſſo morboſo di fangue; comunicato al cuore, lo fa contrarre, onde la frequenza del polſo, e la febbre, ſe lo ſtimolo ſia forte e lungamente applicato: Analogo a queſto ſiſtema di KALISSEN, al quale pure ſi uniformò *Giacomo WINTHER*, è quello riferito da *CULLEN*, opinando eſſere la cauſa proſſima d'ogn'infiammazione una ſpaſmodica contrazione più o meno grande di minutiffimi arterioſi vafi, alla quale ſuccede un aumento di forza nelle arterie vicine prodotto dal ſiſtema nerveo; ed è dal conſitto per dir così, fra i contratti vafi, ed i vicini divenuti più vigorofi, che naſcono i ſintomi dell'infiammazione, il calore; dolore, tumore, &c. Dopo tutte queſte ipotefi ſull'infiammazione, che ſono le principali, conviene aggiugnere quella adottata dall'eccellente clinico Sig. *BORSIERI*, premeſſa alle ſue *Iſtituzioni di Medicina pratica*. E' certo, egli dice, che in ogn'infiammazione vi è maggiore affluffo di fangue arterioſo, che naturalmente non ſuele; certo che tutto il fangue affluente nelle arterie nel caſo d'infiammazione non è contemporaneamente aſſorbito dalle vene; certo per ultimo che infiammazione non accade, dovunque maggiore affluffo di fangue ſi fa anche non ſubito riaſſorbito dalle vene; dappoichè gli occhi ſono ſpeſſo roſſi per debolezza de' vafi ſenza eſſere infiammati, &c.; e che allora ſolo il roſſore e 'l tumore diventa infiammatorio, quando unito al concorſo maggiore del fangue verſo una parte vi è dolore dipendente dai nervi ſtimolati.

A tutte queſte teorie riſponde l'incomparabile Sig. Don *Pietro MOSCATI* con un ſeguito di molte ed irrefragabili ragioni, che troppo lunga coſa ſarebbe quì riferire: ed in ſeguito propone il proprio penſamento ſul modo, con cui ſi forma l'infiammazione, che in ſoſtanza riduceſi alle appreſſo propoſizioni. La qualità dell'aria, nella quale noi ſiamo immerſi, e reſpiriamo, piuttosto che la ſola differenza di temperatura è un elemento da conſiderarſi fra le cauſe produttrici delle infiammazioni: il paſſaggio della viziata aria alla ſana, unitamente alla diverſità della temperatura produce le infiam-

arterie sanguigne, cotali accidenti sono accompagnati da un senso di tensione e di calore nella parte,

matorie malattie delle parti esposte al più immediato contatto dell'atmosfera, per cui convien dire, che l'alterata evaporazione del flogisto sia una causa produttrice dell' infiammazione: il flogisto nelle arie viziate non può liberamente esalare, dunque rimarrà nel sangue circolante dell' uomo, che respira un' aria vizia, in copia maggiore, che se respirasse un' aria salubre: il flogisto contenuto nel sangue indipendentemente dalla materia del calore, gli concilia fluidità, ond' è somamente probabile, che il flogisto medesimo preternaturalmente accumulatosi, induca nella parte mucosa, ossia fibrosa una fluidità maggiore di quella, che ha nello stato naturale di salute; e che difatti la parte mucosa del sangue nelle malattie infiammatorie ben lontana dal diventare più densa, sia al contrario più fluida, che nello stato naturale, è dall' Autore dimostrato in modo da non dubitarne: tra tutti gli elementi che compongono il sangue, quello, che è capace di condensarsi all' aria aperta, si è il muco, altrimenti detto parte fibrosa del sangue; dunque la sostanza mucosa è quella che per la maggior parte forma la crosta pleuritica: oltre a ciò la crosta pleuritica è la prima fra le parti componenti il sangue ad imputridire, e prima pure ad imputridire fra gli altri elementi del sangue si è il muco separato dai globoli rossi, e dal siero; dipiù poi la crosta pleuritica anche la più compatta si scioglie, ed infuidisce immersa per alcune ore nell' acqua di calce, dopo essersi prima spontaneamente rappresa la sostanza mucosa.

Da questa teoria dell' accresciuta fluidità della sostanza mucosa nella diatesi infiammatoria, si spiegano i fenomeni della infiammazione assai meglio che nella opinione della morbosamente accresciuta tenacità del sangue in queste malattie. Così il non farsi crosta infiammatoria del sangue pleuritico, quand' esso è agitato, frattanto che cade nel bicchiere, siccome ha osservato SYDENHAM, si spiega, dicendo, che l'agitazione impedisce la separazione, e caduta dei globetti cerosi: il non apparire crosta pleuritica spesso volte nel sangue cavato per ultimo e diviso da quello ch' esce dapprima dalla medesima vena, siccome fu osservato da HEWSON, può dedursi, dacchè il sangue primo era stato meno deflogisticato dal contatto dell' aria; quindi più fluida doveva essere la sua parte mucosa; questa osservazione però non è costante, ed anzi alcune volte si vide il contrario, ciò che può dipendere o dall' essere uscito il primo sangue più lentamente, quindi dall' essersi più deflogisticato dall' aria, mentre l' ultimo esce più presto, o dal timore, o dallo spasmo convulsivo dell' ammalato, che abbia prima lasciato uscire il sangue a piccolo, poi più forte, e grosso getto; difatti egli è osservazione riferita prima da SYDENHAM, poi confermata dal De HAEN, che il sangue non ha crosta, quando cade goccia a goccia, e striscia la cute prima di cadere nel vaso, e l' esce più densa, quando più rapidamente ed in copia esce dalla vena; così la fa pure ancora tanto più quanto più alto ed angusto è il vaso, nel quale è ricevuto il sangue, secondo la osservazione del De HAEN, perchè la evaporazione del flogisto, siccome quella di tutti gli altri fluidi facendosi in ragione di superficie e non di massa, il vaso alto e stretto contiene la maggior massa colla minor superficie: *Il Tr.*



dov' è intercettata la circolazione. Questo ristagno del sangue è chiamato infiammazione. I sintomi accessori che l'accompagnano, variano secondo il grado d'infiammazione, della situazione, delle funzioni e della sensibilità della parte infiammata. Il malato vi prova, quando l'infiammazione è considerevole, o che invade qualche parte sensibilissima, un dolore fisso più o meno acuto, accompagnato da febbre e da un senso di ardore e di pulsazione. Con tali sintomi generali si formano le infiammazioni in tutte le parti molli del corpo; ciò non ostante siccome la loro sede è più frequente nelle membrane adipose, se l'infiammazione è visibile, la parte infiammata è non solo più o meno rossa e riscaldata, ma se l'infiammazione è notabile, vi nasce gonfiezza o tumore.

Si distinguono inoltre le infiammazioni, in semplice, allorchè con essa comincia la malattia; e sintomatica, quando insorge nel corso di un altro male: la loro durata e fine variano a proporzione della violenza del male, e della struttura della parte infiammata; ma sì nell'un caso, che nell'altro, la qualità della massa del sangue, ed i soccorsi che si prestano al malato, v' influiscono moltissimo.

Se l'infiammazione è considerevole, e viva, finisce prontamente, ed è raro che oltrepassi i sette giorni; invece che la flogosi, che è una infiammazione lenta o leggiera, e superficiale, può durare lungo tempo.

Rispetto al termine delle infiammazioni, spesso si dissipano colla risoluzione, la quale fa sì insensibilmente col riassorbimento degli umori stagnanti e della loro evacuazione. Questa si compie con critiche evacuazioni, sensibili ed abbondanti.

Se la risoluzione non si compie, l'infiammazione cade in ascesso, o la parte infiammata si cangre-

na e si sfacela . Allorchè l' infiammazione invade i corpi glandolosi , dopo l' evaporazione, od il riafforbimento della parte la più sottile degli umori stagnanti , degenera in un tumore duro , indolente , conosciuto sotto nome di scirro .

Si può sperare la risoluzione dell' infiammazione , che è l' esito più felice , quando la febbre e i sintomi dell' infiammazione non sono eccessivi ; come anche se i rimedj , per operare questa risoluzione , sono adoperati nei primi giorni del male , e che cominciano a produrre innanzi il quarto , e nelle infiammazioni lente innanzi il sesto giorno , una diminuzione sensibile degli accidenti esterni ed interni . Ella si può sperare ancora , quando nascono i forrieri di una metastasi o di una evacuazione critica .

Al contrario , se i sintomi sono violenti , e di più lunga durata di quello si è detto , senz' apparenza di risoluzione , nè di crisi prossima , egli è probabile che l' infiammazione finisca colla suppurazione ; e se il malato è sorpreso , nel maggior vigore del suo male , da brividi , da raddoppiamento di febbre , da dolore , e da inquietudini , si può giudicare , che si formi un ascesso , il quale più o meno prontamente si mostra , secondo la violenza dell' infiammazione , e della tessitura e sito più o meno profondo della parte malata ; e ciò fra il quarto al quattordicesimo giorno inclusivamente .

Frattanto che la suppurazione si forma , diminuiscono la febbre , il dolore , e gli altri sintomi ; i frizzi dolorosi alla parte offesa sono frapposti da un senso di pulsazione . Se l' infiammazione è interna , e la suppurazione considerevole , a misura che l' ascesso s' avvanza , succede appoco appoco al dolore infiammatorio , un senso di peso e di tensione . Se l' infiammazione è esterna , la parte infiammata si gonfia ; di rossa ch' ella era , diviene pallida , molle ,

ed una mano esercitata vi rileva subito della fluttuazione, anche nel caso che l'ascesso sia profondo; e s'egli è visibile, si vede la pelle diventare bianca e lucente, a misura che l'ascesso matura.

Non terminando l'infiammazione colla risoluzione, o colla suppurazione, e che invece il tumore infiammatorio s'indurisce, si secca e degenera insensibilmente in scirro, questi accidenti prodotti dall'infiammazione, diminuiscono appoco appoco senza metastasi, nè crisi. Questo esito succede spesso nelle infiammazioni esterne dei corpi glandolosi, che si può assicurarne coll'ispezione, e prevedere dall'analogia, e dalla combinazione dei sintomi, per ciò che riguarda le parti interne.

L'infiammazione finisce in cangrena, quando in una infiammazione esterna, la parte affetta diviene sfocia, insensibile, pallida, livida, con vescichette piene di un umore sieroso giallognolo o rosso. Se un'infiammazione interna degenera in cangrena, i dolori e i principali sintomi dell'infiammazione, cessano subitamente, ed invece del sollievo, che i malati provano per la risoluzione o suppurazione, intanto che vi si forma la cangrena, credonfi essi di stare molto meglio, ma sono però deboli, hanno il polso piccolo ed ineguale, la faccia affilata, ed il corpo si cuopre di un freddo sudore. Ciò è che succede ancora alle persone, le quali, nelle febbri acute muojono di sfacelo, il quale consiste nella mortificazione e cessazione assoluta della vita nella parte, od in altra cangrenata.

#### *Cura generale delle infiammazioni esterne.*

Nel caso che il malato sia senza febbre, leggiere l'infiammazione, e fatta in una parte, dove la suppurazione che potesse nascere, fosse di poca con-



seguenza, s'inumidisce, e si fomenta soltanto sempre coll'acqua vegeto-minerale del Goulard (b) unita ad una decima parte di spirito di vino canforato (c). In mancanza di codesto rimedio, serve l'acqua un po' più calda che tiepida, mischiata con un festo di acquavita (d). Se il malato avesse molto calore, dolori, od una forte tensione alla parte infiammata, vi si applica, sopra queste fomentazioni, il cataplasma emolliente N.º 15., sino a che i sintomi siano molto diminuiti (e).

Il malato nutrirassi di poltiglie e frutti cotti; berà molta tisana comune o d'orzo N.º 210., e 213., o l'orzata leggiere; o s'egli fosse costipato, una sufficiente quantità della tisana di cremore di tartaro N.º 211., per mantenere sciolto il ventre, continuando il tutto sino ad intiera dissipazione dell'infiammazione. Nel caso ch'ella prendesse la strada della suppurazione, userà unicamente il suddetto cataplasma; e maturato bene l'ascesso, si aprirà, e dopo averlo ripulito, medicherassi col balsamo d'Arceo (f), o con quello N.º 7.

(b) L'acqua vegeto-minerale del GOULARD chiamata ancora, acqua di Saturno si compone col prendere estratto di Saturno, un cucchiajo da caffè: acquavita; due cucchiaj da caffè: il tutto si getta in una pinta d'acqua comune, rimescolando benbene, sino a che quest'acqua acquista la bianchezza del latte. *Il Tr.*

(c) Lo spirito di vino canforato si fa col fare sciogliere in una libbra di spirito di vino rettificato, un'oncia di canfora. *Il Tr.*

(d) L'acquavita è un liquore spiritoso, tratto dalla prima distillazione del vino, o da qualunque altro liquore, che abbia provato fermentazione spiritosa. *Il Tr.*

(e) Fra i rimedj efficacemante risolventi, sono i vescicanti localmente applicati; le fomentazioni secche, canforate, premessi però i salassi ed i rimedj interni temperanti e diluenti. *Il Tr.*

(f) Il balsamo d'Arceo, ossia l'unguento di gomma elemi di Londra si prepara come segue: Prendete trebintina e gomma elemi, ana. once sei: fevo cervino, once nove: olio d'iperico, once due: si sciolga il tutto a lento fuoco, e si rimeseoli sino a che la massa sia fredda. *Il Tr.*

Se l' infiammazione fosse considerevole , e facesse temere la suppurazione , nulla si ometta per dissipare l' infiammazione . A tal effetto si salassi prontamente il malato una o più volte secondo la plethora , la maggiore o minore cotena del sangue , la violenza del dolore , l' infiammazione , la febbre , ed i motivi per temere della suppurazione , ec. I primi salassi sian generosi , con larga apertura , fatti , la prima volta alla più lontana estremità del luogo infiammato ; e rimediato alla plethora , si aprano le vene più vicine , e se abbisognassero ancora cacciate di sangue più locali , si ricorrerà alle sanguisughe , alle copette scarificate , preferendo ai nostri vetri ordinarij , quegli inglesi ( *g* ) , atteso che a questo modo si cava prontamente la quantità del sangue , che la natura del caso può esigere . Dopo il primo salasso , si applica il lavativo domestico N.° 108. ; si dà in seguito alla mattina il siero di latte tamarindato N.° 148. , o la tisana di cremore di tartaro del N.° suddetto , in sufficiente quantità per il caricare due o tre volte al giorno ; e tutte le sere , anche il lavativo succeanato , dopo il quale il piediluvio d' acqua-crusca con una tazza d' aceto . I rimedj esterni faranno i medesimi già nominati , diluendo solo l' acqua del Goulard con metà d' acqua comune , affine di non ripercuotere troppo presto gli umori stagnanti .

Il malato osservi nel medesimo tempo il regolamento H. S' egli è inquieto , prenda verso l' ora del sonno , l' emulsione calmante N.° 66. : dopo pranzo , bea molta limonea calda , o se avesse il sangue acre , orzata cotta e leggiera , continuando

---

( *g* ) La copetta inglese è una specie di macchinetta pneumatica , che per mezzo di uno stantuffo si attrae e spingesi tutta la possibile quantità di sangue , che il vaso può contenere . *Il Tr.*

questo metodo, fino a che sia vinta l'infiammazione; s'ella fosse stata confiderevole, si purghi nella prima convalescenza, colla pozione lassativa N.º 166., e prenda per otto giorni, il brodo rinfrescativo N.º 14.

Se l'infiammazione fosse stata trascurata nei primi giorni, e ch'ella fosse viva, ed ostinata, si rifletta ai sintomi, che annunciano la suppurazione.

Nelle infiammazioni esterne, la suppurazione comincia di rado prima del terzo giorno; e quando la prima è poco viva, ella può essere ritardata da più giorni.

Si rinuncia al salasso, ed ai rimedj troppo rinfrescativi, quando vi sia luogo a credere, che l'infiammazione si termini colla suppurazione; ed affine di facilitarla, si applicherà sulla parte affetta il cataplasmo ammolliente N.º 15. Se la suppurazione sembrasse farsi difficilmente, si servirà del cataplasmo maturativo N. 17., al quale per comodo dell'ammalato, si potrà sostituire durante la notte, l'impiaastro diacquilonne colle gomme (b). Durante la suppurazione; la bevanda farà la tisana di scorzonera N.º 217., mescolata con parte eguale di acqua; alle ore dei pasti, potrà mangiare la zuppa, ed un uovo fresco, o qualche erbaggio salubre. Tale farà il suo regolamento, fino a che la mollezza e la bianchezza della maggior porzione della parte stata infiammata, dinoti che l'ascesso è maturo. Allora si aprirà secondo l'arte con istromento tagliente, ed in mancanza casuale del Chirurgo, affine di farlo

---

(b) L'impiaastro diacquilonne colle gomme di VIGO, ossia l'impiaastro gommoso di Svezia si prepara con ventiquattro once d'impiaastro diacquilonne semplice: cera gialla, once quattro: sciolte queste sostanze vi si aggiugne terebintina di Venezia, polveri di gommamoniaco, di galbano, di opoponace, di sagapeno: ana once una: semisfreddo, vi si unisce zafferano polverato, dramme due. *Il Tr.*



aprire, si applicherà l'unguento basilico (i) sulla parte più alzata dell'ascesso.

Aperto l'ascesso, si preme dolcemente il tumore alla sua periferia, per fare fuoruscire le materie contenute. Nella prima medicazione, si riempia soltanto il vuoto con molle filaccia, soprapponendovi l'impiaastro diapalma (k). All'indomani si comincia a servirsi di piumaccioli intrisi nell'unguento digestivo N.º 135.: nel caso che prima dell'apertura dell'ascesso, il tumore non fosse stato fuso, si continua ad applicare sopra i piumaccioli, l'impiaastro sopra nominato, fino a che non vi sia più durezza o callosità.

Si avverta di fare le medicazioni con prontezza, ed in modo che la piaga non sia sorpresa dall'aria fredda, rinovandole mattina e sera fino a che la suppurazione farà copiosa. A misura ch'ella diminuirà, e che si riempirà l'ascesso, si frapperanno più lunghi intervalli da una medicazione all'altra, diminuendo insensibilmente il volume dei piumaccioli e la quantità del digestivo, evitando di detergere troppo a fondo il pus, per non distruggere nel medesimo tempo le carni nascenti.

Quando l'ascesso farà quasi pieno, e le carni venute a livello della pelle, affine di accelerare la cicatrice, se ne coprirà solamente la superficie coi piu-

(i) L'impiaastro basilico di MESUE, o tetrafarmaco di GALENO si fa con pece nera, resina e cera, ana once dodici: olio d'olivo, libbre tre: si pongono queste cose in un bacino a liquefare insieme: si passano per pannolino, e conservansi in un vaso. *Il Tr.*

(k) L'impiaastro diapalma, o diafenicone di GALENO, corretto, o diachalciteos, si prepara nel seguente modo: Recipe olio di palma once sei: olio d'olivo once sessantasei: foglie tenere di quercia, once otto: si cuoce il tutto a siccità, poi vi si aggiugne litargirio, once quarantotto: si ricuoce a consistenza d'impiaastro, a cui per impedire che s'abbruci, vi si scioglie vitriuolo bianco, once quattro. *Il Tr.*

piumaccioli secchi o leggermente inzuppati di tintura di mirra (1).

Siccome le infiammazioni sintomatiche che sopravvengono nelle malattie febbrili, fatte per metastasi, sono soventi critiche, la suppurazione allora è salutare, e preferibile alla risoluzione; e se l'abbondanza del pus, la cattiva qualità delle nuove carni, o la difficoltà di cicatrizzare l'ascesso, esigessero una diversa medicazione, si consulti il prescritto all'articolo delle ulcere.

Avrassi tanto più a temere dell'esito dell'infiammazione in scirro, quanto più la parte infiammata sarà di natura glandolosa, e l'infiammazione ostinata. In questo caso, se l'infiammazione fosse sintomatica o critica; o che in una infiammazione semplice, il metodo raccomandato per promuovere la risoluzione fosse stato infruttuoso nei primi sei od otto giorni, affine di prevenire il termine dell'infiammazione in scirro, conviene rinunciare alla risoluzione, e favorire invece la suppurazione coi mezzi sopra raccomandati. A tal effetto, si applica subito il cataplasma ammolliente; e ammolito il tumore ( siccome nei tumori glandolosi la suppurazione è lenta e difficile ) si provoca col cataplasma maturativo N.º 18., animato, secondo il bisogno con più o meno di gommammoniaco, evitando, se è possibile, di aprire l'ascesso del corpo glandoloso, prima che la maggior parte del tumore non sia molle, e convertita in pus; e se l'ascesso venisse ad aprirsi, prima che il tumore sia intieramente fuso,

*Tom. I.*

R

---

(1) La tintura di mirra si fa con due once di mirra, ed once otto di spirito di vino: polverata la mirra, si pone ad infondere nello spirito di vino a fuoco leggiero per sei giorni, poi si feltra, e si conserva. *Il Tr.*

affine di accelerare , colla suppurazione , la fusione dei reliquati ancora duri , s'inzupperanno i piomacciuoli , invece del digestivo , nell' unguento basilico , mischiato con un ventesimo di precipitato rosso , o di un quarto d'unguento egiziaco (m) ; sopra i piomacciuoli , applicherassi nella notte , l'impiastrò di aquilonne colle gomme , e fra 'l giorno il suddetto cataplasmo suppurante , mantenendo per tal modo la suppurazione , fino a che tutto il tumore sia sciolto ; e se invece l'ascesso si consolidasse , si risolverà la rimasta durezza coll' impiastrò di cicuta . Si purgherà nel medesimo tempo il malato due volte la settimana colle pillole di colomelano N.º 155.

Degenerato il tumore in scirro , frattanto ch' egli è recente , e libero da irritazioni che temer facessero il carcinoma (n) , si risolve coi rimedj rac-

(m) Quest' unguento chiamato anche mele egiziaco di Londra , è fatto con once cinque di verdame , once sette d' aceto , e quattordici di mele , il tutto ridotto a debita consistenza : *Il Tr*

(n) Il carcinoma , chiamato anche cancro , o canchero , si divide comunemente in occulto ed in manifesto : il primo è un tumore scirroso , che spontaneamente senza causa manifesta s' indolenta e s' illividisce con gonfie , e tante volte varicose vene all' intorno : viene pure questo canchero contrassegnato da alcuni per canchero non ulceroso : il manifesto , ossia ulcerato , è quando dopo queste precedenze il tumore si apre ed esulcera , ed in vece di tramandare lodevole marcia , ne trapela un umore acre fetido tenue putido , con una fungosa vegetazione nel fondo dell' ulcera , avente i labbri disuguali e rovesciati . EZIO lasciò scritto che l' anzidetta materia del cancro è più micidiale di qualunque veleno animale : *ulceratus cancer assiduus erodit , & ad profundum perfodit , nec sisti potest , & sanem emittit , omni ferarum veneno deterioorem , copia & odore ubominabilem* : Serm. IV. cap. 43. lib. IV. , onde CAMPER vuole che il cancro , qualunque desso sia , si debba immediatamente estirpare , innanzi che il suo veleno si trasfonda alla massa umorale : *demonstr. anat. pathol. lib. 2. p. 9.*

Il cancro è una delle malattie , nelle quali il più valente pratico non fa a quale partito appigliarsi per procurarne la guarigione : chiamato giustamente da taluno *noli me tangere* :

*Ulceris id genus est , quod quum sanabile non sit ,*

*Non contrectari tutius esse puto :*

I medicamenti piacevoli , dice il REDI , non arrivano ; i gagliar-



comandati per i tumori cistici , evitando tutto ciò ,

R 2

di rendono gli umori del cancro più efferati : se vogliamo espellere , corriamo pericolo d'indurire ; se vogliamo ammolliare , corriamo pericolo di putrefare ; se vogliamo digerire , o attenuare , corriamo pericolo , che , esaltate le parti più sottili , il male non si renda maggiore ; se ora all'una , ora all'altra intenzione scambievolmente volgiamo l'occhio , non si ottiene nè quella , nè quella intenzione : Esternamente curato , o tagliato , non si arriva mai alla cicatrizzazione . sicchè non abbiamo fatto altro , che di un cancro non ulcerato , farlo ulcerato . Che se pure dopo il taglio , dopo il fuoco , si riduce il tumore alla cicatrizzazione , ed alla perfetta guarigione , con tutto ciò presto ritorna , e questo non può più cicatrizzarli : *amputatus cancer*, disse CELSO, *redit vel in liene, hepate, utero, &c., & mortem affert* : lib. V. onde quì sta bene ciò , che cantò OVIDIO

*Curando fieri quædam pejora videmus*

*Ulceræ, quæ melius, non tetigisse fuit .*

IPPOCRATE anch'esso, ordinò di non toccare il cancro non ulcerato , *aph. 38. sect. 6.* : GALENO , Paolo d'EGINA , hanno usato esternamente la morella ; PARACELSO il giosquiamo , a cui STALIO vi aggiunse la nicoziana ; AEZIO e Fabrizio d'ACQUAPENDENTE ordinavano ad uso interno l'infusione del trifoglio ; FALLOPPIO la virga-aurea ; Arnaldo di VILLANOVA , e TRAGO consigliarono il cardo benedetto : si sono perfino prescritti gli escrementi medesimi , siccome l'*oleum stercoris* di HARREFFER ; *aqua stercoris* di WEICHARD . Nelle mediche disputazioni di HALLER tom. VI. trovasi da GMELIN proposto il sublimato corrosivo alla dose di quattro grani disciolto in quarantott'once di spirito di vino , da prendersene due once al giorno , soprabbevendo in dose abbondante un decotto di falsaparilla , radice d'altea , e sassaparilla : esternamente poi questo autore suggerisce di applicare stuelli spalmati del linimento composto di aceto di litargirio , once una : zucchero di saturno , mezzo scropolo : sugo di semprevivo maggiore , once una , unguento nutrito , dramme una e mezza : si unisca il tutto a consistenza di linimento : Tiberio LAMBERGEN racconta la guarigione di un cancro alla mammella coll'uso interno del solano furioso ossia atropa bella donna . già stata nel 1639. prescritta a questo stesso effetto da Michele ALBERTI , e nel 1757. da GATAKER , cerusico di Londra ; e come abbiamo già detto , prima di tutti usata da GALENO e Paolo d'EGINA : Nelle memorie dell'Accademia Reale di Parigi anno 1743. si legge la osservazione di un'ulcera cancerosa alle labbra , guarita colle unzioni d'olio d'ulivo , in cui erano state infuse le foglie della perficaria europea . SOULENANDER adoprà con vantaggio l'esterna applicazione delle foglie di fitolacca ; inutilmente la usò PLENCK : STÖRCK ha proposto , e decantato l'estratto di cicuta : è comandato internamente ed esternamente l'arsenico bianco , di cui il precitato PLENCK dà il modo di adoperarlo : si pongono due grani di arsenico bianco in una libbra d'acqua , con un'oncia e mezzo di sciroppo di cicoria composto ; e se ne porge un cucchiajo mattina e sera unitamente a mezza dramma di sciroppo di diacodio ,

che irritar potesse lo scirro, il quale estirperassi al

ed una dramma di latte: dopo otto giorni si danno due cucchiaj, e dopo quattordici giorni, tre cucchiaj: esternamente si lava e si tiene bagnato il canchero colla soluzione arsenicale: HEINHORLL, in una sua memoria stampata a *Konigoberg* nel 1785. decanta anch'esso l'uso esterno dell'arsenico: Rimedj topici riputati valevoli nel cancro, sono il sugo di carota, di bieta rossa, d'erba vermicolare, l'olio di mirra per deliquio unito al sugo di semprevivo. Nel cancro accompagnato da vivissimi dolori, conviene una generosa dose di oppio. BERTRANDI in una donna tormentata da pungentissimi dolori per un cancro all'utero, ne preferisse dai venti sino ai trenta grani al giorno: uno specifico del cancro, come anche della lebbra, e della lue venerea, è quello delle lucertole, o ramarri, di cui hanno parlato tutt' i giornali sulla fede di *D. Giuseppe FLORES*, il quale in una sua operetta stampata a *Madrid* nel 1782., accerta che in America cotale rimedio riesse infallibile per le nominate malattie: fra noi le replicate prove non hanno deciso, a riputarlo di tanta efficacia: Il Cel. POUTEAU *Œuvres postumes*, cc. Parigi 1783. 3. vol. 8. dice di averlo usato con sommo profitto per la cura del cancro l'acqua diacziata, esibita sola senza verun altro alimento, o medicamento, continuata per alcune settimane; solo ei v'aggiugne piccole dosi di magnesia, se il ventre sembra inclinato alla diarrea. lo stesso autore dice, che i cauterj non sono un liero preservativo di questo male: E' stata proposta ancora l'acqua di calce viva come potente a guarire il cancro occulto, ed aperto; questa si dà dalle sei alle otto once con altrettanto di decotto di salsaparilla, o di legno guajaco, purgando l'ammalato ogni quattro o sei giorni colle pillole balsamiche del BECCHERIO, o con quelle balsamiche di STAHL, che nella virtù sono eguali. BAUME, *elem. de pharmac.* Avvi ancora la *panacea anti-cancerosa*, così denominata per la supposta virtù di guarire infallibilmente tutta specie di cancro: ella è composta di limatura di ferro, e di sale ammoniaco calcinati, once quattro per forte: olio di vitriuolo, once due: olio di tartaro semplice, once quattro: con esso si unge tre volte al giorno con pennello, procurando però di evitare i vasi ed i nervi, sul cancro aperto: seccata intieramente la piaga, si cuopre con semplice tela, o con una compressa: questo rimedio produce un'escara, tolta la quale, e ripurgata la piaga, si replica l'unzione, e ciò si rinnova fino a tanto che sono distrutte intieramente le durezza. BORELLI (*hist. & observ. centur. 2. p. 151.*) trovò vantaggioso il sugo espresso dal cardo tormentoso (*onopordum acanthium*), applicato sul cancro; ovveroamente l'erba stessa soppressa; e STAHL confessò di esser guarito con questo rimedio da un carcinoma incipiente della faccia, già refrattario ad altri rimedj. MURRAY, *apparatus medicaminum* tom. I. p. 71. Il dottissimo Sig. NESSI, nel riferire anch'esso le virtù di questa pianta contra il cancro, avverte, che farà bene di unirvi ancora una decozione di radice di salsaparilla, bardana, e saponaria con alcuni grani d'antimonio pulverato: (*Institutioni di Chirurg. tom. II.*) lo stesso esimio autore riferisce, che in Francia ed in Germania è stata sperimentata utile nei cancri della faccia

più presto possibile (o): e se ciò non è praticabile, si prescriveranno i palliativi nominati all' articolo dello scirro.

Per ciò che riguarda la cangrena (p), dacche si

R 3

la polvere composta di due dramme di cinabro, d'otto grani di cenere di cuojo vecchio abbruciato, di dodici grani di sangue di drago, e di quaranta grani d'arsenico bianco: si purga dapprima l'ammalato con un purgante idragogo (rimedio evacuativo della fierosità) si mette alla dieta lattea, e se'l canchero è di una base larga ed ampia, s'apre un cauterio: poi s'impasta la polvere con un pò d'acqua; si stende con una spatola su tutta la circonferenza del tumore grossa quanto un mezzo soldo, e si cuopre con un pezzo d'agorico (liscia). Poco dopo l'applicazione del rimedio, la parte si riscalda, prude, duole, e s'infiamma; sintomi però che non portano seco veruna conseguenza: dopo alcuni dì l'escara cade, e vi lascia un tumore deterso e di buona qualità, che non tarda a cicatrizzarsi: Alcuni vogliono valere le sanguisughe applicate in vicinanza del tumore nel cancro aperto. Dopo la estirpazione altri raccomandano generosa dose di chinacchina internamente ed esternamente; ometto ciò che si è asserito sulle virtù della sabina, dell'agliaria, dell'assenzo, dell'geranio roberziano, dell'uso interno ed esterno dell'erisimo, della infusione della dentellaria secca; siccome pure del rosso applicato sul cancro; del succiamento per mezzo de' cagnuolini nel cancro ulcerato, e dell'applicazione della carne magra di vitello, affine il verme che li suppone annidare nel cancro, possa satollarsi con essa, e lasciare frattanto libere le parti sane circonvicine; della insolazione diretta sulla parte ammalata per mezzo di una lente, ec. Finalmente in questi ultimi tempi è stato proposto l'uso dell'aria fissa, da applicarsi alla parte affetta nell'atto stesso, ch'essa si svolge dal corpo fermentante; la qual cura, come dice l'egregio Sig. MOSCATI, e per la sua semplicità e per la sicurezza, in cui siamo di non poter nuocere, meriterebbe di essere all'occasione praticata: si potrebbe ancora per maggiore facilità applicare alla parte affetta, dell'acqua impregnata d'aria, o potendosi immergere in quest'acqua medesima, ed anche nello stesso tempo darne certa discreta dose interiormente, e facendola coll'arte, o prendendola fatta dalla natura nelle acque di Pirmont, di Spà, di S. Maurizio. *Il Tr.*

(o) Ciò che suggerisce pure il grande BERHAAVE: *si non cedit his. si locus, situs, vicinia, mobilitas, conditio mali, robur, & valetudo aegri permittunt, ocys ferro integre eximendus est.*

HOME assicura di avere colla radice di mezereon dileguati tumori scirrofi, che parevano incurabili, e pe' quali si era inutilmente usata la cura mercuriale: una bottiglia di decotto in cui entravano due dramme di detta radice, era la dose giornaliera che faceva prendere: una dose maggiore accagionava gravi sconcerti. *Clinical experiments, Histories, and dissections, ec. London 1780. Il Tr.*

(p) La cangrena, o cangrena, o mortificazione, o necrosi, che si voglia chiamare, è giustamente divisa in umida, e secca: nella pri-



offerva della disposizione a quest' incomodo accidente, il quale si rileva da un principio d' insensibilità, di pallore, d' appassimento alla parte infiammata, applicasi immediatamente il fomento anti-cangrenoso N.º 80., prendendo nel medesimo tempo il decotto anti-setico N.º 22., da replicarsi nei casi urgenti, ad ogni ora, ed anche più se abbisogna; si dà ogni quattr' ore un buon brodo; e per bevanda la limonea mescolata con un quarto o metà di vino, il tutto da continuarsi fino a che i progressi della cangrena siano arrestati (q).

Se la parte che n' è affetta, non riprendesse presto la sua sensibilità ed il natural calore, e la cangrena invece è degenerata in sfacelo, ( ciò che conoscerassi dal livido colore, e dalla perfetta insensibilità della parte cangrenata ), si scarifica la parte morta, fino al vivo, e si medica coll' unguento di storace, continuando la limonea vinoso, e l' uso dei rimedj esterni ed interni surriferiti; e si replicano, mattina e sera, le scarificazioni, fino a che la cangrena abbia cessato di fare dei progressi; e se si estendesse rapidamente, si può tentare di fissarle dei limiti, toccando con circospezione sul vivo,

ma, la parte cangrenata è inondata da continua copia di corrotti umori, i quali non solo spandono un fetidissimo puzzone, che guasta l' aria, ma che ancora facilmente s' insinuano nelle vie del sangue, e sì lo imbrattano, che ne nasce una febbre putrida: la cangrena secca è quella prodotta da impedito afflusso d' umori: MARKWART, *de cangrena & sphacelo*. Gott. 1734. *Il Tr.*

(q) Se nella cangrena vi fossero sintomi indicanti corruzione d' umori; se vi fosse riassorbimento di marce, che avesse corrotta la massa del sangue; o vi fosse un debilitamento dei solidi, o per difetto di temperamento, o per malattia sofferta, o per forte emorragia, o vecchiaja, in questi casi, dice il celebre Sig. BRAMBILLA, se v' è rimedio, la corteccia peruviana farà uno dei più efficaci mezzi per correggere gli umori, e rin vigorire le fibre, ed i vasi di quel corpo, che ha bisogno di soccorso: ella conviene ancora usata esternamente sulle cangrene umide, piccole, e ragguardevoli: *Trattato del flemmone. Il Tr.*

la circonferenza della cangrena, coll'acqua forte, con disciolto un festo di mercurio crudo e depurato.

Arrestati i suoi progressi, si applicano i piomaccioli intrisi di unguento di storace sulle parti sfaccellate; ed affine di ammolliare le escare, e di facilitare la suppurazione, con cui si staccherebbono, applicasi il cataplasmo ammolliente sopra i piomaccioli, e su tutto l'apparecchio, la fomentazione aromatica N.º 78. Avvertasi sempre di staccare dolcemente le croste e le carni morte; ed a misura che la suppurazione diviene lodevole; e le carni fresche, col colore, e qualità naturale, si usa la medicazione per gli ascessi, stata sopra raccomandata, applicando inoltre sull'apparecchio una compressa inzuppata nell'acquavita. Se, malgrado l'esecuzione di queste prescrizioni, lo sfacelo, si manifestasse tanto perfettamente, che la parte viziata fosse insensibile, fredda, livida, e puzzolente, non vi resta altra risorsa che quella di amputarlo prontamente secondo l'arte, ed intieramente sul vivo, diversamente il malato morirebbe o presto o tardi, secondo la situazione e le funzioni della parte sfaccellata e i progressi dello sfacelo (r).

R 4

---

(r) E' stata fra i chirurghi promossa la quistione, se l'amputazione far si debba eseguire sulla parte viva, o morta. Su questo proposito il dottissimo chirurgo imperiale è d'opinione, che facendola nelle parti morte, non si cagionerà verun dolore, ma per sfidare lo sfacelo, non farà di gran giovamento, poichè il corpo mortificato, che può danneggiare la parte viva, ancor rimane attaccato, e quantunque si separi poscia la cangrena rimasta, e attaccata alla parte sana, distruggerà gran parte della cute, e l'osso cariato avrà quasi la stessa difficoltà a separarsi, come l'aveva prima dell'amputazione, e la piaga rimasta dopo le separazioni sarà difficile e tarda a cicatrizzarsi; ed anche cicatrizzata sarà debole, e deforme, di modo che probabilmente non darà luogo a potersi applicare un membro artificiale, che possa in qualche modo supplire al membro perduto. *Il Tr.*

*Cura delle infiammazioni interne in generale.*

Quando in una parte inaccessibile alla vista, sopravviene un dolore fisso, che cresce alla compressione, o che s'irrita col movimento, avvi luogo a presumere, che vi è dell'infiammazione; e l'infiammazione è decisa, se il dolore è permanente, vivo, pungente, ed accompagnato da febbre.

L'infiammazione interna sia semplice o sintomatica, è sempre più o meno pericolosa, se non si risolve: i soccorsi della medicina sono tanto più efficaci nei primi giorni quanto divengono in seguito deboli (*f*). Non si ometterà niente di ciò, che si raccomanderà per dissipare le infiammazioni interne in generale, e le eccezioni a farsi, faranno riferite, parlando delle infiammazioni interne in particolare.

Si farà immediatamente un generosissimo ed ampio salasso, e questo alla più remota estremità della parte infiammata. Immediatamente dopo il salasso, si svuoteranno le intestina col lavativo domestico N.º 108. Per poco che la parte viziata sia esternata, vi si applicherà il fomento N.º 83., od in sua vece, una vescica piena per metà di latte caldo. Si esibiranno, al malato le bevande raccomandate per le infiammazioni esterne, facendo le distinzioni sopraccennate, e queste tiepide, prese poco per volta ma frequentemente, cioè tre o quattro

(*f*) Ciò si conforma con ciò che lasciò scritto NICHELL (observat. circa crilium prædictionem p. 88.) *Admodum manifestum est, quanta celeritate, quanto vigore inflammationis progressus impedire debent. Etenim si inflammatio ad certum quendam apicem adscenderit, omnes medicinae vires suppurationem avertere nequeunt, nec unita universae facultatis scientia de sequelis hujus, cum semel formata fuerit, respondere potest. 11 Tr.*



volte in un quarto d'ora, preferendo la tisana d'orzo N.° 213.

Per tutto pasto darassi ogni quattr'ore una lunga poltiglia fatta coll'acqua, un brodo debolissimo di vitello o di pollo, alterato con un po' di crema d'orzo. Si replicherà il salasso due ore dopo rimesso il lavativo, e più il sangue sarà cotoso, vivo il dolore, e violenta la febbre, si replica la terza, la quarta, ed anche la quinta volta, osservando sempre di diminuire di un pajo d'oncia la quantità del sangue, che si caverà dopo il secondo salasso.

Nell'intervallo dei salassi, si applica mattina e sera il lavativo domestico sopraddetto, od uno di fiero di latte, aggiugnendo ad ogn'ora nella bevanda, sei grani di nitro depurato. Dacche la coteina infiammatoria del sangue, non che gli altri accidenti ed il dolore soprattutto faranno notabilmente diminuiti, se l'ammalato avesse raddoppiamenti di febbre, e sintomi di pienezza allo stomaco od al basso ventre, per prevenire che il vizio delle prime vie non prolunghi, e non accresca l'infiammazione, si dà la polvere emetica N.° 192., nel caso avesse nausea, lingua impaniata, bocca cattiva con senso di pienezza allo stomaco; altrimenti, se il basso ventre è pieno e gonfiato, la pozione minorativa N.° 168. L'ammalato bea molto, affine di temperare e di diluire gli umori; e se le indicazioni della purgazione si rinovassero nel corso dell'infiammazione, e soprattutto se vi fossero stati contemporaneamente raddoppiamenti di febbre, o che l'infiammazione fosse sintomatica, si replicherà secondo il bisogno la suddetta pozione purgativa, e continuerassi a salassare sino a che lo richiederanno l'ardore della febbre ed i sintomi urgenti dell'infiammazione.

Rispetto alla scelta della vena da preferirsi

nelle infiammazioni alla testa, agli occhi, alle orecchie, ed alla gola, s'incomincia dal salasso dal braccio, dappoi si replica un pajo di volte dal piede. Se lo stato dell' infermo indicasse realmente, che si dovesse rinovare ancora il salasso, per l' infiammazione della testa, si apre, s'egli è possibile, la giugulare, alternando questo salasso colle ventose alla nuca come anche sulle omoplate, colle coppette inglesi: questi salassi locali sono efficacissimi per i mali degli occhi e delle orecchie.

Nelle infiammazioni della gola, si apre la vena, che è sotto alla lingua.

Nelle infiammazioni del petto si alterna il salasso del braccio con quello del piede, preferendo non pertanto l'ultimo, quando la testa è imbarazzata.

Rispetto al basso ventre, ammeno che non vi sia nel medesimo tempo soppressione di moroidi e di menstrui, egli è costume di non salassare che dal braccio. Nelle infiammazioni della vescica e delle parti vicine, egli giova moltissimo di applicare le sanguisughe all'ano, dopo avere anticipatamente rimediato alla pletora con due salassi dal braccio. Affine di rallentare il corso del sangue verso la parte infiammata, si comprimerà dolcemente l'arteria, che la innaffia.

Nel resto egli importa meno che generalmente non si crede, di distinguere scrupolosamente il salasso dal piede di quello dal braccio; le leggi della circolazione e le sperienze dimostrando, ch'ella produce il medesimo effetto per tutto il tempo, che vi esiste una egual pletora in tutti i vasi (t). Ma egli

---

(t) Il salasso è uno de' primi soccorsi praticato da tutt' i popoli contro le malattie. IPPOCRATE in più luoghi delle sue opere parla spesso del salasso, e sulla opinione che ciascuna vena corrisponde

farebbe a desiderare, che dopo avervi rimediato, i salassi locali, e soprattutto le scarificazioni colla

---

al suo rispettivo viscere, prediligeva sempre l'apertura della vena più vicina al viscere malato. AVICENNA, il primo de' medici arabi aveva per massima essenziale di aprire le vene corrispondenti al luogo della malattia; così raccomandava l'apertura della vena sciatica (ramo della safena posta a lato del tallone) per i dolori ischiadici; della vena della fronte, e del sincipite, dall'arteria temporale, per i mali di testa, ec. Venne un tempo, che si occuparono i medici sulla scelta dei vasi da aprirsi nelle differenti malattie; dal cui fervore nacquero dispute gravissime: le maggiori si sono eccitate sul salasso nella pleurisia. Gli uni cavavano sempre sangue dal lato infermo; gli altri dal lato opposto; e i terzi seguitavano dappprincipio il secondo metodo, poscia il primo, e vi frammezzavano i salassi dal piede; i quarti aprivan sempre le vene dal piede. VESALO conchiuse dalla situazione della vena azigo, che uscendo dal lato destro, somministra il sangue a tutt' i lati, se se n' eccettuano i tre superiori sinistri, che si dovesse salassar sempre dal braccio diritto, eccettuato ne' casi, ove questi ultimi fossero la sede del dolore. SCALIGERO scorse il primo a provare colle leggi dell' idrostatica, che si doveva salassare al lato opposto dell' affetto. BELLINI, volendo ragionare secondo i principj della matematica, disse, che il sangue scorre con più di rapidità durante il salasso nell'arteria che corrisponde alla vena; e nell'andarvi (il che egli chiama *derivazione*) abbandona i vasi lontani (ciò ch' egli nomina *rivulsione*); e che nelle infiammazioni devonfi salassare i rami, che hanno la comunicazione più lontana alla parte ammalata per non attirare il sangue su questa. Lascio le questioni, ed ostinate dispute insorte in questo secolo per provare chi l'una e chi l'altra delle antiche opinioni sulla derivazione, e rivulsione, che non fanno al caso nostro, e che si ponno legger raccolte nel libro anonimo, che ha per titolo *Storia del salasso*, scritto con non volgare erudizione: anzi l'erudito anonimo parlando della scelta del vaso da aprirsi nelle malattie, comincia a distinguere la pletora in generale, o particolare, La generale suppone un' uguaglianza nel corso della circolazione, un equilibrio tra i suoi vasi del sangue, il qual equilibrio farà distrutto per tutto il tempo, che il sangue scolerà, ma ben presto si ristabilirà, chiuso il vaso. Per questo principio convengono tutt' i rivulsorj del pari, che i locali: in questo caso adunque è uguale aprir la vena del braccio, del piede, del collo, ec. Una regola da osservarsi è quella di aprire la vena la più grossa, e la più facile a pungerfi; la più grossa, perchè dando in un medesimo spazio di tempo una più grande quantità di sangue, ella produrrà con una minor perdita l'effetto desiderato, di cagionare un leggiero svenimento.

Rapporto alla teoria della derivazione, e rivulsione merita d' essere letto CEDERER, *de derivat., & revuls.*, e soprattutto è degna di somma lode la erudita dissertazione di GROSS, che ha per titolo *venæ sectionis vera indicationes*, giustamente meritevole di essere stata dal grande Sig. FRANCK trascelta per inferire sul suo *delectus opusculorum medicorum* Vol. III. QUESNAY, *traité des affets &*



macchinetta inglese, di cui la speranza ne prova il grande vantaggio, avessero il bene, ch' elleno meritano ; e che si fosse molto più moderato sul numero de' salassi e sulla quantità del sangue, che si cava dal braccio e dal piede.

Prima di finire l' articolo dell' infiammazione in generale, rimane ad osservare; che in quella del basso ventre, i semicupj tiepidi carichi di crusca ed imbianchiti col latte, sono efficacissimi ; e che nelle infiammazioni degl' intestini tenui, bisogna usarli più sollecitamente, mentre per la debolezza che succede ai salassi, queste infiammazioni degenerano prontamente in cangrena .

Si avverta ancora moltissimo nelle infiammazioni dei muscoli e delle loro membrane , se partecipano del carattere reumatico. Quest' ultimo caso è frequente nelle intemperie dell' aria, a motivo della soppressa traspirazione. Gli accidenti che sopraggiungono allora , sono assai simili a quelli dell' infiam-

*de l' usage de la saignée . Paris 1750. DAVID , recherches sur la maniere d' agir de la saignée , ec. Paris 1765.*

Così nelle malattie dell' addomine , e nei mali del sesso la maggior parte dei medici convengono , che si debba aprire la safena ; ma anche in questo caso , avverte benissimo il cel. de MEZA , conviene osservare , che nelle persone pletoriche deve si preferire la cacciata di sangue per rivulsione a quella per derivazione , perchè non si faccia maggiore congestione sulla parte affetta ; così nella metritide, se avvì pletora importa salassare prima dal braccio, poi dal piede ; nella frenitide, nell' angina, non conviene la derivazione se non premesse le rivulsioni , come addottrina anche VAN-SWIETEN , e TRALLES : nella peripneumonia giova moltissimo trar sangue della safena , dopo premesse alcune missioni dal braccio .

E' stata opinione di qualche antico , che il salasso delle vene poste posteriormente alle orecchie , e la frequente applicazione delle sanguette nelle odontalgie , renda gli uomini impotenti e stupidi , sognando di vedere una vena delle altre più prominente , nelle quali riheda un liquore prolifico . quel liquore che nell' atto coniugale si trasporta sulle parti genitali , e per l' organo seminatore sorte per la fecondazione : il volgo crede ancora , che le sanguette poste alle moroidi abbassino e diminuiscano la vista , ed altrettali baje e false credenze , che non meritano la seria confutazione di un medico . Il Tr.

mazione semplice , e spesso somiglievoli alle pleuritide , alla peripneumonia , all' infiammazione dello stomaco , a quella del cervello , ec. Un ampio vescicante applicato sulla parte affetta , risparmia molto sangue ; i dolori calmano ; la convalescenza non farà un languore crudele come quella delle persone salassate oltre modo : il vescicante , sloggiando l'umore reumatico , dissiperà l' infiammazione ed i fomi che l'hanno prodotta ; come pure nella gotta rimontata , che ha ripreso il suo corso verso le estremità , si toglie con un costumato metodo di vivere e colla promossa traspirazione .

Dall' altra parte non si trascurino le piccole infiammazioni , le quali senza annunciarli manifestamente , si formano più spesso che non si crede nel tessuto adiposo delle viscere , e che sono il principio degli ascessi problematici , che non si conoscono perfettamente , se non quando hanno acquistato lentamente un volume considerevole , e tante volte allora , quando la materia si manifesta sotto il tegumento , e che annuncia la formazione d' un ascesso fistoloso .

Dopo aver parlato delle infiammazioni in generale , e dei varj loro esiti , si parlerà in particolare delle principali infiammazioni esterne ed interne , conosciute sotto il nome di febbri acute infiammatorie .

### *Risipola (u) .*

La risipola è una infiammazione superficiale , che nel cominciamento dell' eruzione , la rossezza sparisce , quando vi si fa scorrere sopra il dito , e

---

(u) *Erysipelas* dai Greci , e dai Latini : *Il Tr.*

ritorna al momento che si cessa di premerla . La faccia, il collo, le braccia, e le gambe sono le parti esterne le più soggette a codesto male.

La risipola differisce ancora dalle altre infiammazioni , in ciò che il brivido e la febbre diminuiscono a misura, ch' ella si esterna . I malati non provano che leggerissima pulsazione alla parte inferma, ma invece risentono ardore, ed alcun tempo dopo, un incomodissimo prurito.

La risipola scorre da un luogo all' altro ; sup-  
pura di rado, e si dissipa appoco appoco mediante piccole scaglie farinose, le quali nascono sulla parte malata, dove formansi piccole bolle piene di un' acre sierosità.

Queste degenerano qualche volta in ulcere superficiali, ma ostinate; altre volte in escare, che si anneriscono, che diventano molto coriacee, e non si staccano che al fine di alcune settimane, quantunque si faccia di tutto, perchè cadano presto.

Quando la risipola sparisce subitamente, l' umore risipelatoso si getta sulle parti interne, con raddoppiamento della febbre, e dei sintomi, che variano secondo la natura e la funzione della parte affalita. La risipola esterna degenera anche in flemmone, od in un edema risipelatoso, che diviene una malattia cronica.

La risipola proviene principalmente da un' acrimonia biliosa sparfa nella massa degli umori . Le persone che vi sono soggette, hanno la bile così esaltata, che una viva affezione dell' animo basta per accenderle, ed agitar loro il sangue; se in questo tempo, la traspirazione s' interrompe, nasce la risipola (x) .

---

(x) E' verissimo, che la causa più ordinaria, che produce la ri-



Se la malattia è leggiere , basta che il malato stii in un' aria temperata per mantenere aperta la traspirazione , bevendo a questo effetto alcune tazze d' infusione di fiori di sambuco ; ed affine di afforbire le sierosità acri , che si esalano , applicherassi sulla parte affetta un foglio di carta sugante , imbianchita , o polverata con creta bianca , o con farina fine e secca .

Se per lo contrario la febbre , che precede la risipola , è stata considerevole ; che sussista dopo l'e-

risipola , è la soppressa traspirazione , quindi vi soggiacciono più facilmente quelli che traspirano moltissimo , e che intempestivamente si raffreddano : la cagione interna è un siero acre , il quale per qualunque siasi cagione , trasportato alla cute , la irrita , e produce la risipola più o meno lunga a proporzione della quantità dell' umore cattivo predominante : *serum illud acre* , dice LORRY ( *doctrina de morb. cutaneis* ) *nunquam magis eminet , quam ubi incerta est perspiratio , nec illa magis incerta , quam cum alimentorum concoctio ex acerbis consistans particulis , peccat tamen inertia . Unde erysipelata maxime epidemica iis sunt nationibus , quæ victu acris incoctili utuntur , cæpis , aliis , pisciumque variis generibus , notante apud Indos BONTIO , apud Ægyptios Prospero ALPINO , si præsertim externæ , & accidentalis erysipelatis causæ concurrerint , quæ a variis ordinibus rerum repetuntur .*

La risipola appare sotto vario aspetto , ond' è stata divisa in varie specie : chiamasi risipola flemmonosa , ossia infiammatoria , quando il tumore cutaneo è molto rilevato , rosso , duro , dolente , con febbre violenta : edematosa , quand' esso è molle , pallido , poco dolente , e con poca febbre : scirroso , se il tumore è molto duro , e profondo , ciò che per lo più avviene o per negligenza dell' ammalato , o per mala cura :

E' questa una malattia , che predomina maggiormente in primavera ; e la faccia è la parte più famigliarmente investita : se la risipola è accompagnata da serpeggiante esulcerazione della parte , è ciò che CELSO chiamava *fuoco sacro* : è pure nominata da taluno , *zona* , o *zoster* , *fuoco di S. Antonio* , *isacco* , *rosa* , ec. Il fuoco di S. Antonio , o fuoco sacro , o mal degli ardenti fu nel 1130. sotto LUIGI VII. una malattia epidemica in Lorena : i malati gridavano di notte di dolori incessantemente , e gettavano alte strida nella pubbliche piazze , e nei tempj : questo male pestifero corrodeva i piedi , le mani , non che la faccia . SAUVAGES non sa decidere , se questa malattia si debba riferire alla risipola od all' antrace . CULLEN suppone che il *fuoco di S. Antonio* , e la risipola di SAUVAGES non siano che febbri accompagnate da un eritema sintomatico : La risipola , non è comunemente parlando , contagiosa ; ma ella può divenir tale da una materia acre esternamente applicata , come dice il già nominato CULLEN : *Il Tr.*

ruzione; o che il malato sia *pletorico*, si comincia dal salasso, da replicarsi, se la risipola è alla testa, e rimarchevole. Il malato stia a letto, affine di mantenere una traspirazione dolce e continuata, prendendo la mistura diaforetica N.º 125., e replicate tazze della nominata infusione: i cibi siano polti d'avena, brodi d'orzo, erbaggi raddolcenti, e frutti cotti. Si rimedia alla costipazione coi lavativi domestici N.º 108; e rispetto ai rimedj esterni, frattanto che la risipola è di un rosso vivo, e senza bolle, vi si applica una carta sugante, inzuppata nella infusione tiepida di fiori di sambuco, unita a parte eguale di spirito di vino canforato, da cambiarsi mattina e sera. Nell'intervallo s'inumidisce assiduamente la carta con una spugna inzuppata nel medesimo liquore; e se l'ardore ed il dolore fossero considerevolissimi, si mette sulla carta, fra due pannolini, il cataplasma ammolliente, fino a che gli accidenti sian mitigati.

Nascendo bolle, o gonfiore edematoso, si desiste dall'uso di questi topici, e si asperge la risipola, due o tre volte al giorno, colla polvere N.º 179., soprapponendovi un sacchetto molle e caldo, pieno di fiori di sambuco, sottilmente polverati, ed uniti a qualche po' di canfora, da continuarsi, fino a che l'infiammazione sia intieramente dissipata, e le bolle appassite e secche.

Nel caso che la rossezza fosse fosca, o che volgesse al turchino, invece dei rimedj secchi, convengono, esternamente i fomenti fatti colla mistura tiepida di sei parti d'infusione di fiori di sambuco con una parte di acquavita canforata, applicati con pannolino molle, piegato in quattro; e per mantenerne l'umidità ed il tepore, si spruzzino colla medesima mistura, senza togliere, o cangiare la compressa più di due volte in ventiquattr'ore.

Quando

Quando la risipola degenera in flemmone , si curerà il malato nel modo descritto al seguente articolo , e si difenderanno i contorni coll' impiastro di minio rosso , ed esteso sottilmente .

Se la risipola rientra subitamente , si salassano i malati pletorici ( $\gamma$ ) , e si pongono in un piediluvio d'acqua crusca un po' più calda che tiepida , dando al sortire da questo bagno , la mistura diaforetica N.° 125. , soprabbevendo sopra ciascuna presa un pajo di tazze d'infusione di fiori di sambuco .

Con questi mezzi , se non si arrivasse a fare fuori uscire l'umore risipelatoso , si applica alla pianta dei piedi il senapismo N.° 16. , e negli accidenti considerevoli , i vescicanti alle gambe .

I convalescenti si purgheranno due volte , qualunque sia stata la risipola , colla pozione minorativa N.° 178.

La risipola essendo un' infiammazione prodotta da acri umori , il salasso non conviene , se non quando la violenza della febbre , ed i sintomi accessorj lo esigessero , per facilitare la circolazione e la traspirazione nelle persone pletoriche .

Tom. I.

S

---

( $\gamma$ ) Quando la faccia è presa dalla risipola , dice BOSQUILLON , l' eruditissimo commentatore di CULLEN ( *Éléments de Médecine pratique de M. CULLEN , traduits de l'Anglois , avec des notes , par M. BOSQUILLON , ec. ec. Paris 1785. t. 2. 3.* ) , i salassi producono una vantaggiosa rivulsione : i dubbj suscitati su questo proposito , non hanno fondamento alcuno : a torto si è immaginato , che la febbre sia necessaria per facilitare l'eruzione , e che questa cessar debba contemporaneamente alla febbre ; imperocchè la febbre dura a proporzione che la eruzione è forte , ed ella non è che una conseguenza . Devesi dunque sempre salassare nella risipola , come nelle altre infiammazioni , e replicarla a ragguaglio della violenza della febbre . Nulla dippiù pernicioso in medicina , che di considerare la febbre , come necessaria per provocare l'eruzione : questa falsa idea ha fatto dubitare dei vantaggi del salasso , ed ha introdotto il detestabile costume dei caldi aromatici , e dei cordiali stimolanti . Se i salassi non bastano , si ricorre ai vescicanti , come nelle altre infiammazioni , specialmente se la testa fortemente è incomodata . *Il Tr.*



Le rossezze risipelatose, che sopraggiungono all' edema, essendo l' effetto di un grande rilasciamento dei vasi, sono ostinate. Elleno si dissipano nel medesimo tempo dell' edema, il quale cede spesso all' uso dei bagni naturali ferrugini, all' uso continuato dei fomenti di acqua di calce mischiata con un terzo dell' acqua vegeto-minerale del Goulard canforata, ed ancora all' applicazione lungo tempo seguitata delle foglie di lapazio (z).

Le risipole che sopraggiungono alla carie delle ossa, negl' idropici, con scalfiture sulla pelle, sono cattivissime. Si polverizza spesso la parte affetta colla polvere contro la risipola sopra nominata, e si cuopre la circonferenza con impiastro di minio rosso, affine d' impedirne i progressi; e se lo stato della pelle permette d' inumidirla, si fomenterà la risipola coll' acqua di Goulard canforata.

Gli scorbutici soggetti alle risipole preverranno le recidive coi rimedj raccomandati per correggere le acrimonie scorbutiche. Quelli non affetti dallo scorbutico, usino per il medesimo effetto i salassi negli equinozj; purgandosi di tempo in tempo colla pozione lassativa N. 166.; in primavera ed in au-

(z) SCULTETO loda moltissimo una composizione di ranno, fatta con cencri di vite e non forte, libbre una: nitro, dramme una e mezza: sal comune, dramme una: aceto, libbre una.

Sogliono alcuni, nelle risipole in generale, spolverizzare la parte, colla creta, colla indicazione di risolvere, e di assorbire l' umido contenuto: la creta a dir vero, non è rimedio inopportuno in questi casi; ma comechè s' inumidisce facilmente, indura la pelle, e non può staccarsi senza dolore, ed irritazione; sono perciò preferibili le farine, le quali, come avverte benissimo il nominato BOSQUILLON, deggiono essere assai grossolane, perchè meno facili a riunirsi sotto forma concreta: in Inghilterra, dice lo stesso autore, si è messo in uso con profitto le foglie di cavolo, le quali favoriscono la traspirazione, moderano l' infiammazione, e facilitano la cura senza disporre la risipola ad estendersi: fra noi è usitata con eguale vantaggio la seconda scorza di sambuco. *Il Tr.*

tunno prendino il siero di latte, od i brodi N.º 14., stando al regolamento della lettera D.; e se queste precauzioni non li guerentissero dalla recidiva, deggiono appigliarsi ai rimedj raccomandati per correggere l'acrimonia della linfa non accompagnata da confiderevole condensamento.

*Flemmone .*

Il flemmone è un' infiammazione , che nasce esternamente, e differisce dalla risipola, in ciò che l' infiammazione è meno larga, più profonda, interessante più o meno le parti adipose, e che non impallidisce al tatto . Il tumore del flemmone è di un rosso fosco, e più o meno duro e voluminoso ; ordinariamente s' ingrossa come un uovo di pollo, e più ancora. Il malato prova un senso di pulsazione alla parte affetta, ed ha la febbre, durante tutto il tempo dell' infiammazione .

Le conseguenze del flemmone sono le medesime che quelle state esposte all' articolo delle infiammazioni in generale .

Nei primi giorni della malattia, si deve usare tutto ciò, che è stato raccomandato per la risoluzione delle infiammazioni esterne in generale (aa) . Se ciò non avviene, si facilita nel quarto giorno la suppurazione coi rimedj indicati all' articolo del ter-

S 2

(aa) La risoluzione de' flemmoni, dice il chiarissimo Chirurgo di CÉSARE, Sig. BRAMBILLA, nel suo completo trattato *del flemmone*, è o benigna, o metastica: la risoluzione benigna è quella, in cui gli umori stagnati, che formano il tumore, si sciolgano, e si rimettano nel loro circolo, come era prima, lasciando i vasi, e la parte lesa affatto libera in tutte le sue azioni naturali, senz'aggravare il corpo di ninno altro incomodo: la risoluzione metastica diceasi quella, in cui la materia che forma il tumore, si dissipa, ma va a fissarsi in un' altra parte. *Il Tr.*

mine delle infiammazioni esterne in ascesso, dove sono pure espresse le medicazioni da eseguirsi.

Il flemmone quando è ben curato, di rado si cangrena, o s'inscirisce (bb); ma se l'uno o l'altro di questi casi avviene, vi si rimedia secondo il già detto parlando delle infiammazioni in generale.

Si deve sollecitare la risoluzione, quando il flemmone invade parti, dove convenga evitarne la cicatrice: per le ragioni contrarie si preferirà la suppurazione, soprattutto se il flemmone abbraccia corpi glandolosi. In quest'ultimo caso si differisce di aprire l'ascesso, fino a che tutto il tumore non sia fuso a dovere.

Al contrario se il flemmone non esiste che nelle parti adipose, si apre l'ascesso, dacche vi è fluttuazione: si avrà cura in tutte le medicazioni, di bene evacuare il pus, e d'impedire colla situazione dell'ammalato, e colla disposizione delle compresse, che la marcia si diffonda nelle parti adipose sane (cc),

### Panno (dd).

Il panno differisce dal flemmone, in ciò che il tumore è meno considerevole, e meno infiammato al diffuori; ma egli è nel medesimo tempo più re-

(bb) EISTERO a questo proposito disse: *Præterea inflammatio in gangrænam & sfacelum abire solet, quando male curatur, calidissimis remediis, & aqua attenuantia mature non adhibentur, & venæ sectio negligitur: (inslit. Chirurg. P. I. p. 268. 270.) Il. Tr.*

(cc) Nel flemmone, od altro tumore critico, o metastico, non si deve sforzare la risoluzione, altrimenti la materia peccante, che la natura ha cacciata nella superficie del corpo, potrebbe rientrarvi di nuovo, ed aggravarlo; anzi conviene animare questi tumori co' medicamenti suppuranti, e stimolanti, per richiamare, se fosse possibile, tutta la materia peccante a raccogliersi nel luogo destinato: BRAMBILLA, l. c. *Il Tr.*

(dd) Si chiama anche fighetto dal volgo, e figetto dai chirurghi, *pannus* dai Latini. *Il Tr.*



nitente e più doloroso . Invade principalmente le parti molto glandolose , siccome le mammelle , il di sotto del mento , i dintorni del collo , ec. La risoluzione è pure molto difficile , e sovente finisce in un lento ascesso o degenera in scirro .

Si usi tutto ciò , che abbiamo consigliato per la risoluzione delle infiammazioni esterne in generale , e si replichi il salasso nei primi tre giorni della malattia ogni 24. ore . Se dopo questo termine l' infiammazione non è sensibilmente diminuita , si promova la suppurazione , che allora è inevitabile . A quest' effetto si applica fra il giorno , sul tumore il cataplasma ammolliente N.º 15. , e nella notte l' impiastro diacquilonne colle gomme : ammolito il tumore , per facilitare la suppurazione , si sostituisce al cataplasma ammolliente , il maturativo animato N.º 18.

Non si apre l' ascesso , se non quando la durezza è intieramente fusa , od almeno nella maggior parte ; in seguito , rispetto alla medicazione , se avviene , che il tumore degenera , si regola secondo gl' insegnamenti dati all' articolo delle infiammazioni in generale . Si mantiene la suppurazione , sino a che tutte le durezza sieno intieramente fuse ; e se l' ascesso si fosse rimarginato innanzi tempo , si insiste coll' impiastro di cicuta per disciogliere le durezza rimaste ; si purga ogni otto giorni colle pillole di calomelano N.º 155. , e negl' intervalli , sino a perfetta guarigione , si danno le pillole N.º 151. , beendo molto decotto N.º 25. , e stando al regolamento delle lettere B. e G.

## Panereccio (ee).

Il panereccio è un' infiammazione, la quale ordinariamente comincia all' intorno e sotto la radice dell' unghia. Egli è dolorosissimo; le più volte cade in ascesso, e l' ascesso ch' egli forma, si approfondisce tanto, che l' unghia cade (ff): Dacchè il do-

(ee) Dai Toscani nominato anche pateruccio, e paterucciolo: dai Latini *panaritium*: dai Greci *paronychia*: dai Francesi *panaris*, o *mal d' aventure*. Il Tr.

(ff) Le cagioni del panereccio sono esterne, ed interne; una puntura, una piccola scheggia entrata fra' l dito, una contusione, una scottatura, uno stramento forzoso di una pipita (*pivida*) sono le cagioni esterne: le interne sono il veleno venereo; lo scrofoloso, il canceroso, ec. ASTRUC (*traité des tumeurs, & des ulcères*) dice, che il panereccio non nasce che nelle persone operose, esposte a pugnarsi, o schiacciarsi le dita, ec. di modo che la cagione è sempre esterna: ciò però non è sempre vero. Molte divisioni si sono fatte di questa malattia: chi ne assegna due specie, distinguendolo cioè in vero, e falso: il primo è quando nasce alla radice dell' ugha; l' altro viene fra la polpa del dito, e l' ugha medesima: altri ne costituiscono quattro specie: la prima ha la sua sede sotto dell' ugha, e si dice *panereccio sottonghiale*: la seconda nella cellulosa sotto la cute, ed è chiamato *cutaneo*: la terza nei ligamenti articolari, nei tendini, e nelle comuni vagine delle dita, nominato *tendineo*: la quarta finalmente, se risiede fra il periostio, e l' osso, si dice *periosteale*: NESSI: *instit. di Chir.* Se si dovesse stare esattamente all' etimologia del nome, non si dovrebbero chiamare panerecci, se non que' tumori flemmonosi, che vengono alla radice, o a' lati delle ugne: *confuse*, dice CAMPER (*demonstrat. anatom. pathol.*) *rescentiores id vitium tractant, dividentes in plures species, morbum qui natura sua simplicissimus est*: CELSO, ed AEZIO non parlarono che del solo panereccio nato sotto l' unghia; BOERHAAVE invece ne formò sette specie; e de HAEN dieci. Comunque la cosa sia, la divisione da noi annunciata, colla scorta del valente Sig. Professore NESSI è quella più comunemente accettata, e che ci somministra più chiara indicazione.

Tutt' i panerici deggiono curarsi come malattie infiammatorie: quelli dell' ugha, ed il cutaneo puonno essere curati dappprincipio, come propone HERRENSCHWAND, colla immersione nell' acqua bollente. Il metodo però più sicuro è quello, come saggiamente ci addottrina l' illustre professore di Pavia Sig. NESSI, dei rimedj anodini, molliativi, e risolutivi in forma di vapore, di fomento, di cataplasma, di bagno: gli ammollienti, dice ILDANO si deggiono continuare, fino a che il tumore sia ammolito; non però fino a che sia fatta la sup-

lore alla cima del dito, come anche la sua rossazza, annunciano il panereccio, s'immerge il dito nell'

S 4

purazione: allora si taglia la cute nel luogo più rilevato, appoco appoco, e si vedranno apparire alcune rosse macchiette, dalle quali genererà una materia rossigna: evacuata questa, che suole essere in pochissima quantità, ed appena qualche goccia, si applicano sopra il taglio, compresse imbevute nello spirito di vino con entro disciolta poca tritica: così si previene la suppurazione, e si tronca il corso alla malattia, altrimenti lunga e dolorosa. *Guido di CAULIACO*, e *Giovanni di VIGO* riguardavano il panereccio, come male mortale; e questi disse che non conosceva più pronto rimedio, che di aprire il dito prontamente, innanzi la perfetta maturazione dell'ascesso. *Ambrogio PAREA* s'appplaudisce di avere seguito un cotal metodo. Se il chirurgo tardi chiamato, veggia essere già incamminata la suppurazione, converrà favorirla cogli ammollienti; quindi aparendo segni della raccolta materia, aprire il piccolo tumore nella sua parte più prominente, ovvero dilatarne l'apertura nel caso, che la natura ne avesse procurata una piccola, avvertendo francamente l'ammalato, se vi si opponesse, che in seguito l'osso, ivi assai tenero, e spugnoso, si carierà. Nel panereccio tendineo, oltre i rimedj generali, si apre con un taglio longitudinale penetrante fino nella guaina del tendine, quel tumoretto che si scorge alla punta del dito, da dove escirà una materia giallognola, o rossiccia, d'indole linfatica, con istantaneo sollievo: dappoi si tagliano in croce le labbra della ferita; e si lascia grondare il sangue, fino a che si sofferma da se medesimo: la ferita si medica colle fila ascinte; ed il dito, e tutta la mano con un cataplasma ammolliente, da continuarsi fino a che la suppurazione è stabilita: in seguito, si applicano lo spirito di trementina sul tendine, e i digestivi sull'ulcera. In quest'affezione il dito perde la flessione, il quale accidente è una conseguenza del male, e non già un errore della operazione, o dell'operatore. **NESSI**: non puoll però generalmente definire la estensione del taglio; poichè, sebbene spesso basti estenderlo alla prima articolazione, accade molte volte di dover tagliare fino alla radice del dito, fino a tutto il corpo, anzi di penetrare fin oltre alla pinguedine che è tra'l muscolo pronatore quadrato, ed i flessori delle dita: in quest'ultimo caso, quando il taglio è giunto fino al legamento anulare del carpo, si dovrà passarvi sotto una sonda, facendo pregare la mano, perchè meno tese rimangano le parti, e spinta questa oltre il medesimo ligamento, rialzarne la punta, sopra la quale si taglierà cautamente, lasciando intatto il legamento medesimo, e si penetrerà fino al centro del tumore, dal quale esce alcune volte molta quantità di materia: il taglio dovrà approfondarsi frai tendini, che ivi sono molti, senza offenderne alcuno, per non toglierne la mobilità delle dita, o cagionare altri sintomi: aperto l'ascesso nell'avambraccio, si dovrà passare un setone per la medesima via, che fece la sonda, e mantenervelo per espurgare il fondo occulto, ed impedire il ristagno di materia purulenta. Che se la somma tensione delle



acqua tiepida, la quale, per la giunta successiva d'acqua bollente sia resa così calda, quanto l'ammalato può sopportare, lasciando per un'ora il dito immerso; e se si sente sollevato, si resista, sino a che il dolore e la roffezza sieno intieramente dissipati. In difetto, si serve del cataplasmo ammollente N.º 15., ed ancora, se la suppurazione non s'avanza, quello maturativo N.º 17.

Formato l'ascesso, e la pelle fatta bianca in

parti non permettesse di penetrare colla sonda sotto il legamento, farà necessario finire il primo taglio, dove il medesimo comincia; quindi al di sopra di esso fare un taglio nei soli integumenti fra'l margine interno del raggio, e l'esterno dei muscoli, dopo il quale si cerca coll'indice l'ascesso, e ad esso si penetra senza offendere alcun tendine, o muscolo; nè si può allora introdurre il setone, se non dopo che la tensione per la evacuata marcia sarà finita. Non è però, che cedano sempre i sintomi al suddetto metodo di cura; anzi malgrado tutt'i tagli, e tutte le diligenze essi seguitano qualche volta, e s'inaspriscono, nel qual caso non vi è altro migliore ripiego, che di tagliare totalmente per traverso il tendine offeso sopra il legamento annullare vicino alla sua parte muscolosa; e se lo strangolamento fosse evidente, e forte nel legamento del carpo, si dovrà anche questo spaccare, mantenendo allora costantemente piegata ed immobile la mano per facilitarne la riunione, e perchè non si disordinino i sottoposti tendini, se in questi diversi tagli nascesse qualche emorragia, si preferirà l'allacciatura del vaso all'applicazione degli astringenti, e delle compressioni in parti già altronde irritate: finalmente se anche in altre parti superiori dell'avambraccio si facessero degli ascessi, si dovranno aprire, giunti alla loro maturità, e trattarli come gli altri ascessi.

Tali sono gl'insegnamenti dell'impareggiabile mio Maestro Sig. Don *Pietro MOSCATI*, nelle istituzioni di Chirurgia MM. e del cel. *BERTRANDI*, sulla scorta di *GARENGEOT*.

Il cel. Chirurgo francese *PETIT*, dice, che se i sintomi del panareccio si rilevano, per essere prodotti dal tendine offeso, è bene di staccarlo dalla sua attaccatura alla falange, tirarlo in seguito di sotto del legamento annullare, e tagliarlo nel suo corpo carnosio.

Rispetto a' rimedj proposti da varj Autori, sono, per esempio l'unzione d'olio tiepido, *RHAUS*: il bianco dell'uovo coll'olio violato, *CHALMETEUS*: il fomento o l'immersione nell'acqua calda, *Fabric. ab AQUAPENDENTE*: il dito cacciato nell'orecchio del gatto, *RIVERIUS*: la mandragora, *PARACELSUS*: le foglie di sambuco e di ebbio, *LONICERUS*: il sugo di cicuta. *PLATERUS*: la radice di brionia cotta nell'olio, *DIOSCORIDES*: i fomenti collo spirito di minderero, e d'olio di mandorle dolci, *SAGAR*, ss. Vedi *FOCKE*, de panaritio. *GOETT*. 1786. II. Tr.

tutta l'estensione dell' ascesso, si apre nella sua base: si preme dolcemente la materia, e s'infonde per un quarto d'ora, il dito nell'infusione di salvia fatta col vin bianco, applicando in seguito l'impiaastro di Norimberga, da cangiarfi mattina e sera, sino alla guarigione. Se i primi dolori sono stati profondi, avvi luogo a credere, che la membrana, la quale cuopre immediatamente l'osso, ne sia infiammata, nel qual caso la materia esce fosca e fetida; e siccome allora è cariato l'osso, si manda per un abile chirurgo.

### *Fima (gg).*

Il fima è un piccolo flemmone, il quale si forma nelle parti adipose; il più delle volte alle natiche e dintorno al retto, senza molta esteriore rossezza. Ei si forma prontamente, e presto ancora matura: è più proprio dei fanciulli che degli adulti.

Il fima si risolve di raro. Si riduce in ascesso, eoi rimedj raccomandati a questo fine per la cura del flemmone. S'egli invade i dintorni dell'intestino retto, affine di prevenire, che il pus non si diffonda nelle parti adipose, si apre l'ascesso, tosto che si risente la fluttuazione; ciò è che si fa, quand'anche la pelle non sia infiammata; si avverta di medicare in modo, che le materie possano colare, affine di evitare la fistola.

---

(gg) Il fima è parola greca (*phyma*) che significa un tubercolo qualunque nato da se senza veruna esterna cagione: differisce dal furuncolo, col quale volgarmente si suole confondere, perchè è più rotondo, e più piano, nè ha niente in se di conglobato, come il furuncolo, LORRY, *de morb. cutan.*; ciò che si conforma a quanto lasciò scritto su questo proposito CELSO, che il fima è un tubercolo particolare *furunculo simile, sed rotundius, & planius, saepe etiam majus*, ec. lib. 5. cap. 28. *Il Tr.*

*Furoncolo o ciccione.*

I furuncoli cominciano a formarsi nella pelle, daddove s'infossano nel tessuto adiposo. Essi invadono tutte le parti esterne del corpo, molto adipose, il più spesso le natiche. S'ingrossano appoco appoco, e non eccedono non pertanto il volume di un uovo di piccione. A misura che il tumore cresce, viene molto rosso e dolente. I furuncoli sono di rado soli, ne nascono molti in una volta o successivamente, i quali per l'ordinario non finiscono che con una lenta suppurazione, la quale getta dapprincipio un pus tenace sanguinolento, e sul fine una materia molto fitta chiamata germoglio (*bb*).

Si dissipano tante volte i furuncoli, applicandovi dapprincipio, del mele unito con una dodicesima parte circa di spirito di vitriuolo da rinnovarsi tre volte in 24. ore. Se il furuncolo invade una parte, dove non importa evitarne la cicatrice, si preferisce la suppurazione.

Il furuncolo matura da se medesimo in nove o dieci giorni; e per accelerarne la maturità, vi si applica una pasta fatta con mele e farina di seme di lino, o l'impiaastro diaquilonne colle gomme: aperto, si fanno colare le materie, e si medica coll'unguento digestivo N.º 135., soprapponendovi il suddetto impiaastro fino a perfetta guarigione.

Nel caso che più ciccioni appajano in una volta o successivamente, i pletorici si salassano; e per prevenirne la recidiva, le persone soggette ai furuncoli si purgano per un mese, ogni otto giorni colle pil-

---

(*bb*) E' una specie di fiocco, chiamato da CELSO *ventriculus furunculi*, e dai chirurghi, ventre del furuncolo. *Il Tr.*



Iole N.° 155., osservando i regolamenti prescritti sotto le lettere B. o G.; la bevanda, nei giorni d'intervallo delle purghe, sia, una libbra della tisana, fatta con un' oncia della radice di scrofolaria e due dramme di liquirizia per ogni tre libbre d'acqua cotta a riduzione di due libbre e mezzo, presa mattina e sera: la radice di scrofolaria ha la virtù specifica di correggere il sangue in codesti casi.

*Tereminto (ii).*

Il tereminto è un piccolo fignolo con pustola nera nel centro. Comincia a suppurare sotto la pustola, che si converte in crosta. Questa specie di furuncolo nasce più facilmente nelle natiche, e non ha germoglio.

Si cura il tereminto come il fima.

*Carbonchio .*

Il carbonchio (*kk*), chiamato ancora antrace in tempo di peste, è un tumore duro, secco, raccolto,

(ii) Si vuole derivato questo nome dal frutto della terebintina, o terebinto, che s'assomiglia alla figura di questo tumore; e secondo GALENO dalla somiglianza che ha coi ceci, chiamati in greco *thermintoi*, o *thermintoi*: GALENUS: comm. 4. in lib. 6. Epidem. II Fr.

(*kk*) Carboncello, carbone, carbonchio, antrace, bolla, enfiato pestilenziale, tignolo o cicione maligno, fuoco persico, antrace, ec.

Il carbonchio altro è benigno, altro è maligno: benigno si chiama, quando senza treno di gravi sintomi appare sotto forma di un vero flemmone: maligno, quand'è l'effetto di una febbre maligna, putrida, e per morficatura d'animali velenosi, per l'applicazione estrema di qualche veleno, ec. nel qual caso, oltre i sintomi nominati da HERRENSCHWAND, l'ammalato soffre nausea, vomito, veglia, affanno di respiro, sincope, sete ardente, spoffatezza estrema, freddi sudori; Il carbonchio così detto pestilenziale è quello, che nasce in tempo della peste.

Tralle cagioni remote del carbonchio maligno sono l'eccessivo

dolorosissimo, ardente come il fuoco, e che non suppure. Il centro è coperto da una crosta nera,

---

calore atmosferico, gli alimenti acri, salati, o putridi, la bile feruida, la cattiva nutrizione, principalmente dopo aver mangiato carne d'animali morti di putrida e contagiosa malattia.

Nella cura del carbonchio benigno, convengono internamente i rimedj prescritti per il flemmone: esternamente s'impiegano i molli suppuranti, gli anodini, o gl'irritanti, giusta le diverse circostanze.

Nell'antrace, bisogna guardarsi dall'uso del salasso, perchè con esso succede improvvisa prostrazione di forze, e retrocessione dell'umore contenuto nel tumore: oltre il metodo interno giudiziosamente prescritto da HERRENSCHWAND, se il tumore è circoscritto, vuole il cel. Sig. MOSCATI, che si scarifichi quella parte, che mostra indizj di gangrena, e si lavi in seguito con acqua e aceto, o spirito di vino allungato coll'acqua, o con acqua di calce, fino a che il sangue resta dal colare: allora si cauterizza la parte scarificata, preferendo il caustico attuale ai varj potenziali proposti da molti scrittori; imperocchè agisce più prestamente in quella quantità che si stima necessaria, e niente può trasmettere al sangue: con esso l'escara cancerosa, che sono fetide, mucose, e molli, meglio si effacciano, e si terminano, e perchè sono fatte da una sostanza morta, non danno segno di senso, finchè l'ustione non è penetrata alla parte viva, BERTRANDI: la profondità dell'abbruciamento sarà determinata dal senso di dolore, il quale quando comincia ad esser forte, indica essere tutta dal fuoco penetrata la parte mortificata; quindi doverli sospendere: all'escara si soprappone l'unguento digestivo molle unito alla triaca fatto per esempio, con butirro, once una e mezzo: unguento basilico, dramme sei: mele, ed unguento degli Apostoli ana, once una e mezzo, ed un tuorlo d'uovo, il tutto mescolato insieme: sopra le faldelle spalmate di unguento, che debbono cuoprire la sola escara, si applicheranno cataplasmi risolvendi ed anti-fetici fatti per esempio con midolla di pane ed ossicato: se l'escara sarà dura, profonda, così che si separi molto lentamente, se ne favorirà la suppurazione col dividerla in pezzi, avvertendo di non essere troppo solleciti, nello staccarne le porzioni vicine, ed aderenti alle parti sane; poichè quando sarà venuto il tempo opportuno per questa separazione, si conoscerà dal vedere una linea bianchiccia, che circoferisce il tumore, e divide le parti mortificate dalle sane: caduta che sarà l'escara, rimane alcune volte il fondo dello scoperto tumore, sordido, bavoso; nel qual caso si astergerà, applicandovi unguento egiziaco, o digestivo comune animato con alume polverizzato, e polvere d'aristolochia; nè mai si useranno i corrosivi, per non eccitare nuovamente in una parte tanto stimolata per l'addietro, una nuova infiammazione. Rimane però, anche dopo aver deterso il fondo, una durezza più o meno grande, tutta intorno al tumore, ed allora convengono i digestivi più efficaci, e sopra di essi, cerotti mucilagginosi ed ammollienti, che cuoprono tutta l'alterata circonferenza, perfino a che si sieno dissipate le durezza, e l'ulcere condotta a cicatrice, la quale suole d'ordinaria essere più deforme, che nei semplici farangeli, ed altri infiam-

e la sua sostanza è somiglievole ad un pezzo di carne abbruciata e nera . Il di sotto forma un' ulcera fordida , ed il giro è distinto da una linea rossa e da piccole pustole focose dolorosissime , rosse , e nere .

Il malato stia al regolamento H. , fino a che la febbre è viva ; nei casi contrarj prenda brodi sostanziosi . Rispetto ai rimedj ; gli si dà ogni quattr' ore un cucchiajo della mestura bezoartica N.º 121. , e bea l' infusione di scordeo in sufficiente quantità per mantenere la traspirazione . Si applica in seguito sul carbonchio , il cataplasma maturativo animato N.º 18. , unito ad un festo di triaca ; e dopo avere ammolite le carni nere ; a misura che si puonno staccarle , si medica il fondo dell' ulcera coll' unguento digestivo N.º 135. Il *Lycopsis arvensis* di Linneo, ossia il *Buglossum minus sylvestre* del *Baube*, *Pin.* 257., fresco, pesto, ed applicato sul carbonchio in guisa di cataplasma senza cangiarlo nelle prime 24. ore , produce, secondo l'esperienze fatte, nelle prime sei o sette ore, un calore infuocato e doloroso . Levando l'apparecchio , l'escara si stacca ; in difetto si rinnova il cataplasma , che in allora non fa tormentare che per due ore al più . L'escara si stacca infallibilmente nel levare questo secondo apparecchio , e l'unguento basilico in seguito deterge e mondifica l'ulcera .

---

matorj tumori . Che se il carbonchio cominciassè , malgrado le chirurgiche diligenze a retrocedere , converrà usare dei forti sudoriferi internamente , ed al di fuori applicate o per qualche tempo un fumo discretamente caldo , siccome si legge fatto con profitto presso SCULTETO ( *armamentar: chirurg.* p. 42. ) , o le coppette strappate , o'l vescicante alla parte affetta , affine di richiamarvi collo stimolo una maggior copia d'umori , e farvi crescere il tumore ; finalmente il feticcolo , ed il setone per dare sortita agli umori cattivi assorbiti . *Il Tr.*



## Epinitide.

L'epinitide è un piccolo carbonchio della grossezza di una fava, turchino o nerastro ed infiammattissimo: il dolore si raddoppia nella notte, e getta colla suppurazione materie vischiose e sanguinolente (ll).

Si tratta l'epinitide come il carbonchio, con questa sola differenza, che nel tempo dei vivi dolori, si applica una mistura di due terzi di cataplasmo emolliente e di un terzo di triaca.

*Infiammazione degli occhi chiamata chemosi (nn).*

La chemosi è accompagnata da febbre acuta e da dolori vivissimi alla parte affetta. Il bianco degli occhi si arrossa come lo scarlatto, e si gonfia al segno, che per il suo gonfiamento egli si ripiega sulla pupilla e la nasconde. I malati soffrono gravi mali di testa, pizzicori, battiti dentro ed intorno all'occhio, e non ponno sopportare il lume (nn).

Le conseguenze che si hanno a temere da queste malattie, sono l'ascesso, o lo scioglimento dell'occhio, le ulcere, le macchie, e le cicatrici sulla

(ll) La epinitide è ciò che CELSO chiamò *exulceratio mucosa*, ed i medici Greci, e principalmente ORIBASIO *epinyctis*, e gli Arabi *saire*, o *essere*, onde sono derivati presso i loro traduttori i nomi di *sera noctis*, *pust la serotina*, *nocturna*, *planta noctis*, *planctis noctis*, &c. LORRY de morb. cutan. BERTRANDI, opere anatomiche, ec. t. IV. Il Tr.

(nn) *Chemosis* VOGELII, *Tract de cogn. & cur. c. h. adf. p. 128.* chiamasi ancora dai Chirurghi *Stemmone* dell'occhio. Il Tr.

(nn) L'infiammazione delle membrane dell'occhio, dice CULLEN, ha diverse gradi secondo che la congiuntiva, o annata è più o meno affetta; che la infiammazione è limitata alla sola congiuntiva; o ch'ella si comunica alle membrane sottoposte, che sono l'albuginea, la sclerotica, la corioide, e la retina: Il Tr.

cornea trasparente ; la disposizione alla recidiva, ed ottalmie croniche .

Si usa dapprincipio , e prontamente , con tutta la possibile esattezza , tutto ciò che è indicato per la risoluzione delle infiammazioni esterne in generale . Si fa il primo salasso dal braccio , il secondo dal piede , il terzo alla vena giugulare , poi le scarificazioni e le ventose alla nuca e fralle spalle specialmente colla macchinetta inglese ; puossi ancora applicare in diverse volte molte sanguette d'intorno all'occhio ammalato (oo) ; per bevanda , si preferisca il siero di latte o l'orzata leggiera : siimenti interrottamente l'occhio con una spugna , o mediante compressa molle , inzuppata in una forte infusione di foglie e fiori di malva , continuamente mantenuta tiepida ed in modo che l'occhio non ne rimanga compresso . L'ammalato stia in una stanza fresca , tranquillo , sobrio , e sempre coricato colla testa molto alta sopra origliere di crine (pp).

(oo) Il chiarissimo Sig. BRAMBILLA si è convinto con un seguito di felici prove del vantaggio della flebotomia locale nelle infiammazioni . CULLEN dice , che le cacciate di sangue dal braccio e dal piede sono poco valevoli nelle ottalmie , e che devesi tentare la guarigione coi salassi dai vasi più prossimi alla parte infiammata ; ed il suo Commentatore BOSQUILLON soggiugne , che quattr'onze di sangue tratte dalle parti prossime all'ottalmia , giovano più che dodici once tolte da lontano : Paolo d'EGNA prescrisse sempre il salasso nelle jugulari per l'ottalmia . *Il Tr.*

(pp) Importa moltissimo , che un malato ottalmico stia in una stanza oscura : il lume inasprisce tutte le ottalmie ; giova pure l'avvertire , essere cattivo costume , che quando un occhio è viziato da ottalmia , il tenere quello difeso dal lume , con fascia , e libero l'altro ; mentre cuoprendolo , vi si promove un calore più considerevole , e una particolare irritazione : inoltre , il lume lo irrita alcun poco , perchè gli occhi operano congiuntamente .

Alcuni nelle ottalmie propongono i vescicanti alla nuca , o posteriormente alle orecchie , colla indicazione di derivare quell'umore , che mantien la malattia ; altri dissuadono questo consiglio , sostenendo anzi che con essi s'inasprisce assai più l'infiammazione . HOFFMANN, BOERHAAVE ; quindi è che da taluno si prescrivono

Due volte al giorno faccia per una mezz' ora il piediluvio di acqua-crufca tiepida , e s' ei non potefse ftare levato , fi fomentino affiduamente le gambe col fomento rinfrefcativo N.º 81. (99). Se non oftante quefte diligenze , l' infiammazione non diminufce innanzi il quarto giorno della malattia , fi fcarifica , fecondo l' arte , il bianco dell' occhio , af fine di fvuotare direttamente i vafi ingorgati , facilitando lo fcolo del fangue col vapore di acqua calda , applicando dopo quefta operazione , pannilini finiffimi inzuppati nel colirio raddolcente e rifolvante N.º 20. , pofti full' occhio fenza comprimerlo . Fatto convalefcente , fi purga diverfe volte colla pozione minorativa N.º 168. ; e fe l' infiammazione andaffe a finire in uno o più piccoli afceffi , continueraffi il colirio fuddetto , del quale fe ne fa entrare alcune gocce nell' occhio . Se l' afceffo foſſe confiderevole , in tal caſo , e nelle altre confequenze della malattia , fi ricorre ad un abile oculiſta , in cui mancanza fi conſulti e fi eſeguiſca il detto all' articolo delle malattie degli occhi .

Affine di fortificare l' occhio , conviene in ſeguito alle grandi infiammazioni , bagnarlo più volte mattina e ſera , con una miſtura di dieci parti di acqua-roſa ſopra una parte di buon' acquavita .

Più

applicati alle gambe , perchè poſſano agire , ſenza offeſa ed irritazione dell' occhio . Il celebre *de MEZA* , colla ſcorta di *PERCIVAL* uſò con deciſo profitto i veſcicanti poſti alla fronte .

Nella ottalmia oftinata valgono i ſetoni , i fonticoli , i cauterj , la perforazione delle orecchie . *Il Tr.*

(99) *BOERHAAVE* : ( *de morh. oculor.* ) dice: *HIPPOCRATIS* medicamenta erant balnea : mane igitur , & vespere per horam æger in balneum dimittendus eſt . pag. 49. e pag 53. ediz. ven. *Refrigerari debet oculus , hoc eſt foveri tepidis , ne exſicetur , & continuo humectandus eſt , & intus continuo potu diluente utendum . Il Tr.*



Più i raggi ed il lume sono insopportabili, più l'infiammazione è pericolosa. Quando la coroidè è infiammata al segno, che cade in ascesso, le materie si spandono fra la cornea, ed il cristallino; ciò che produce l'ipopio o l'onice.

La chemosi preceduta da una piccola infiammazione dolorosa, può essere prodotta da falsi cigli o da qualche altro corpo straniero, che molesta l'occhio; quindi lo si esamina attentamente nella prima visita, come anche le palpebre; e se l'occhio fosse irritato dall'una o l'altra di queste cause, vi si rimedia immediatamente, sveltendo i falsi cigli, e cavando il corpo straniero.

*Infiammazione dell' orecchio, chiamata otalgia (rr).*

L'otalgia si manifesta da vivi frizzi e da un dolore crudele nell'interno dell'orecchio; con pulsazioni alla parte infiammata, molta febbre, e molte volte ancora con rossezza e tumore dell'orecchio esterno o delle sue vicinanze. Quest'infiammazione si risolve di rado; finisce ordinariamente con un pus mischiato di sangue, che sorte dall'interno dell'orecchio, o dall'ascesso formato esternamente.

Le conseguenze che ne risultano, se l'ascesso è mal curato, sono un'ulcera di lunga durata nel condotto dell'orecchio, e che può danneggiare l'organo dell'udito, per la formazione di carni bavoze, o di materie disseccate; o chiudere il condotto dell'orecchio e produrre con ciò la sordità, od incomodi susfolamenti, e la recidiva dell'otalgia.

Si cavi immediatamente sangue dal braccio; e posteriormente all'orecchio colle mignatte; dappoi

Tom. I.

T

le ventose replicate , se abbisogna alla nuca ed alle spalle: si tenga incessantemente sull' orecchio una spugna inzuppata nell' infusione di malva , e meglio nella fomentazione N.° 82. , fatta col latte e senza sapone , oltre il metodo , le bevande , i piediluvj , ed i lavativi raccomandati per l' infiammazione degli occhi. Nella forza dei dolori , si dia ogni due ore , una presa delle gocce anodine N.° 89. ; e nel caso che i dolori durassero vivamente più di quarantott' ore , si fa colare nell' orecchio , tre o quattro volte al giorno un mezzo cucchiajo da caffè d' olio di mandorle dolci tiepido , e sostituire alla spugna , il cataplasmo ammolliente N.° 15. (ff). Questi rimedj concorrono a promuovere la risoluzione , o la suppurazione . Se ne continua l' uso fino a che lo scolo della materia dinoti la rottura dell' ascesso , che si tiene ripulito colle tiepide iniezioni dolcemente fatte mattina e sera , colla infusione di malva unita ad un ventesimo di mele rosato . S' impedisce l' accesso dell' aria nell' orecchio , otturandola con cotone inumidito in un pò d' olio di mandorle dolci ; e quando l' orecchio cessa di suppurare , per promuovere la guarigione , si fanno iniezioni d' infusione d' agrimonia , con un ventesimo di tintura di mirra . Si ottura l' orecchio con cotone inumidito di parte eguale di tintura di mirra , e d' olio di mandorle dolci , fino a che la suppurazione sia intieramente finita ; avvertendo di rinnovare il cotone di spesso , per favorire lo scolo delle materie .

Quando gli ammalati sentono vampe calorose alla testa , indica che l' infiammazione sorprende il

---

(ff) S' introduce ancora con profitto nell' orecchio estremamente dolente , un saturo decocto delle teste di papaveri , o l' sugo di bella donna o l' olio tratto dai semi di papavero bianco , o di giosquiamo . *Il Tr.*

cervello, e ne muojono il settimo giorno, ammeno che non perdano molto sangue dal naso, o non mettano molto pus dall' orecchio.

La sordità che succede alla profonda infiammazione, ed alla suppurazione dell' orecchio, è incurabile; atteso che risulta dalla distruzione di qualche parte organica. Questo esito proviene spesso dai rimedj caldi, che si sono adoperati, o dalle prove azzardate nella disperazione del dolore.

*Infiammazione delle mammelle.*

L' infiammazione delle mammelle è comune alle nutrici, ed alle puerpere. Ella è qualche volta così superficiale, che rassomiglia molto alla risipola; o è profonda, ma eguale e senza nodi o durezza, cioè risiede solamente nelle membrane adipose, ed ha molto rapporto col flemmone. Il più spesso però le glandole sono comprese nella parte infiammata; ed in questo caso il tumore è ineguale; vi si distinguono i nodi e le durezza, e tale specie d' infiammazione è comunemente lenta, lunga ed ostinata; la risoluzione è difficile, ed ordinariamente termina colla suppurazione, la quale è del pari tarda e lunga; il pus facendosi strada con piccoli pertugi, che rassembrano fistolosi: in mancanza di questa evacuazione della materia stagnante, il tumore degenera in scirro.

Si tratta la prima specie d' infiammazione alle mammelle, nel medesimo modo che la risipola; se al contrario fosse profonda senza nodi nè durezza, si cura come il flemmone, preferendo solamente al cataplasma mollitivo, quello di riso cotto con metà latte e metà acqua alla consistenza di pappa, d' applicarsi immediatamente sulla pelle. Quando la risoluzione è molto avanzata, l' impiastro di bianco di balena basterà per terminarla.



Nell' ultimo caso si usa il metodo indicato all' articolo del pano con preferenza al cataplasma di riso. In tutte queste infiammazioni, le nutrici avvertiscano di farsi estrarre il latte, il cui rattenimento cagionerebbe maggiore ingorgamento, e renderebbe inefficaci i rimedj.

Non conviene, nell' infiammazione delle glandole delle mammelle insistere a promuovere la risoluzione; anzi è bene sollecitare la suppurazione, atteso che queste glandole sono disposte a inscirrire, e degenerare in carcinoma od in cancro. Le durezze delle glandole delle poppe, le quali si formano insensibilmente, senza dolore, nè infiammazione, e che sono comuni alle nutrici, dipendono dal ristagno del latte e sono ordinariamente di poca conseguenza, locche si arriva a dissiparla col mezzo dell' impiastro di bianco di balena (tt), soprapponendovi salviette cal-

(tt) L' impiastro bianco di balena, si fa con quattro once di cera bianca, due once di bianco di balena, ed un' oncia e mezzo d' olio dei quattro semi freddi. Si fanno sciogliere queste sostanze riunite a calore moderato; si agita il miscuglio fino a che siasi quasi raffreddato, e se ne formano maddaleoni.

Il bianco di balena impropriamente chiamato spermaceti, è una sostanza bianca, solida, che si cava dai ventricoli del cervello della balena chiamata da LINNEO *balæna mysticetus*, ossia grande balena o veramente dalla piccola balena nominata dallo stesso autore *phæseter macrocephalus*. (Syst. Nat. Reg. Anim. pag. 105 e 107.) Questa sostanza è insolubile nell' acqua e nello spirito di vino, infiammabile, bianca, inodora, insipida, facile ad inrancidirsi, di consistenza fongivole al fevo di caltrato: serve in medicina ad uso esterno ed interno ordinariamente per calmare la tosse, e favorire la spettorazione, dai dieci grani fino alle due dramme, incorporata con tuorlo d' uovo o con parti eguali di zucchero o di mele. Si discioglie in molte chiara d' uovo da usarsi per lavativo nelle coliche prodotte da sostanze acri, ec. BERTRANDI, nei tumori delle mammelle poco infiammati, propone il linimento di KLEIN (*selectus rational. medicaminum*. Francof. 1756. 8.) composto con butirro fresco, e sale volatile di corno di cervo. BARBEVRAC (*medicamentor. constitutio, seu formulæ*. Lugdun 1751. 12.) loda il seguente fatto con sugna di porco un' oncia e mezzo: butirro vecchio once mezzo, uniti e sciolti a lento fuoco, vi si aggiugne un' oncia di sugo di menta, e camomilla quanto basta per fare linimento da unguere le mammelle

de , od una pelle di lepre ; bevendo molta infusione di seme di finocchio ; mangiando poco , e leggiermente , e purgandosi un pajo di volte colla pozione N.º 168. , sostituendo al cremore di tartaro due dramme di arcano duplicato .

*Infiammazione dei testicoli non venerea .*

Questa malattia viene in seguito alle febbri cattarrali , ed intermittenti , quando l' ammalato non è stato sufficientemente purgato . Se i testicoli s' infiammano , quello che è viziato , si gonfia al segno di uguagliare e sorpassare il volume di un uovo di pollo . L' ammalato prova i sintomi ordinarj della infiammazione con molta febbre , dolori e frizzi vivi , i quali rimontano dal testicolo all' anguina-  
glia . Succede anche , che soltanto il centro del testicolo è infiammato ; allora il tumore è poco considerevole .

T 3

---

tre volte al dì , e tenendole coperte con panni caldi ; ovvero si prende , mele comune , ed unguento d' altea , once tre per forte : radice d' iride fiorentina polverata , once mezza ; si mescola per fare linimento .

Il già nominato valentissimo chirurgo Sig. BRAMBILLA , dice di avere trovato più semplice e più comodo , un pannolino intriso in una panata fatta di brodo di vitello , e pan bianco , ben cotti con pochissimo sale , nella stessa maniera , come se si volesse mangiare . Il pannolino dev' essere tagliato rotondo della larghezza medesima della mammella con un buco nel mezzo per lasciare l' areola libera , acciò non soffra , e per lasciare un libero scolo al latte , o linfa che potesse sortire ; basta che il pannolino sia semplice , o al più di due pezzi . Si applica caldo , ed a poco a poco si efficca , e s' incolla sulla superficie dell' e poppe , e restringendole insensibilmente obbliga il sangue a retrocedere , ed il latte ancor fluido a sortire per l' areola . Applicando quella panata il primo giorno , e gangiandola ogni dodici ore non volendo allattare il fanciullo , franisce il latte senza grave incomodo : dovraasi astenere , prosegue a dire l' esimio autore , dai medicamenti oleosi , e grassi ( o almeno non servirsene soli ) . Gl' impiastri , e cerotti gommosi rare volte fanno bene , poichè impediscono la traspirazione , e per tal mezzo si potrebbe impedire la risoluzione . *Al Tr.*

Le conseguenze di questo incomodo sono i diversi esiti riferiti all' articolo delle infiammazioni in generale; ed in particolare l' indurimento dell' epididimo, il quale rimane tumefatto.

Si toglie l' infiammazione dei testicoli, col prudente metodo indicato per la risoluzione delle infiammazioni interne in generale . Si avrà la precauzione di tenere sollevato lo scroto con un sospenforio , in cui il testicolo sarà collocato in modo di restarvi mollemente appoggiato senza impaccio, stando costantemente coricato, e tenendo sullo scroto, e sulle anguinaglie, il fomento risolvente N.º 83., o ridotto in cataplasmo, facendovi bollire, delle rape, già quasi cotte nella cenere, e piene di sugo.

Quando il testicolo non inclina all' ascesso ( gli ascessi in questa parte essendo periculosissimi ), si useranno immediatamente i mezzi raccomandati per la risoluzione, e questi ancora dopo il quarto giorno della malattia, ammeno che non vi siano indizj dell' ascesso, nel qual caso, si ricorre ad un abile chirurgo: se la malattia è prodotta da celtico veleno, si userà il raccomandato per il morbo venereo.

### *Infiammazione dell' ano, e moroidi esterne.*

Le parti adipose, che circondano lo sfintere dell' ano, lo sfintere medesimo, e le moroidi esterne, sono molto soggette ad infiammarsi, e simili casi meritano maggiore attenzione, perchè di là nasce spesso la fistola, accompagnata da febbre, e più o meno da rossezza, da frizzi, da calore, da pulsazioni, e da tumore, secondo che l' infiammazione è più o meno esterna o considerevole.

Nei primi tre giorni della malattia si usi tutto ciò, che è raccomandato per la risoluzione delle infiammazioni esterne in generale; colla differenza



che invece del lavativo, i malati beranno la tisana di cremore di tartaro N.º 24., od il siero di latte tamarindato N.º 148., in quantità sufficiente per avere sempre sciolto il ventre, e liquide dejezioni; scaricando in una seggiola da camera, con entro acqua calda: esternamente sul podice, si tengono compresse inzuppate nel colirio raddolcente e risolvente tiepido N.º 20.; e se non ostante queste diligenze, l'infiammazione si disponesse all'ascesso, si adopra immediatamente, e fino a che la suppurazione abbia cominciato, il cataplasmo ammolliente N.º 15.; poi si sostituisce, per provocare l'ascesso, quello maturativo N.º 17.

Si offervi con molta attenzione il momento della fluttuazione, per dare immediatamente sfogo alla materia, soprattutto, se l'ascesso è nelle membrane adipose dintorno allo sfintere; dappoichè col suo soggiorno, si diffonderebbe nei dintorni dell'intestino retto, e cagionerebbe la fistola.

Nel caso che l'ascesso sia profondo, si mantiene aperto secondo l'arte, fino a che col mezzo della iniezione deterfiva, e balsamica N.º 106., e con una conveniente medicazione, sia a dovere deterso, e riempito di buone carni dal fondo fino alla superficie.

Le infiammazioni che si formano nelle membrane adipose, che circondano il podice, si dissipano difficilmente, e terminano colla suppurazione. L'infiammazione dei vasi emoroidali svanisce soventi, allorchè puossi applicarvi le sanguisughe, od aprirli colla lancetta; ciò che devesi fare al più presto, dopo avere prima rimediato col salasso alla plethora generale.

## DELLE PRINCIPALI INFIAMMAZIONI INTERNE IN PARTICOLARE.

### *Frenitide vera (a).*

**S**i chiama frenitide, l'infiammazione delle membrane, che circondano il cervello: quando si forma subitamente, e senz'essere preceduta da qualche altra malattia acuta, le si dà il nome di vera frenitide, per distinguerla dalla falsa.

La vera frenitide comincia da calori, e dolori interni della testa, accompagnati da rossezza degli occhi, e della faccia, da mancanza di memoria, o d'inoportune idee, e confusi discorsi, da false sensazioni, ed inclinazioni opposte al naturale dei malati: inseguono, e rammassano cose che non esistono se non nella loro immaginazione: diventano appoco appoco feroci: contorcono la bocca; ridono, cantano e piangono successivamente; lo sguardo è minaccioso, e gli occhi sembrano loro sortire dalla testa; nascono le ostinate vigilie, i sonni interrotti, spaventati, e destansi con subitaneo terrore. Il polso è duro; il respiro profondo, e fatto in molte riprese; e stilla alcune volte dal naso qualche goccia di sangue (b).

(a) O frenesia, *phrenesis*, o *phrenitis* dai Greci, e dai Latini. *Il Tr.*

(b) Non è sempre una sola la cagione della frenitide, nè sempre uguale la sua sede: vi sono alcune frenitidi, che giustamente si possono nominare biliose, od infiammatorio-biliose, cioè a dire originarie dal basso ventre; e queste sono più comuni, che generalmente non si crede: così pure, non in ogni frenitide si trovano i segni generali della infiammazione. STOLL nelle sezioni dei cadaveri morti da frenitide, non rinvenne indizj d'infiammazione alla testa, ed avevano in vita, polsi duri, e vibranti; e viceversa: lo stesso pure confermò SCHROEDER, nel suo esimio trattato *de indole, ac sede phrenitidis, & paraphrenitidis*. Goet. 1765. A questo

Convienne salassare al più presto dal piede, ed una o due ore dopo, dalla giugulare, con larga apertura della vena, e fino a che l'ammalato impallidisca e cada in deliquio. Nell'intervallo del primo e del secondo salasso, si applica il lavativo purgante N.º 211.; ed immediatamente dopo averlo reso, si esibisce la pozione minorativa N.º 168. Finita l'operazione si ordina un semicupio d'acqua-crusca tiepida colla giunta di qualche tazza d'aceto, mantenendo il tepore di quest'acqua per tutto il tempo che vi può restare l'ammalato. Nel bagno medesimo si rade la testa, e fomentasi il cranio con salviette inzuppate in sei parti d'aceto ed una parte d'acquavita canforata (c).

L'infermo stia in una stanza appartata e fresca, colla testa molto alta. In letto, gli si fomentano

proposito merita di essere letta la diss. di WIENHOLT, *de inflammationib: viscerum hypochondriacor: occultis ec.* inserita nel vol. I. *selectus opuscul.* del cel. Sig. FRANK. Le ostinate veglie riputate cagioni della vera frenitide da BOERHAAVE, furono invece due volte causa di frenitide spuria, STOLL. Non si deve dire febbre infiammatoria, nè infiammato il cervello in tutti quelli, che sono frenetici: *vix enim febrim acutam novi*, ripete il già nominato STOLL *quam non aliquando cum delirio viderim. Quidam thorace solum inflammato, alii ventriculo & intestinis, phrenitice delirant, encephalo omnis phlogoseos experie. Encephalon inflammatum cum delirio observavi; inflammatum quoque, mente sana: Asserta mea extispiciis possum confirmare: (ratio medendi pars III. Ticini 1788. 8.).* Questo medesimo è solesanto, e confermato dal cel. CULLEN; il tutto però con valide ragioni contraddetto da WEBER, nel suo trattato *de causis, & signis morborum: lib. II. sectio posterior.* Lipsiæ 1787.

Le cause disponenti alla infiammazione del cervello sono l'età giovanile, le seppresse ordinarie emorragie, le profonde meditazioni, le vive passioni dell'animo, la rabbia, l'abuso delle cose spiritose aromatiche: le cause poi promoventi sono la ubbriachezza, un colpo violento alla testa, la insolazione, alcuni veleni, la mancanza del calore necessario delle estremità, PRINGLE. *II Tr.*

(c) Gli Inglese sogliono, dopo aver rasa la testa dei frenetici, applicarvi il ghiaccio pesto, o la neve ravvolta fra pannilini; lo che comenda pure moltissimo il precitato WEBER. PRINGLE suggerisce di applicare sulla testa molte sanguisughe. CULLEN consiglia il vescicante sulla testa. *II Tr.*



le gambe colle salviette inzuppate in parti eguali di acqua e di aceto; ed alla pianta dei piedi applicasi una fetta di vitello imbibita di forte aceto, od il cataplasmo N.º 16.: i cibi siano brodi di poltiglie d'avena nell'acqua, e condite con un pugillo di nitro in iscambio del sale; e per bevanda, ogni quarto d'ora dopo il mezzo giorno, e nella notte, una tazza delle bevande tiepide raccomandate per le infiammazioni in generale, inacidita con qualche goccia di spirito di zolfo o di vitriuolo, e di buon mattino, una sufficiente dose della tisana di cremore di tartaro N.º 211., od il siero di latte N.º 148., affine di mantenere libero e fluido il secesso, alla sera replicando, s'è possibile, il semicupio, perseverando ancora nell'uso dei rimedj esterni, per tutto il tempo del male.

Rispetto al salasso, si replica ogni dodici ore, proporzionatamente alla violenza della febbre, e sino a che i sintomi del male siano molto diminuiti. Si osservi, se si presentano bottoni emoroidali, per poterli aprire colla lancetta, o colle sanguisughe.

Indebolito l'infermo coi salassi, si sostituiscano le scarificazioni, e le ventose alla nuca, al collo e fralle spalle, le quali producono spesso più buon effetto che non il salasso, molto più se invece delle ventose si adopera la macchinetta inglese.

Non si omettono i frequenti lavativi domestici N.º 108.: se l'ammalato è disposto alle moroidi, si fomenta il podice con spugna inzuppata in una fatura decozione di malva piuttosto calda che tiepida: nel corso della malattia, prenda la mistura temperante N. 130.; e se dopo il terzo o quarto salasso i trasporti non diminuiscono, si dia l'emulsione N.º 66.; o le gocce anodine N.º 89., da replicarsi da sei in sei ore, nel caso che la prima presa avesse prodotto la calma, o che i trasporti rinascessero nuovamente.

Siccome questa malattia finisce bene coll'apari-  
re delle moroidi, del flusso emoroidale, di un' ab-  
bondante emorragia nasale, o della diarrea, uferassi  
attenzione ai sintomi indicanti queste crisi, cercando  
di far gemere le moroidi nel modo sopra indicato,  
ed ancora se vi fossero delle varici all'ano, colla  
frizione delle foglie di fico o con un pannolino un  
po' aspro. Se vi fosse apparenza di emorragia nasale  
o di diarrea, si favoriranno quest' evacuazioni coi  
consigli dati per simili casi all' articolo della cura  
dei sintomi febbrili in generale.

La vera frenitide ammazza spesso l' ammalato  
nel terzo, nel quarto, o settimo giorno. Se oltre-  
passa questo termine, degenera frequentemente in  
mania.

I frenetici, i quali vomitano bile verde, che  
hanno tremori o stridori de' denti, che sono asso-  
lutamente costipati, che non orinano, o le rimet-  
tono bianche e crude, che si occupano a spennac-  
chiare le coperte, scacciare cose immaginarie, e  
sputano in faccia agli astanti, sono in grandissimo  
pericolo. Quegli i di cui trasporti sono continui,  
che rifiutano costantemente gli alimenti, le bevan-  
de, e tutto ciò che loro si offre, o che hanno gli  
occhi secchi e come pieni di polvere, sfuggono di  
rado la morte.

I frenetici che sono sorpresi subito da una tosse  
violenta o da dolori vivi al petto od ai piedi,  
facilmente guariscono. Queste osservazioni danno luo-  
go a credere, che l' infiammazione è qualche volta  
accompagnata da un germe gottoso; nei quali casi si  
potrebbe tentare, per sloggiarlo, di applicare un  
vescicante sul cranio, e nel medesimo tempo il ca-  
taplasmo N.° 16. alle gambe. I fomenti sul cranio  
coll' acqua diacciata, in ammalati vicini a soccom-  
bere, hanno tante volte prodotti buoni effetti, in  
quelli ancora estremamente rifiniti dai salassi.

Quantunque i frenetici abbiano degl' intervalli quieti, non si deggiono abbandonare, dappoichè ritornano poco dopo nei loro trasporti. Rispetto ai sintomi, che sono comuni coi febricitanti, si consultino gli avvisi dati all' articolo dei sintomi delle febbri in generale.

Il più delle volte la cangrena termina la vita dei frenetici.

*Frenitide falsa, ossia trasporto sintomatico  
al cervello.*

La falsa frenitide differisce dalla vera, in ciò ch' ella nasce come sintomo delle malattie acute e delle febbri infiammatorie: la materia morbosa trasportata alla testa, irrita, comprime od infiamma le membrane, che rinchiudono il cervello.

Avvi luogo a temere della falsa frenitide, allorchè nelle malattie acute la lingua diviene nera, che le orine e gli escrementi si sopprimono, o quando le orine, per l' innanzi torbide, diventano chiare, bianche, o contengono una nube nera. Ella è ancora annunciata da un dolore laterale non pleuritico, dalla mancanza della sete, dalle veglie, e dalla bianchezza degli escrementi. La roschezza della faccia, uno sguardo feroce, ed il disordine degli spiriti, assicurano la vicinanza della falsa frenitide, la quale si dichiara in seguito nel medesimo modo che la vera.

Le conseguenze che sono a temersi da questa malattia, sono il letargo, la mania, la melancolia, la follia, gl' insulti cataletici ec.

Si continua nella falsa frenitide l' uso dei rimedj convenienti al male, di cui ella è un sintomo, usando altronde ciò che è consigliato per il trasporto al cervello, parlando della cura dei sintomi febbrili in generale.



I trasporti che insorgono nella peripneumonia, nel miserere, nella squinanzia, avendo nel medesimo tempo l'ammalato le fauci secche e molto infiammate, sono mortali. Quelli che nascono improvvisamente nel vajuolo, sono pericolosissimi: i malati muojono per lo più da un deposito sul cervello, il quale vi produce prontissimamente la cangrena.

### *Parafrenitide.*

L'infiammazione del diaframma, il quale è il tramezzo che divide trasversalmente il petto dal basso ventre, è chiamata parafrenitide (d). Questa malattia, che è assai familiare, si manifesta da un dolore fisso e vivo, che passa dal di sotto delle coste verso la spina del dorso, e che cresce sempre, nell'inspirazione, colla tosse, collo sternuto, colle nausee, col vomito, colla pienezza dello stomaco, o quando si fanno sforzi, per rilasciare l'orina, o per deporre il ventre.

Il respiro è sempre corto, frequente, e soffocato; le coste si alzano durante l'inspirazione; e gl'ipocondri s'infossano. I malati hanno lo spirito alterato, e confusione nelle idee e nei discorsi; ridono involontariamente; sono convulsi, e furiosi (e).

(d) WEBER (*onomatologia medico-pratica*) vorrebbe che si nominasse questo male diafragmitide. *Il Tr.*

(e) Non è sempre vero, che il delirio accompagni la parafrenitide: MORGAGNI, *de sedib. & caus. morb. ep. 7. art. 14.* CLEGHORN *observ. on the epidemical. diseases in Minorca p. 248.* SARCONE, *istoria ragionata dei mali osservati in Napoli, ec.*

La diversa parte del diaframma produce diversi sintomi, quand'è presa da infiammazione; così, per esempio, se è infiammato il centro tendinoso, la malattia è più acuta, ed accompagnata da gravissimi sintomi; *si quidem* (dice il precitato WEBER), *quum arctiora, quum reliquæ partis, magisque tensa sint ejus vasa, gravior quoque morbus hujusque motus esse debuit, qui in illa humore inflammatus adegerit, neque hic inde facile iterum expediri poterit, aut viæ, quantum ad transmittendum satis sit, molliori, laxarique; quibus adeo re-*

Le conseguenze a temere da questa malattia, sono la cangrena, o l'idrope purulenta del petto o del basso ventre, le affezioni almatiche ec., se l'infiammazione cade in ascesso.

Si usi immediatamente tutto ciò che è stato raccomandato per la risoluzione delle infiammazioni interne in generale. Si dia ciascun giorno tre o quattro lavativi di siero di latte, o di latte mescolato con il doppio di decotto di seme di lino, da ritenersi il maggior tempo possibile. Nei primi tre giorni della malattia, si tenga la regione degl'ipocondrj ravvolta a forma di cintura, in una flanella piegata in quattro, ed inzuppata nel fomento risolvete ed anodino N.º 82.

Se non ostante l'uso di cotesti rimedj, l'infiammazione sussiste al di là dei tre giorni, siccome questa specie d'infiammazione è soventi prodotta dai fomiti reumatici, si sostituisca alla cintura, una bendella di tre pollici di larghezza d'empiaastro vescicante N.º 63., da stendersi su tutta la regione degl'ipocondrj. Nel medesimo tempo si avverta alle disposizioni dell'ammalato, se ha l'una o l'altra delle crisi, le quali operano la risoluzione dell'infiammazione; ciò che faasi ordinariamente colla spettorazione, colle orine, o colla diarrea, regolandosi in conseguenza, ed in vista delle direzioni date all'articolo dei sintomi delle febbri in generale; e siccome la parafrenitide può terminare col trasporto delle materie alla coscia, alle parotidi, ec., si procura di prevedere e di conoscere questi casi, per

---

*bus, necesse est, malum augeatur, & difficilior ad curationem reddatur: questo medesimo si conforma con ciò che lasciò scritto il chiarissimo de MEZA ( Compendium medic. pract. ): symptomata vel mitiora, vel vehementiora sunt, prout pars carnosae vel tendinosae affecta fuerit. Il Tr.*

trattarli secondo gl' insegnamenti indicati ai suddetti articoli .

Se il malato non provasse alcuno di questi benefici successi , la cangrena farebbe allora molto a temere , ammeno che l' infiammazione non termini colla suppurazione ; nel qual caso si prosiegue giusta i precetti dati parlando in generale dell' esito delle infiammazioni in ascesso ; e se questo si esterna verso le coste false , s' impiega immediatamente il raccomandato per far maturare gli ascessi esterni in generale , e si manda per un abile chirurgo per la medicazione . Al contrario se l' ascesso del diaframma si apre nella cavità del basso ventre o del petto , ne risulta l' ascite o l' empiema purulento ; questi ultimi mali sono incurabili .

### *Squinanzia (f) .*

La squinanzia consiste nell' infiammazione delle amigdale , dell' ugola , e dei muscoli della gola o delle parti circonvicine . Quelli che sono minacciati da una tale malattia , sentono dapprincipio un inceppamento nel collo , un bisogno di sputare e di fatti sputano molto . Poco dopo hanno dei brividi , in seguito ardore ed asprezza alla gola con frizzi e battiti dolorosissimi nel collo ogni volta che trangugiano . Le amigdale , l' ugola , il velo palatino sono gonfi e rossi ; la febbre diviene acuta , e la difficoltà d' inghiottire cresce a misura che si avvanza l' infiammazione . Poco dopo la lingua , il collo , la faccia e gli occhi si gonfiano ; le fauci si seccano , la saliva s' inspessa , sempre più si restringe il passag-

---

(f) E schinanzia , e scheranzia , angina , infiammazione della gola , infiammazione delle fauci , *cc. II Tr.*



gio della gola; l'ammalato parla con istento; articola male; la bevanda risale per le narici; e dacchè l'infiammazione investe il condotto del respiro, la voce diviene fioca e tremula, il respiro difficile, con minaccia d'improvvisa soffocazione.

Le conseguenze che ne risultano, quando l'infiammazione non si risolve, sono la suppurazione, e gli ascessi interni della gola, od esternamente sotto il mento ed al collo, secondo la sede del male. L'infiammazione degenera ancora in cangrena, in sfacelo ed in scirro, se è nelle amigdale, od in peripneumonia, se nel polmone.

Si salassi tosto generosamente dal braccio e due ore dopo dal piede (g). Nell'intervallo dei due salassi, si applichi il lavativo domestico N.° 108.; ed immediatamente dopo il secondo salasso, se avvii indicazione per il vomito, si esibisca la polvere emetica N.° 178.; o se il vomito non sembra necessario, la pozione minorativa N.° 168. Finita l'operazione dei purganti, l'ammalato si corichi colla testa alta, in una stanza temperata, nutrito con polti acquose, gelatine, e conserve di frutti sani; bea in diverse riprese, una tazza della tisana comune e tiepida con entro disciolto tre grani di nitro, o siroppo di more, di ribes, o di limone, diluito coll'acqua d'orzo. Si gargarizzi ogni quarto d'ora, col gargarismo comune N.° 86. Negl' intervalli, affine di mantenere sempre umida la bocca, tenga in bocca a sciogliere dei pezzetti di sal  
pru-

---

(g) Il grande SIDENAMIO insisteva nelle replicate cacciate di sangue, come il più efficace ed il più pronto presidio nelle squinzanze: (*oper.* pag. 353.); e prima di lui, LINDANO faceva ogni due o tre ore trar sangue dalla vena poplitea fino alle once trenta per volta. *Il Tr.*

prunelle, avvertendo particolarmente d'inumidire la gola nel trangugiare questo sale, qualunque sia il dolore della deglutizione.

Si fomenti il di sotto del mento fino verso le orecchie, col fomento risolvente ed anodino N.º 82., e nella notte si applichi l'impiaastro di meliloto (b). Si replichino i piediluvj nell'acqua-crusca, colla giunta di un pajo di tazze d'aceto; ed in mancanza di questo bagno s'involgano le gambe in salviette inzuppate nel fomento rinfrescativo N.º 81.

In seguito al giorno della purga, si dia a digiuno l'elettuario anti-flogistico N.º 85., bevendo il siero di latte per tutto il tempo dell'uso dell'elettuario, in sufficiente dose per avere, in ventiquattr'ore, tre o quattro uscite di corpo.

Nel caso che la squinanzia non fosse considerevolmente diminuita, nell'entrare del terzo giorno da l'uso di questi rimedj, si salassa, s'è possibile dalla giugulare o sotto la lingua (i). Poco tempo dopo, si applicano al collo e sulle spalle una mezza dozzina di ventose scarificate, affine si possa risolvere l'infiammazione.

Se non per tanto la squinanzia continua violenta, si replica il salasso, secondo il bisogno, anche il quinto giorno del male. In allora ed anche prima, se si osserva una disposizione all'ascesso, dall'esplorare la gola, o dai sintomi indicanti l'ascesso

*Tom. I.*

V

---

(b) L'impiaastro di meliloto si fa con dodici once di fiori di meliloto, sedici once di sevo bovino, cotte a confunzione dell'umidità; alla colatura si aggiungono once ventiquattro di resina bianca, e dodici once di cera. *Il Tr.*

(i) Ossia dalle vene ranine, operazione comandata fino da CELSO: si vuole però essere soltanto vantaggiosa l'apertura di quelle vene, quando sussistono molto turgide, e gonfie in mezzo alle repliate cavate di sangue. NESSI: l. c. *Il Tr.*

vicino (e che sono esposti parlando delle infiammazioni in generale) si sospenda il salasso; si diano brodi più stretti; la bevanda sia latte con un terzo d'acqua d'orzo, e si applichi esternamente all'intorno del collo, il cataplasmo mollitivo N.º 15. Si gargarizzi spesso con parti eguali di acqua e latte, in cui si sia fatto bollire un pajo di fichi raddolciti col mele.

Nel caso che il malato non possa gargarizzare, si supplisca colle frequenti iniezioni fatte con una siringa. Si continuano gli ammollienti, fino a che l'ascesso si apre; e s'egli naturalmente non scoppia, si apre secondo l'arte. S'egli si apre esternamente, si medica nel modo raccomandato all'articolo delle infiammazioni in generale, che passano in ascesso; e se internamente, per ripulirlo e per guarirlo, basta gargarizzare ogni due ore con qualche decotto raddolcito col mele rosato.

Gli ascessi interni che non si ponno raggiungere, scoppiano per lo più nel trangugiare qualche boccone di mollica di pane avvolto nel mele. Durante l'infiammazione o l'ascesso, se l'ammalato si trova in pericolo di soffocazione, gli si salva la vita colla broncotomia (k). S'egli perde intieramente la facoltà di trangugiare, si nutrica, fino a che l'inghiottimento farà libero, con lavativi di brodo o di latte.

Si sa che la squinanzia è passata alla gangrena, allo sfacelo, od allo scirro, dai segni esposti all'

(k) O tracheotomia, la quale operazione giova, quando la causa del soffo amento non so passa i confini delle laringe. NESSI: l. c. FOURCROY preferisce la laringotomia alla tracheotomia, la quale si eseguisce fra quello spazio triangolare fra le cartilagini tiroidea, e cricoidea, come parte in cui non vi sono glandole, muscoli, e nervi di uso particolare. Il Tr.



(1) Se il gonfiamento delle amigdale rimane ostinato dopo cessati i sintomi della infiammazione, o fa temere, che s'insciriscano, esperimentati inutili i rimedj interni ed esterni generali, conviene ricorrere alla chirurgica distruzione di esse. Quella, che *Fabrizio d'ACQUAPENDENTE* riguardò come molto difficile, e pericolosa, può farli (insegna il Sig. Don *Pietro MOSCATI*) col ferro, e col caustico, il più sicuro caustico in questi casi sarebbe la pietra infernale portata fino alla glandola, in modo che dessa sola sia tocca, e non le parti vicine: dopo avervela tenuta per qualche tempo applicata, e compressa, si prescrivono subito i replicati gargarismi di semplice acqua tiepida o di latte, i quali lavino e portino via il caustico, che può essere rimasto attaccato alla parte cauterizzata, e che solubile di sua natura nella saliva, si spanderebbe nelle vicine parti, esoriandole: si può anche usare il caustico liquido, intingendovi un pennello, e toccando con esso le parti scirroscie più volte al giorno, e fino a tanto che sono distrutte almeno più della metà le gonfiate amigdale; usando in seguito i mezzi sopra esposti per impedire la diffusione della causticità: ma sì l'uno che l'altro metodo incontrano molta difficoltà e pericoli; nè crede il venerabile nostro Maestro Sig. *MOSCATI* darli mai caso pratico, in cui debbano adottarsi a preferenza del taglio, seppure questo non fosse una qualche costituzione epidemica maligna simile descritta da *SEVERINO* nel secolo XVI. a Napoli, dove sintomo comune era la tumefazione delle amigdale, ed egli vi applicò il fuoco felicemente.

La operazione di recidere le amigdale è antichissima, e di essa ne hanno parlato *CELSO*, *Paolo EGINETA*, *ALBUCASI*, *AEZIO*, cc. *EISTERO* propende piuttosto pel caustico in generale, e non consiglia la recisione, se non nelle amigdale a base angusta. *SHARP* preferisce la legatura al taglio, e *MORGAGNI* non operatore per se, ed ingannato da chi gli somministrò le relazioni, condannò il taglio delle amigdale *ob nimiam & vix tandem cohibendam sanguinis profusionem* (*de sedib. & caus. morb. epist. anat. L.*) *DIONIS*, nel suo corso di operazioni condannò e temette questo taglio. Le *DRAN*, *GARENGEOT*, e *PLATNER*, non hanno parlato che delle amigdale infiammatoriamente gonfiate, e dell'apertura di esse, come di quella di un ascesso. In tale stato d'inesattezza era la Chirurgia, quando l'inarrivabile chirurgo Sig. *Bernardino MOSCATI* diede ad essa con suo particolare metodo sicurezza e facilità: cominciò egli dall'esperimentare la legatura, ed avendola trovata pericolosa per la infiammazione, che produceva a tutto il palato ed alle fauci, si risolse di recidere le amigdale, prima legate: in seguito vedendo nascere una molto incomoda emorragia dopo la totale recisione fatta secondo il consiglio degli antichi, poichè qualche volta non si può in un sol colpo recidere le amigdale; il sangue che esce, obbliga il chirurgo a sospendere dall'operare, perchè cadendo in gola, ed abbandonando l'ammalato a se, cade la tagliata amigdala sulla epiglottide, con pericolo di soffocazione; quindi prese il savio consiglio di amputare le amigdale in più tempo, cominciando cioè dal fare nell'

che riguarda la cangrena in particolare, vi sono, senza, e con epidemia, mali di gola, nei quali appajono alla fine del secondo o terzo giorno, macchie nere nel fondo della gola. Si chiama questo male squinanzia cangrenosa (*m*). Bisogna dunque esaminare tutti i giorni il fondo della gola, ed al

amigdala estirpabile un taglio longitudinale; quindi arrestato con ossificato il poco sangue che n' esce, facendo un altro taglio trasversale profondo quanto il primo, che viene a dividere l'amigdala in quattro parti: Puossi vedere più estesamente quanto conviene e per le operazioni, e per le pratiche cautele da usarsi, oltre gli eruditi manoscritti delle istituzioni chirurgiche del Sig. Don Pietro MOSCATI, il tomo V. dell' Accad. R. di Chirurgia di Parigi, dove si legge la dissertazione intitolata *Maladies de l'interieur de la bouche*, col metodo del Sig. MOSCATI Padre. *Il Tr.*

(*m*) Chiamata anche maligna, suffocante, carboncello anginoso, fune strangolatoria, pedancone da SEVERINO. garantillo dagli Spagnuoli, ec. ec. di cui HUXHAM, e FOTHERGILL ne hanno dato ampia descrizione, siccome ancora una esatta storia di essa si legge negli opuscoli interessanti di Torino per l'anno 1777., esposta dal Sig. Giovanni BRUGNONE già più volte giustamente encomiato. RUSSELL, e DOUGLOSS dicono essere questa specie di squinanzia, epidemica, perchè è contagiosa, e riconosce per cagione un particolare miasma: essa si riconosce principalmente per essere accompagnata dai sintomi di putrefazione; quindi è, che non convengono in generale i salassi, e soltanto colla debita moderazione si praticano, se vi sia manifesta gonfiezza e durezza di polso; come ci addottrinano i nominati HUXHAM, e FOTHERGILL: si deve guerentire la gola dagli effetti della materia acre, che ne cola, ed usare perciò frequentemente le iniezioni proposte da HERRENSCHWAND: per assicurar poi la massa degli umori dalla corruzione, li deve generosamente ulare, tanto internamente, come esternamente, gli antilettici, e soprattutto larghe dosi di chinachina. CULLEN consiglia i vomitivi prescritti in dosi capaci di eccitare nausea o vomito, purché sieno amministrati al principio della malattia: non disapprova ancora l'uso dei vescicanti nell'angina ulcerosa. HOME raccomanda il gargarismo composto con otto once d'acqua di calce, e due dramme di tintura di mirra: i vapori d'acqua calda mescolata collo spirito di sale ammoniac, hanno arrestato i progressi di una cangrena, che minacciava di attaccare la laringe. NESSI: in Francia, ove fu questa malattia epidemica l'anno 1753. giovò una dissoluzione di 24. grani di sale di saturno in due once d'acqua di piantaggine, con cui li toccavano l'escare. BERTRANDI: MAJAUULT adopra l'aleali volatile tratto dal rafano rullicano, e ridotto a moda di gargarismo nella seguente maniera: prendete di acqua comune, once sei: di spirito di vino, once due: di spirito di rafano rullicano, once due: di mele rosato, once una e mezzo. *Il Tr.*

momento che si osservano piccole croste nerastre, si sospendono i salassi, e si dà incessantemente il decotto anti-setico N.º 22., del quale servirassi pure per replicate iniezioni nella gola. Invece di esserlo coll' aceto, il suddetto gargarismo, sia sensibilmente inacidito collo spirito di vitriuolo, o di zolfo: si esibiscano brodi sostanziosi; e si continui a questo modo, fino a che la gola abbia ripreso il suo colore naturale, promovendo allora la guarigione col gargarismo d' infusione di salvia.

La squinanzia si distingue dagli altri mali di gola, dall' infallibile accompagnamento della febbre acuta.

In questa malattia il pericolo si manifesta dalla difficoltà di respirare.

Il gonfiamento scirroso e recente delle amigdale e dell'ugola si toglie col replicato gargarismo di decozione di malva, applicando contemporaneamente di sotto al mento l'impiaastro di meliloto, e toccando con precauzione il tumore due volte al giorno coll' olio di tartaro per deliquio.

Un vescicante applicato sotto il mento, ha prodotto buonissimi effetti nella squinanzia cangrenosa ostinata. Si tenta ancora questo rimedio nella squinanzia infiammatoria, quando gli altri rimedj sono stati inutili (n).

### V 3

---

(n) Siccome il popolo crede in ogni malattia possedere un rimedio certo, così anche nell' angina suole adoperare lo sterco, e le orine di varj animali internamente ed esternamente. Forse in que' tempi fortunati, quando i buoi parlavano, dice REDI, era vero, che un capo di vipera strozzata con un filo di seta tinta in chermisi, e portato al collo, restituisse la sanità a coloro, che avevano la squinanzia, e proibisse, che mai più da questo fiero, e precipitoso male non fossero assaliti, come lo scrive con molti autori ABIMERON ABINZOAR, volgarmente detto AVENZOAR, e come il volgo se lo crede; ed io sonaleo un uomo (senza parere del RE-



*Infiammazione del polmone, ossia peripneumonia vera  
conosciuta sotto nome di flussione di petto.*

- Nella vera peripneumonia, il male si annuncia per lopp più da brividi alternanti col calore. L' infiammazione comincia quasi sempre dai bronchi, e sorprende più o meno prontamente tutto il polmone.

Frattanto che l' infiammazione non vizia che i vasi capillari dei bronchi, i malati hanno un dolore fisso, calore, e frizzi nella parte superiore e

DI), che per qual si sia tesoro, non si levarebbe dal collo un capo di vipera, che continuamente vi tiene attaccato, e pure ogni anno, intorno al principio d' aprile, infallibilmente vien tormentato da questo male, e se il suo medico senza perder tempo, non lo soffocasse con buone cavate di sangue, e con altri efficaci rimedj, son di parere, che rimanendo soffocato, sarebbe vera una parte del detto d' AVENZOAR.

Puossi qui far cenno della glossitide, ossia infiammazione della lingua, malattia rarissima, di cui ne hanno parlato VOGEL (*de cognosc. & curand. præcipuis hum. corp. morb.*), SENNERTUS, (*medic. pract.*), RIVERIUS, (*Prax. medic.*); ed ultimamente il cel. BORSIERI (*instit. medic. pract.*): È la glossitide malattia acutissima, ed ammazza in cinque, o sette giorni: comincia con febbre a freddo immediatamente seguita da eccelsivo calore; e sotto il freddo febbrile la lingua subito è investita da dolore, rossezza, tumore, difficoltà al parlare ed all' inghiottire, e susseguente impossibilità di esercitare e l' uno e l' altro uffizio: la saliva è viscida, tenace: la faccia si arrossa: la testa duole: la voglia è ostinata: la lingua per la enorme grossezza si sporge in fuori; l' ammalato è minacciato da soffocazione: tal' è la descrizione, che ne porge il dottissimo Sig. BORSIERI, il quale seguita a dire, essere la glossitide pericolosissima, e tale, che se non si risolve subito, finisce in ascesso, col danno della irreparabile soffocazione; quindi è, che sono necessarij i più validi rimedj, e questi prontamente amministrati, salassando dalla giugulare, dalle ranine, e ciò replicatamente, applicando ventose scarificate, sciogliendo il ventre con continui lavativi, e fasciando il collo con molli cataplasmi; e s' egli è possibile, facendo colutorj con latte e mele, da risciacquare incessantemente la bocca.

Rispetto all' angina, chi volesse vedere, quante altre specie vi sieno, oltre le quì nominate, legga il citato libro del chiarissimo Sig. BORSIERI, dove vi sono descritte con copia di erudizione e di aurei precetti clinici. *Il Tr.*

posteriore del petto: toffono; provano più irritazione che oppressione; le materie che espettorano, sono tinte od intrise di filamenti sanguigni; il polso è frequente, duro, e tuttora discretamente sviluppato.

Sin quì il male si riduce allo stato flogistico dei bronchi, il quale sopravviene in seguito ai reumi caldi, trascurati, o trattati coi rimedj caldi; come pure quando essendosi riscaldato, improvvisamente si raffredda. L' oppressione cresce a misura che i vasi capillari del polmone s'ingorgano; i malati provano allora ardore, molto imbarazzo e peso nel petto. Il polso è inceppato, celere, ed il respiro diviene corto, frequente, difficile. L' oppressione cresce a ragguaglio del maggiore ingorgamento del polmone, e diventa permanente e soffocativa; i malati non ponno più toffire che interrottamente; hanno un respiro ardente, affanni angosciosi; i labbri, la bocca, gli occhi, le guance sono molto rosse, qualche volta livide. Tutto questo succede frattanto che la debolezza del polso smentisce in qualche maniera lo stato della febbre e l' estremo pericolo del malato; ciò che proviene, dacchè il circolo del sangue per il polmone è intercetto dall' ingorgamento di questo viscere.

Le conseguenze che ne risultano, se la risoluzione dell' infiammazione non si eseguisce perfettamente, sono la metastasi od il trasporto delle materie morbose alle orecchie, agl' ipocondrij, od alle cosce; ascessi o vomiche al polmone; la polmonia, l' empiema, l' aderenza del polmone alla pleura; o, se il malato non muore dalla cangrena, i tubercoli scirrofi al polmone (o).

V. 4

---

(o) O per lo meno, la peripneumonia è ricorrente ad ogni anno, come disse IPOCRATE, *de intern. affection.*) *Peripneumonia, nisi cito repurgetur, annuus fit morbus. Id Tr.*

Avvi luogo a sperare un perfetto guarimento, se si risolve interamente l'infiammazione; se con un respiro agevole, oppressione mediocre, e polso sviluppato, l'infermo non soffre che a motivo della febbre e dei sintomi; se innanzi il terzo giorno spettorata molte materie gialle, spesse, intrise o no di sangue, e queste s'imbianchiscono appoco appoco, e con sensibile libertà del respiro e del polso (p).

Si può ancora lusingarsi di risanamento, se invece della spettorazione, i malati hanno innanzi il settimo giorno una diarrea biliosa e mucosa; come anche quando rendono molte orine spesse, cariche di un sedimento dapprima rosso, poi bianco, con sollievo della malattia.

Trovando l'ammalato con queste buone disposizioni, si cura il male come una flussione di petto proveniente da flogosi; allora basta di fare ne' tre primi dì del male un salasso, o due nei pletorici (q). Passato questo termine, come anche dopo il salasso, si seconda soltanto la natura coll'aria temperata, dando ogni quattr' ore un brodo di poltiglia d'avena o di orzo nell'acqua, e da bere ogni quarto d'ora una tazza della tisana d'orzo N.° 213., o quella comune N.° 210., tiepide; e se di già v'è spettorazione, le bevande siano calde, inspirandone il vapore, e di tempo in tempo si dia una tazza del decotto pettorale N.° 33., inspirandone pure di

(p) *In omnibus pulmonum & laterum doloribus celeriter promptoque expui convenit, sputaque flavum valde permixtum alpurere. HIPPOCR. prognost. Il Tr.*

(q) SARCONE asserisce di avere ottenuto sensibile vantaggio, col salasso dalla giugulare, appoggiato all'asserzione di HALLER, che non solo con tale salasso si rimette in giro il sangue già disposto alla quiete, ed allo stagno, ma che di più il polmone si mette in istato da liberarsi dalla piena del sangue, che l'inonda: HALLER, *mémoire. sur le mouv. du sang.* p. 201. SARCONE, l. 6. Il Tr.



essa il vapore; si ugne in oltre il petto coll'unguento pettorale N.º 140; ed a ogni ora, si esibisce un cucchiajo da caffè di loc di Parigi, od in sua vece l'eglemma raddolcente N.º 44.

Nel caso che la spettorazione si soffermi, suffi-  
fiendo tuttora la tosse, l'ammalato raddoppj l'uso  
delle suddette bevande, e sostituisca all'eglemma,  
la medesima dose d'osimele scillitico, unito a par-  
te eguale di sciloppo di capelvenere: prenda ancora  
ogni due ore una presa della polvere di Kermes  
N.º 183.; e se questi rimedj non producono il suo  
effetto, si applica un largo vescicante fra le scapole (r).

Continuando l'uso di questi rimedj, la spetto-  
razione si ristabilirà e renderà lo stato del male da  
non operare che a mantenere sciolto il ventre col  
lavativo domestico N. 108., e continuata la traspi-  
razione: Se al contrario la natura fosse disposta a  
scaricarsi colla diarrea, le bevande faranno tiepide,  
e raddolcite collo sciloppo di viole, od in loro vece  
molto siero di latte, applicando mattina e sera il  
suddetto lavativo domestico, ed ugnendo gl'ipocon-  
drj coll'olio mandorlino.

Nel caso che la crisi si facesse per le vie dell'  
orine, affine di favorire più particolarmente quest'  
evacuazione, il malato bea spesso una tazza d'infu-  
sione tiepida di fiori di malva col siroppo d'altea, si

---

(r) L'impiaastro vescicante si fa con tre once di impiaastro di  
meliloto, a cui, liquefatto, vi si unisce un'oncia e mezzo di pol-  
vere di canterelle, e due dramme di canfora alcun poco stemperata  
nell'olio. Questa composizione è nominata impiaastro vescicante dell'  
HOFFMANN. Un altro impiaastro vescicante si fa con sei once di  
trementina di Venezia, due once di cera gialla, tre once di polve-  
re finissima di canterelle, ed un'oncia di semi di senape polverati.  
Si fonde la cera; si aggiugne la trementina, avvertendo che non  
vi sia troppo fuoco da fare svaporare la trementina; si mescola esat-  
tamente; vi si gettano le polveri, continuando a rimmenare la massa  
finchè sarà calda. *Il 27.*

ungano le reni coll' unguento d' altea (*f*); e mattina e sera si applica il lavativo N° 108. In questi tre casi si lascia il salasso, i sudoriferi, ed in generale le evacuazioni che si farebbero per altri colatoj, che per quello, per cui la natura si sbarazza.

Seguendo questa strada, le peripneumonie leggiere, nate soltanto da flogosi dei bronchi, o da piccola porzione del polmone, si risolvono.

Ma se la peripneumonia assale vivamente una persona robusta, con forte oppressione, tosse secca, polso piccolo ed inceppato, non corrispondente alla febbre, si spera invano la risoluzione perfetta, dallo sputo, dalle orine, dalla diarrea, se l' arte non vi dispone la natura. A questo fine si cavano al più presto, mediante larg' apertura, dodici once di sangue dal braccio, da replicarsi nei primi quattro giorni del male, tre o quattro volte di sei in sei ore dal piede e dal braccio alternativamente ed in quantità proporzionevole alla violenza dell' oppressione, esortando il malato a respirare profondamente ed a tossire, frattanto che il sangue cola: s'interpongano maggiori intervalli frai salassi, che saranno di sei in sette once, da non replicarsi se non in vista di chiare indicazioni. Il cibo, le bevande ed i rimedj sieno quei medesimi indicati più sopra; si fomentino le gambe colla fomentazione N.° 81., applicando mattina e sera il lavativo N.° 108., animato da due dramme di nitro.

Per facilitare l' espettorazione, si serve di una grande spugna inzuppata nel decotto di malva, te-

(*f*) L' unguento d' altea è fatto con sedici once di radici d' altea, once otto di seme di sien greco e di lino, e sessantaquattro once di butirro. Si cuoce il tutto a consumazione dell' umidità, eppoi vi si aggiunge, sedici once di cera gialla, sei once di resina, due once di trebintina; disciolte queste sostanze vi si unisce un' oncia di radice polverata di curcuma. *Il Tr.*

puta costantemente ad una piccola distanza dal naso e dalla bocca; ed un'altra inzuppata in decotto di fiori di sambuco unito a parte eguale d'aceto bollente, concorrerà a richiamare la soppressa spettorazione.

Si continua a questo modo, fino a che la natura comincia decisamente ad operare la risoluzione colla diarrea o colle orine, coadjuvando a mantenere queste critiche evacuazioni, e regolando i malati nel modo sopraccennato.

Se non pertanto la diarrea fosse malfacente, e che soffermasse una espettorazione bene stabilita, si arresta coi mezzi riferiti a questo proposito nella cura dei sintomi febbrili in generale; e siccome l'esperienza prova che un vescicante applicato alla coscia, concorre efficacemente a sopprimere la diarrea, ristabilendo la spettorazione, si eseguirà questo espediente: nella convalescenza, si purga a diverse riprese colla pozione mannata N.º 167., o colla minorativa N.º 168.; ed appoco appoco si accorda il regolamento dei convalescenti della lettera B.

Se invece di quest'evacuazioni, i segni indicati all'articolo delle infiammazioni in generale, annunciassero il trasporto critico delle materie alle orecchie, alle cosce, al ginocchio, ec., si regola secondo l'insegnato a questo articolo.

Finalmente se, come non di rado avviene, l'infiammazione del polmone, cadesse in ascesso, si conosce in vista dei segni indicati per le infiammazioni in generale, e se ne assicura ulteriormente dal delirio accompagnato da polso molle, da rigori di freddo, da senso di permanente imbarazzo, e peso nella parte del petto, che fu dapprima la più molestata dai dolori; a ciò si aggiugne appoco appoco, a misura, che il pus è ripassato nel sangue, la roschezza delle gote, e delle labbra, la fete, ed i sintomi della febbre etica.



Si regola in questo caso secondo l'insegnato per la cura delle vomiche e degli ascessi polmonari, le cui ordinarie conseguenze sono l'empiema (t),

---

(t) L'empiema, dice CULLEN, succede in seguito alla peripneumonia, alla vomica, alle pleuritide, alla infiammazione del mediastino, ed a quella del diaframma. I segni indicati da AVENBRUGGER, (*inventum novum ex percussione thoracis humani ut signis abscessus interni pectoris morbos detegendi, Viennae apud Trattner 1763.*) sono quasi sempre fallaci; e questo autore è il solo, che si possa vantare felice di avere risanati tanti empiematici colla paracentesi del petto. E' difficilissimo l'assegnare, che sia per nascere l'empiema, ed anche l'essere già fatto, onde pur troppo ebbe ragione BAGLIVIO di esclamare: *o quantum difficile est, curare morbos pulmonum! o quantum difficilior eosdem cognoscere, Et de iis certum dare praesagium! fallunt peritissimos ac ipsos medicinae principes!* Generalmente però si può sospettare dell'empiema, se in seguito a gravi infiammazioni di petto non è comparso lo spunto, generale sudore, orina critica nei giorni *judicatorij*, perdita di sangue dal naso, o dalle morici, uscite di corpo biliose o purulente, nè colle urine si sia rimessa qualche porzione di pus; se si è condotto male nella cura di queste infiammazioni, omettendo per esempio i necessari salassi, ed in vece dei rimedj refrigeranti, antilogistici, si sieno usati i caldi, ed aromatici: ciò premesso, se nasce interpolato senso di freddo (*orripilazione*), senza veruna causa eterna, sull'istinto ancora l'infiammazione, si dee temere di suppurazione: allora si rimette la febbre, si calma il dolore, l'ammalato sente una molesta sensazione, e straordinaria nel lato affetto, ch'è non fa diffinire: il polso appena irritato poco appare diverso dal naturale: la malattia sembra essere sul suo scadere; ma le forze non vengono, e lo stato di eaginevolezza ostinato rimane: l'ammalato nausea tutta specie di cibo, e se la notte dorme, dorme interrottamente senza proflitto alcuno, e si sveglia con senso in bocca di marciume: risente interrotto calore pel corpo, ed il respiro, se bene vi si avverte, è alcun poco stentato, ed intereetto: nei movimenti del corpo, e nel giacer supino, insorge secca tosse, più molesta nel primo eoricarli, ed alla mattina: le forze vanno sempre più scadendo: cresce il senso di molestia nel lato offeso, con susseguente indizio di gravetza, e di dolore: il respiro è malagevole, e dopo alcune ore dal cibo è stertoroso: il luogo dolente si alza e si gonfia: la febbre sulla sera si rinnova: il tumore di giorno in giorno cresce, e cede al tatto: le gote si arrossano: gli occhi rientrano: le dita sulla estremità sono calde: nei movimenti del corpo si sente talvolta sordo mormorio nel petto: alcuni giacciono meno male sul dorso e sul lato affetto; altri si sentono male su qualunque lato, e per avere il respiro si alzano sul letto a mezza vita e col tronco inclinato.

Questi sono gli ordinarij segni dell'empiema, i quali però non sono sempre costanti, come puossi vedere nella dottissima diss. di GROSCHKE, *de empyemate*.

quando il pus si spande nella cavità del torace; e la polmonia, quando le materie disperse nel corpo del polmone, si fanno strada per la via della spettorazione.

Gli sputi gialli o bianchi, molto compatti o spumosi, e che non sollevano interamente; la spettorazione di materie verdi, grumose, cenerine, livide, nere; la paralisi di un lato; le orine divenute chiare nel vigore della malattia, dopo essere state cariche e torbide; il rantolo senza spettorazione; la spettorazione affatto soppressa, e la frenitide sopravvenuta nel corso di questa malattia, sono di cattivissimo augurio.

Il dolore, ed il tumore del fegato o della milza, prodotti dal trasporto delle materie, conducono alla morte, o ad una incurabile etichezza.

L'aderenza del polmone alla pleura, ed i tubercoli scirrofi successi alla peripneumonia, indicati da una tosse secca, accompagnata da stramenti, e da imbarazzo al petto, i quali crescono dopo i pasti, ed impediscono di respirare profondamente, come anche di stare coricato sui due lati, e specialmente di tenersi diritto, sono incurabili. Si solleva coll'

---

I rimedj raccomandati per l'empiema sono gli emetici, e i purgativi; ma come benissimo riflette GROSCHKE, non pare credibile, che con essi si possa fare fuoruscire tutto il pus trattenuto, e che questi sieno i veri mezzi per liberare la cavità del petto dalla purulenta materia, e presto, e senza maggiore impoverimento delle forze: non crede pure ottimo spediente il fonticolo applicato presso al luogo affetto, od il setone alla parte viziata, o come vogliono alcuni, alla nuca; imperocchè fuori dello stimolo prodotto dai setoni, assai incomodo per gli empiematici, succede un deperimento di loro deboli umori, per cui sempre più le forze scadono, e dispongono alla tilichezza: fra i rimedj interni sono riputati il siero di latte, il latte caprino, asinino, il sugo dell'erbe anti-scorbutiche, la scorza peruviana, ec. Ma il pronto ed efficace presidio per l'empiema è la paracentesi, colla quale s'è da dare sfogo ed uscita al trattenuto pus. *Il Tr.*

inspirare spesso il vapore d'acqua calda; colla friggione, mattina e sera, sulla parte morbosa; coll'unguento pettorale N.º 140. ; col cavalcare, e col portare costantemente sul lato infermo l'impiaastro di solfo del Rolandi (u). Ciò è quanto si potrà fare per l'aderenza del polmone.

Le persone che muojono d'infiammazione polmonare, nel vigore della malattia, periscono per lo più da cangrena (x).

I peripneumonici, i quali hanno nel principio della malattia pienezza manifesta allo stomaco od al basso ventre, immediatamente si purghino dopo il primo salasso, giusta il raccomandato più sopra. Nei flussi d'orine, nei sudori e nella diarrea, si seguano i mezzi indicati all'articolo dei sintomi delle febbri in generale.

Il metodo indicato riesce facilmente nella peripneumonia, proveniente soltanto o principalmente dall'infiammazione del sangue, e dal ristagno infiammatorio del polmone. A misura che l'ammalato si trova in buon essere, si accorda l'uno o l'altro degli alimenti i più dolci della lettera H. Ma la peripneumonia, è un male frequentissimo, e tante volte epidemico, ed anche contagioso per le persone assistenti, e non di rado complicato con putrida favorra delle prime strade. In questo caso bisogna

(u) Prendete balsamo di solfo dell'autore once quattro: colofonia once sei: cera gialla once una: mirra in lacrima once quattro e mezzo: squagliata la cera colla colofonia in vase di terra vetriato a leggierissimo calore, vi si aggiugnerà il balsamo; levate il vase dal fuoco, e quando comincia a raffreddarsi, vi si sparge la mirra sottilmente polverizzata, mescolando diligentemente acciò s'unisca il tutto perfettamente. *Il Tr.*

(x) I segni, coi quali si riconosce, che la peripneumonia è passata alla cangrena, sono la subitanea cessazione del dolore, il polso debole, frequente, molle, estrema generale debolezza, leggiero delirio, freddo alle estremità, e freddo sudore. *Il Tr.*



neceffariamente purgare l'ammalato fra il primo ed il fecondo falaffo colla pozione emetico-laffativa N.° 165.; e negl' intervalli dei falaffi fuffeguenti, applicare mattina e fera il lavativo purgante N.° 211.

Quando la malattia è epidemica, fpeffo la peripneumonia è complicata colla febbre putrida. In tale circoftanza, dopo il fecondo falaffo, anche fotto piccola indicazione, bifogna replicare la fuddetta pozione, o purgare l'ammalato colla pozione minorativa N.° 168.; e dare tutte le mattine l'emulfiione fubiata N.° 68. in fufficiente quantità per ifcaricare due o tre volte in ventiquattr' ore. Dopo il fecondo falaffo, fi cerca di rinnovarlo; e nel cafo vi fi debba ricorrere affolutamente, fi replica con circofpezione e foltanto di cinque in fei once: fi offervi il metodo fopra indicato; e tutte le volte che l'ammalato rifente pungimento alle cofte, od alla regione del fegato o della milza, fi applichi immediatamente fulla parte un largo vefcicante.

Le peripneumonie putride, effendo di più lunga durata che quelle puramente infiammatorie, per il bene dell' ammalato e degli aftanti, fi rinovi fpeffo l'aria della ftanza. Se l'infermo appetifce gli acidi, fi dia la limonea calda leggieriffima.

Salvato il petto, conviene il decotto anti-fetico N.° 22., e i brodi foftanziofi. Fatto convalefciente fi purga reiteratamente colla fuddetta pozione minorativa, e fi mette infenfibilmente al regolamento dei convalefcienti della lettera B.

### *Pleuritide.*

La pleuritide confifte o nell' infiammazione dei tegumenti e mufcoli che cuoprono il petto, o guer-  
nilcono gl'interftizj delle cofte, o nell'infiammazione della pleura, la quale è la membrana che tap-

pezza internamente le coste, e che nel formare il tramezzo detto mediastino, divide dall'alto in basso la cavità del petto in due (y).

La prima di queste infiammazioni produce la falsa pleuritide; e la seconda, la vera (z).

Questa .

(y) E' notissima la quistione insorta fra i medici, nel diffinire, se la pleura od il polmone sieno le parti che soffrono, quando si è malato di dolore laterale pungente, accompagnato da febbre acuta ec. IPPOCRATE, e prima di lui, la sede della pleurisia era nel polmone; di contrario sentimento furono DIOCLE, ERASISTRATO, ASCLEPIADE. Fu in seguito disputato con vario sentimento, fino a che sembrava finalmente decisa colle sperienze ed osservazioni dei due più illustri anatomici della nostra età, HALLER, e MORGAGNI, che la sede della pleuritide fosse nel polmone. Il primo riferisce ne' suoi opuscoli patologici, (*observ. XIII*) la sezione del cadavere di una donna pleuritica, in cui intesa interamente la pleura, visibilmente alterata era quella parte del lobo destro del polmone, che poggiava sul diaframma, ed il cel. MORGAGNI conchiude a questo proposito: *Nunc si nostras omnes, & VALSALVÆ observationes relegeris . . . , facile intelliges, longe proclivius nobis esse, eorum sententia adstipulari, qui lethalem pleuritidem docent in sola pulmonis, id quod sæpe vidimus, quam eorum qui ajunt in sola pleura, id quod nunquam deprehendimus, inflammatione consistere:* (Epist. XXI. art. 37.) Il valente medico napolitano Sig. SARCONI anch' egli concorre col parere dei precitati anatomici, escludendo pure, per favorire la sentenza della sede della pleurisia nella così detta pleura, gli argomenti che si vogliono desumere dagli attacchi del polmone a questa membrana; dal decubito facile, o difficile; dal dolore pungente od oscuro; dal polso duro; dall' infiammazione, e dai danni nella pleura osservati. Altri molti, e questi gravi scrittori ed imparziali anatomici sono di contrario sentimento, che noi ometteremo, niente contribuendo ad eseguire un metodo di cura a preferenza di un altro: CULLEN sotto nome di pneumonia, o di affezione di petto comprende tutte le infiammazioni del petto. asserendo, che con pochissimo fondamento si distingue questa malattia coi diversi nomi presi dalla parte che si suppone essere particolarmente affetta: la parola pleuritide egli dice, può convenire in tutt' i casi, e molto impropriamente è stata limitata a dinotare l' infiammazione che comincia nella parte della pleura, che ricuopre le coste, e le vizia particolarmente. Io non dubito (sono sue parole), che ciò realmente non avvenga; ma nel medesimo tempo suppongo, che questo caso è rarissimo, e che il male comincia molto più frequentemente nella parte della pleura, la quale ricuopre i polmoni; ch' ella affetta particolarmente questa parte, e produce tutt' i sintomi, che si sono supposti appartenere alla malattia chiamata vera pleuritide. Il Tr.

(z) Se la pleuritide è accompagnata da catarro, si chiama da  
.SAU-

Questa infiammazione è sempre accompagnata da violenta febbre continua, da polso duro, da piccola tosse frequentissima, e da pungimenti acuti al lato infiammato, i quali crescono, nell' inspirazione, e si calmano nella espirazione, o quando non si respira.

Si distingue la pleuritide spuria dalla vera, in ciò che nella prima il dolore cresce al tatto. I malati tossono meno, e provano tutt' i sintomi, in grado però inferiore, della vera pleuritide. L' una e l' altra di queste infiammazioni sono per lo più precedute da un grande appetito, a cui succedono i brividi, lo scadimento di forze, ed i sintomi suddetti, accompagnati da molta sete, e da perdita totale dell' appetito. La tosse è secca, o seco trae delle flemme intrise di sangue; ed a misura che i pungimenti crescono, impediscono, intercettano e soffocano sempre più il respiro, e con esso la circolazione del sangue polmonare, di modo che questo viscere s' ingorga come nella peripneumonia, per cui, a misura che il male cresce, la febbre sembra minore al polso.

Le conseguenze che risultano dalla falsa pleuritide, sono o gli ascessi, i quali tante volte si esternano nel luogo del dolore pleuritico; o la vera pleuritide, con disposizione alla peripneumonia; ascessi alla pleura; aderenza di questa membrana al polmone; diversi tumori callosi o scirrofi; empiema, polmonia, e facilità alla recidiva.

Tom. I.

X

SAUVAGES pleuritide catarrale, e pleuritide linfatica dal BIANCHI ( *de hepat. structur. usib*, ec. ): se dai vermi pleurodine verminosa dal primo, e stomachica dal secondo. Se la pleuritide è senza sputo, dicasi secca, e questa è più difficile a guarirsi, come disse IPPOCRATE, CELLIO AURELIANO, TRILLER, ec. *li Tr.*



La pleuritide nella quale la natura ha di già preso forza, operando la risoluzione colla spettorazione, colla diarrea, o col flusso d'orine, com'è stato menzionato all'articolo della peripneumonia leggiera, si cura intieramente come la peripneumonia di questa specie; e siccome la falsa pleuritide è tante volte prodotta da ingorgamento reumatico, si applica un largo vescicante sul centro e nei dintorni della parte addolorata.

La pleuritide finisce ancora col flusso emoroidale, col trasporto delle materie alla coscia, od alle orecchie, con un dolore subitaneo, che si spande sul dorso, sulle omoplate, sulle clavicole, o sulle braccia (aa).

Se avvi apparenza di flusso emoroidale, si fomenta il podice col decotto di malva, e dopo i primi salassi si applicano le sanguette, nel caso vi siano pustole emoroidali. Nella seconda circostanza s'invita l'ascesso alle orecchie ed alla coscia giusta il prescritto all'articolo delle infiammazioni in generale; nella terza, si applica l'impiaastro di meliloto fra le spalle.

Al contrario se la pleuritide fosse nel suo principio, e che la malattia non si determinasse ancora alle suddette crisi, si cava immediatamente dodici once di sangue dal braccio collaterale al dolore. Questo salasso si fa, stando il malato coricato, e con larg' apertura, tossendo, e respirando profondamente, frattanto che il sangue cola. Rispetto al regolamento, basta ogni tre ore un brodo di polte d'avena o di orzo nell'acqua condita con un po' di zucchero; ad ogni mezzo quarto d'ora una tazza della ti-

---

(aa) La pleuritide del lato sinistro, disse LOMMIO, è più pericolosa di quella del lato destro; ma più presto matura, e finisce. *Il Tr.*

sana comune N.º 210., o d'orzo N.º 213., rad-  
dolcite l'una e l'altra coll' offimele semplice, da  
trangugiare appoco appoco, più caldo che sia possi-  
bile, ed inspirandone il vapore; fomentare le gam-  
be col fomento N.º 81., ugnere ogni tre ore il  
lato dolente coll' unguento anodino caldo N.º 131.,  
soprapponendovi una vescica piena per metà di acqua  
calda od il fomento N.º 82.; immediatamente dopo  
il salasso esibire il lavativo N.º 108. da replicarsi  
tutte le sere fino al termine del male. Rispetto ai  
rimedj interni, conviene la mistura temperante N.º  
130., e per sollevare la tosse un mezzo cucchiajo  
da caffè del loc di Parigi, oppure dell' eglemma rad-  
dolcente N.º 44. replicati spesso.

Il salasso sarà immediatamente di dodici alle  
quattordici once; siccome le prime sanguigne non  
fanno che sollevare, e non di rado avviene che i  
dolori rinascono, il replicato salasso è il sovrano  
rimedio della pleuritide da rinnovarsi dopo dodici  
ore nella pleuritide spuria; e nella vera si fa il se-  
condo dopo sei ore di dodici once al piede collate-  
rale; ed in seguito ogni otto ore di sole sei alle  
otto once per volta; continuando per tal modo a  
più larghi intervalli ed in minore quantità, fino al  
quarto giorno della malattia ed anche dopo, se la  
violenza del male e la crosta infiammatoria del san-  
gue lo indicassero, e nulla annunciasse l'una o l'altra  
delle suddette crisi, seguendo nel resto il metodo  
sopra descritto parlando della peripneumonia, la cui  
risoluzione si fa per crisi.

Ma se i segni dinotanti l'infiammazione in-  
clinante all' ascesso, e già esposti all' articolo delle  
infiammazioni in generale, e della peripneumonia  
in particolare, indicassero questo termine inflamma-  
torio, si fa maturare l' ascesso, giusta i precetti dati  
a tal effetto nel suddetto articolo. Se avvi speranza,

di esternare l'ascesso, si applica incessantemente sul luogo, dove nel vigore del male il dolore era fissato, il cataplasmo mollitivo N.º 15.; ed in appresso, quello maturativo. Si dà al più presto possibile sfogo alle materie, mediante un colpo di lancetta, o coi caustici, mantenendo l'ascesso aperto colla conveniente medicazione, e prevenendo con ciò l'empiema, il quale porterebbe alla tisi chezza polmonare. Se per l'aderenza del polmone alla pleura, l'ascesso assale il polmone, ne risulterebbe la vomica, della quale si troveranno i segni diagnostici, le conseguenze e cura all'articolo delle vomiche; e nel caso che l'ascesso traforasse la pleura, e si diffondesse nella cavità del torace, ne nascerebbe l'empiema.

Le riflessioni sulla malattia precedente sono applicabili a quelle quì nominate, mentre i pleuritici muojono per l'ordinario peripneumonici.

I pungimenti pleuritici violenti, dove il sangue cavato non si cuopre di cotena infiammatoria, sono cattivissimi, o perchè il polmone non lascia trapassare che il sangue più chiaro, o perchè la malattia è complicata colla putridità, che ha disciolto il sangue. La speranza ha insegnato, che i vescicanti applicati alle cosce, e fra le spalle, e l'uso del decotto anti-ferico N.º 22., senz'acido minerale, furono in questi casi altrettanto utili quanto perniciosi i salassi.

Gli specifici sudoriferi contro la pleuritide, il genipi, il sangue di stambecco (bb), ec.; sono in-

(bb) *Offia Capra selvatica*: fra i rimedj specifici si nomina ancora la radice di fenega, moltissimo riputata dagli Inglese: ella però produce troppo facilmente il vomito, sempre pregiudicevole nelle infiammazioni. Il cel. Sig. *Andrea PASTA* (lettera intorno ad alcuni rimedj poco o nulla usati dai medici, riferita nella raccolta del



certissimi nei loro effetti, e se riescono una qualche volta in soggetti in cui la natura è già inclinata a terminare la loro qualunque siasi malattia col sudore, ammazzano infiniti altri, condensando il sangue, ed infiammandolo sempre più colla dissipazione della sua più fluida parte; quindi tutte le volte che cotesti sudori sforzati non tolgono immediatamente l'infiammazione, ne sollecitano la gangrena. Al contrario, la cura metodica indicata riesce ordinariamente, i salassi producendo nei vasi un rilasciamento, il quale dispone ad un salutare umidore, che bisogna conservare colla temperatura della stanza ec. I convalescenti si regoleranno come i peripneumonici (cc).

X 3

CALOGERA' tom. 3.<sup>o</sup>.) usa nella pleuritide la filigine, di gran lunga più efficace a tutti quei rimedj, che con tanta pompa e ciurmeria soglionfi ordinare nei mali infiammatorj di petto, data al peso di due o tre danari impastata con giulebbe melino, al peso d'un danajo e mezzo mattina e sera, o stemperata con quattr'once d'acqua di C. B. colla giunta di poco zucchero candi. *Il Tr.*

(cc) Il cel. SARCONÉ, parlando della pleuritide così ragiona: il primo stato di questa malattia (della pleuritide) è il dolore: il secondo è l'infiammazione: il terzo la suppurazione: il quarto la gangrena: la prima indicazione curatoria si desuma dunque dal dolore; questo è il produttore, non il prodotto della infiammazione. Ciò premesso, l'autore, dopo i salassi, le fomentazioni anodine e risolventi, le bevande refrigeranti diluenti, esibisce l'opio disciolto in acqua qualunque.

Affidato alle ragioni e felici effetti di un tanto esimio pratico, tentai io pure l'uso dell'opio nelle pleuritidi comunemente chiamate squisite, cioè a dire, accompagnate da vivissimo dolore; e più animoso di SARCONÉ, senza provar i salassi, prescissi l'opio alla dose di tre grani disciolti in dodici once di decotto d'orzo da prendersi in più riprese in ventiquattr'ore: se il dolore si calmava, ed appariva il sudore, insisteva nella stessa dose; nel caso contrario accresceva di un grano l'opio, e due o tre ancora ogni ventiquattr'ore, se la pelle rimaneva secca, ed il dolore pertinacemente violento. Nei molti casi di vera pleuritide, in cui io praticai questo metodo, nessuno mi andò fallito: di rado oltrepassai i dieci grani al giorno; e con indicibile soddisfazione vidi sempre risolta la malattia col solo opio, e con qualche lavativo ammolliente nei casi di costipazione. Un fenomeno particolare che io osservai sotto l'uso dell'opio

: *Epatitide, ossia infiammazione del fegato.*

L'infiammazione al fegato, che dipende dalla flogistica qualità del sangue, non arriva se non nei regumenti membranosi di codesto viscere; e le infiammazioni che si formano nel corpo del fegato, succedono comunemente ad una preesistente ostruzione.

Quando le membrane comuni del fegato s'infiammano, il malato prova sotto le coste false, alla destra della forcilla dello stomaco un dolore permanente fisso e pungitivo, che cresce al tatto, al respiro profondo, alla tosse ed agli sforzi del secesso: egli è nel medesimo tempo soggetto ad una secca tofferella.

In questa specie di epatitide, appare poco gonfiore all'ipocondrio; ma il malato risente un fisso dolore più o men vivo, che risale e si dilata sul dorso e sulle coste fino all'omoplata destra. Cotali accidenti sono accompagnati da febbre continua acuta, ed il malato, quando specialmente la flogosi tocca il diaframma, soffre singhiozzo e nausea (dd).

La guarigione perfetta delle membrane infiammate del fegato, si opera per risoluzione. Quand'essa manca o si trascura, le conseguenze da temersi, sono le interne infiammazioni del fegato di cui darassi in appresso la descrizione; l'aderenza delle

---

nella pleuritide, fu la estrema debolezza degli ammalati, dopo il quinto, il sesto, od al più il settimo giorno della malattia; tempo in cui dessa è interamente cessata: questo scadimento di forze è tale, che il polso è appena sensibile; gli ammalati non possono sostenere la mano per bere, o per prendere alimento, ed hanno una voce fiacca, stentata. In questo caso si deggiono nutrire con brodi sostanziosi, accordando pure qualche pò di vino prelibato, per cui appoco appoco riprendono lena e vigore, e stabilmente guariscono. *Il Tr.*

(dd) Le più volte si gonfia evidentemente la parte dove risentesi il dolore. *Il Tr.*

membrane infiammate al peritoneo ed al diaframma; la suppurazione di queste parti; l'empima, se l'ascesso si scarica nel torace; e se invece l'ascesso invade i tegumenti della regione ov'egli si è formato, la parte viziata si gonfia. Se non si apre l'ascesso in tempo, si accorge ben presto della fluttuazione, e la materia faffi strada con pertugi fistolosi, ec.

Quando l'infiammazione è profonda, od è l'effetto di una ostruzione precedentemente formata nell'una o nell'altra parte della sostanza del fegato, il dolore è sordo, il fegato è gonfio al segno che il tumore è sensibile nell'ipocondrio destro, e soventi ancora è duro, e di un volume considerevole; il malato prova un senso di peso, e di stiramento all'ipocondrio destro; ha delle vampe di calore alla faccia, difficoltà di respiro, e qualche volta i sintomi della itterizia. Egli è soggetto a nausea, vomiti, tenaci costipazioni nei primi giorni del male, ed a suffeguente diarrea. Le orine sono colorate, mattonose, e poche; si trova male a letto, massime se giace sul lato sinistro. La febbre in questa specie d'epatitide è meno considerevole che nella prima.

Le conseguenze di cotesta epatitide sono gl'ingorgamenti delle viscere, delle quali il sangue si scarica nella vena porta, la suppurazione del fegato, l'idrope purulenta e ventosa del basso ventre, il flusso epatico, la consunzione, lo scirro, ec.

Nell'epatitide leggiera ed in cui la natura opera la risoluzione critica coi sudori abbondanti, col flusso d'orine spesse, colla diarrea biliosa, o colla emorragia della narice destra (ee); con notabile sol-

X 4

---

(ee) Questa emorragia dalla narice destra è stata osservata salutare nella epatitide da IPPOCRATE, da GALENO fra gli antichi; da DURETO, BOERHAAVE, VAN-SWIETEN, e NEIFELD fra i moderni. *Il Tr.*



lievo dell' ammalato , si ajutano quest' evacuazioni giusta i consigli dati a questo effetto all' articolo dei sintomi febbrili in generale: il regolamento dell' ammalato sia il liquido della lettera H.; e se l' epatitide fosse molto leggiera , quand' anche la natura non avesse tuttora cominciata l' una o l' altra delle suddette critiche evacuazioni , ci prenda soltanto, aspettando queste crisi favorevoli, la mestura temperante N.° 130., beendo molto fiero di latte , od in sua vece, alla mattina , una quantità di tisana di cremore di tartaro N.° 211., bastante per iscaricare due volte in 24. ore ; e bere negl' intervalli molta tisana comune N.° 210., o d' orzo N.° 213. raddolcite l' una e l' altra coll' ossimele. Dassi ancora mattina e sera il lavativo domestico N.° 108.; e si fomenta l' ipocondrio destro col fomento risolvente N.° 83. Ma s' egli avvenisse , come pur troppo avviene nei primi quattro giorni del male , un dolore quantunque leggiero alla milza , bisogna in allora fomentare i due ipocondrj. Egli è 'in siffatto modo che si trattano gli ammalati di epatitide leggiera , fino a che il fegato sia interamente disimpegnato .

Ma se l' infiammazione fosse violenta , e che la natura non effettuasse nè l' una nè l' altra delle suddette evacuazioni critiche , si principia immediatamente dal salasso al braccio , dal regolamento , mestura , bevande , fomenti e lavativi sopra nominati ; e questi ultimi avvalorati con due dramme di nitro ; si fomentano le gambe col fomento N.° 81., e si continua il tutto fino a che la risoluzione dell' infiammazione sia fatta ; o che la natura siasi determinata coll' una o coll' altra delle suddette crisi , da ajutarfi come si è detto .

Rispetto al salasso , a meno di un cangiamento evidentissimo in meglio , ed in aspettazione delle

evacuazioni critiche, si replica dopo dodici ore al piede; dopo di che, se l'infiammazione fosse nelle membrane del fegato, si cuopre ampiamente il lato dolente col vescicante N.º 63., mantenendone la suppurazione per tutto il corso del male, coll'empiastro di meliloto puro, o se abbisogna con un quarto di empiastro vescicante (*ff*). Si fomenta costantemente l'ano con una spugna inzuppata nel decotto caldò di malva, e presentandosi pustole moroidali, si aprono, o vi si applicano le sanguette in diverse volte: se non vi fosse questa indicazione si replica il salasso al piede giusta il bisogno (*gg*).

Quando per la violenza del male, o per la trascuranza dei consigli indicati, come anche in vista dei segni della suppurazione riferiti all'articolo delle infiammazioni in generale; o che la itterizia che siegue la febbre infiammatoria continuasse a sussistere, si può presumere che l'infiammazione passa in ascesso. In tali casi si cerca, tutte le volte che l'infiammazione affetta la parte convessa del fegato, di esternare la postema, applicandovi sulla regione dapprima più addolorata, o che sarà gonfiata, subito il cataplasmo mollitivo N.º 15., ed in seguito il maturativo animato N.º 18.; aperto l'ascesso, si procura, secondo l'arte, al più presto possibile fortita alle materie (*bb*); il malato stia al regola-

(*ff*) Il vescicante applicato sul luogo dolente è moltissimo commendato da PRINGLE; e MURRAY nella sua *diff. de hepatitis*, è tanto persuaso dell'efficacia del vescicante posto al luogo affetto, che conchiuse: *reliquis cuicumque generis medicamentis palmam præripere videtur. Il Tr.*

(*gg*) Vedali a questo proposito la mem. di PETIT figlio riportata nel t. II. dell'Accad. di Chir. p. 267., e *Jour. de Médéc.* t. XXXVIII. p. 44.

(*bb*) Il Sig. Andrea MURRAY nella citata *diff. de hepatitis*, suggerisce la cacciata di sangue parziale, come più efficace a togliere la tensione, l'infiammazione, il dolore, e la difficoltà di respirare; e questa fatta colle sanguisughe, e colle ventose scarifica-

mento latteo della lettera G.; prenda per tutto rimedio, il decotto anti-setico N.º 22. facendosi medicare questi fastidiosi ascessi da un abile chirurgo.

Se l'ascesso per lo contrario si apre e si scaricano, le materie nella cavità dell'addomine, formerà un ascite e timpanitide incurabili; e le materie purulente si evacuano per la via degl'intestini, ne seguirà una diarrea colliquativa o vomiti purulenti deffi pure incurabili. Dacchè il pus si diffonde nella massa del sangue, ed il malato è preso da pericolosi sfinimenti, farà in forse di sua vita (ii).

te: lo stesso autore raccomanda di non prescrivere rimedi sudoriferi, massime sul principio della malattia; appena questi ponno convenire quando la febbre è alcun poco scemata, ed il corpo sia inclinato già al sudore, avvertendo non pertanto, che cotali rimedi sudoriferi non sieno stimolanti, e fra questi egli predilige il giulebbe salino della farmacopea d'Edimburgo, e lo spirito del MINDERERO: rispetto agli emetici, vorrebbe MURRAY, che soltanto fossero ordinati nel principio del male, ma però *ubi malum nimis procectum videtur, propter stimulos, quos aserunt, inflammationi infesos quibus obstructions hand dubie augentur; inflammatio increfcit, alique pessimi effectus inducantur, summa cum cautione post tertium, vel quartum morbi diem, praesertim si gravia inflammationis symptomata sunt, adhiberi debent*. Nell'India orientale, dove l'epatitide è malattia epidemica, per impedire, che non degeneri in suppurazione, si usano come rimedio specifico, i mercuriali; e con tale profitto, che in quattordici giorni, od al più in tre settimane si vince la malattia. MATTHÆWS (*observations on hepatic diseases, ec.* London 1783. 8.) deducendo dalla rassomiglianza del sangue che si eltrae nella lue venerea, e nell'epatitide, l'analogia di queste due malattie, insiste sopra l'uso del mercurio nell'epatitide. Se si cerca la ragione, per cui giovano i mercuriali nella epatitide, il precitato MURRAY, dice di non saperla; *quomodocumque res se habent, certissimum est, in huius mali curatione istud remedium genus plurimum valere, & quamvis, quo operetur, modum ignoremus, nihil tamen inde laudis medicamento detrahatur, sufficit, si quid fiat, intelligamus, etiam si quomodo fiat, ignoremus*. " Il Tr.

(ii) Un fenomeno particolare, e forse non abbastanza inteso è l'ascesso del fegato consecutivo alle ferite della testa. Si è cercato di ricercare la cagione di un tale accidente nella simpatica affezione dei nervi, o veramente nella metastasi della materia purulenta: rispetto alla prima ipotesi, siccome alle parti vicine al fegato medesimo, alle quali si propagano i nervi di questo medesimo viscere, non avviene mai lo stesso effetto; e nel secondo supposto, non dovrebbe nascere ascesso al fegato, quando non vi fosse suppurazione alla te-



L'itterizia per ostruzione del fegato, e lo scirro per epatitide, sono i più ostinati. Si può tentare

sta; così sì l'una che l'altra cagione viene da tutti abbandonata. Il cel. BERTRANDI (*memoir. de l'Accad. R. di Chirurg. edit. in 4. t. 3. 1757. p. 484.*) opinò poter derivare quest' affezione dal vizioso circolo del sangue. Ma non in ogni ferita della testa si trova suppurato il fegato, ed invece altre parti contenute nella cavità dell'addomine si sono trovate investite da infiammazione, e da suppurazione; siccome pure si è rinvenuto nessun ascesso al fegato, dopo le ferite di testa, MOLINELLI (*commentar. Bonon. t. 2. p. 1. p. 158*); MORGAGNI non solo ha veduto, dopo le ferite di testa suppurarsi i visceri dell'addomine, ma quelli ancora del torace (*de sed. & caus. morbor. epist. LI. LII.*) POUTEAU volle, che l'ascesso del fegato dopo le ferite della testa derivasse da un sopraccarico di sangue determinatovi dalle arterie, le quali, a motivo del disordine e vizio contratto dalle parti solide del cervello, per cui si rende assai difficile il tragitto del sangue per esso, ricevano per l'aorta discendente una maggiore quantità di sangue, che non nello stato naturale, (*œuvres posthumes t. 2. p. 111.*). A queste diverse teorie ne soggiunse una terza DAVID, colla quale supponendo, che in conseguenza delle ferite della testa si cangi la direzione dei vasi proprj di quella parte, vi passi perciò una minore quantità di sangue, la quale rimanendo nel ventricolo sinistro del cuore, non potendo pienamente e liberamente svotarsi la orecchietta sinistra, nè in quella le vene polmonali, rimanga una maggiore quantità di sangue nelle arterie polmonali nelle quali pure non si ponno colla medesima libertà scaricare il ventricolo, e l'orecchietta del destro lato, nè in questa le vene cave, onde s'ingorghi nella cava ascendente, e nei più prossimi vasi al cuore, cioè nelle vene epatiche, onde la formazione dell'ascesso al fegato, (*dissert. sur les effets, & sur la maniere d'agir des différentes sortes de saignées. Paris 1762. 3.*) A queste opinioni dei due chirurghi francesi rispose il cel. BERTRANDI con sua apologia, riferita nel t. 1. delle sue opere anatomiche ec. Torino 1786. Giudiziosa, e molto sensate riflessioni sopra un tal punto teorico si ponno leggere fatte dall' esimio autore del Giornale di medicina di Venezia nel t. 1. p. 241., e seg.

L'ascesso del fegato è sempre pericoloso, e di difficilissima guarigione: di rado succede una lodevole suppurazione, e la materia che ne sorte, è per lo più di cattivissima indole; onde AEZIO disse: *omnino consimilia ex hepatis ulceribus promanare solent his, quæ a mortuorum corporibus destillant*. L'ascesso del fegato genera tante volte la tifezza, così detta epatica, di cui ne abbiamo un dottissimo opuscolo di SCHROEDER, stampato in Gottinga nel 1783. Quando la malattia è arrivata a questo passo, il fegato interamente si consuma. nasce una purulenta diarrea, l'ammalato muore: *qui casus (ubi hepar consumitur), nullam medelam, vix palliationem capit*, disse il grande BOERHAAVE, ed il suo commentatore VAN-SWIETEN, dopo aver detto della inutilità dei rimedj d'ogni genere, conchiude anch' egli: *sola mors tot malorum finem facere valet*. Il Tr.

ciò che è stato indicato per l'ostruzione e scirro del fegato negli articoli che trattano di queste malattie. I convalescenti dell'epatitide si regoleranno come quelli, che risorgono dalle due precedenti malattie.

*Infiammazione della milza ossia splenitide.*

L'infiammazione della milza si fa o nelle membrane, che avvolgono questo viscere, o nella sostanza medesima. Nel primo caso il malato risente nell'ipocondrio sinistro i medesimi sintomi caratteristici della prima specie d'epatitide, e le consecutive conseguenze non ne differiscono guari. Quando al contrario invade la sostanza della milza, l'infiammazione si manifesta come la seconda specie d'epatitide, a riserva dei sintomi particolari, che dipendono dal sito dei due visceri e dall'interrompimento e rigurgito della bile nel sangue, da cui ne nascono pure diverse conseguenze.

L'infiammazione della milza si tratta secondo le sue diverse sedi e gradi come quella del fegato; a riserva che nelle persone emoroidarie conviene alternare i salassi coll'applicazione delle mignate al podice.

L'emorragia critica del naso succede dalla narice sinistra; e siccome la milza, dopo la infiammazione, è soggetta ad ostruirsi, questa si previene non che lo scirro praticando di buon'ora nei convalescenti il già raccomandato per l'ingorgamento ed ostruzione del fegato.

I vomiti di materie nere, od il flusso emoroidale che sopraggiungono innanzi il quarto giorno di questa malattia, sono per lo più una crisi salutare (kk). Si faciliteranno quest'evacuazioni, seguen-

---

(kk) Vomitus niger criticus in hepatitide metnendus, in splenitide, baud contemnendus creditur, de MEZA, lib. Tr.

do gli avvifi dati per la cura dei sintomi febbrili in generale; ed i convalescenti faranno regolati come i peripneumonici.

### *Infiammazione del mesenterio (II).*

Quando l'infiammazione del mesenterio non è complicata con quella degl' intestini i malati provano soltanto nel basso ventre un fordo dolore, imbarazzo, e peso ordinariamente accompagnati da febbre leggiera niente incomoda. Questa consiste principalmente in brividi alternanti con vampe di calore maggiori qualche tempo dopo i pasti. I malati scaricano dopo alcuni giorni sierosità rossigne in seguito mischiate da un po' di pus (*mm*).

Le conseguenze da temersi sono le infiammazioni degl' intestini, gli ascessi e le ulcere al mesenterio la diarrea colliquativa, l'etisia coll' indurimento scirroso delle glandole mesenteriche.

Se si conosce questa infiammazione la quale inganna le molte volte, avanti finisca in ascesso, si salaffa il malato; si mette al regolamento liquido della lettera H., al siero di latte, o tisana comune N.º 210.; si dà mattina e sera il lavativo domestico N.º 108., ed internamente la mestura temperante N.º 130.: si fomenta il ventre col fomento risolutivo N.º 83.; o si fanno i fomicapj un po'

(II) Ossa mesenteritide. II Tr.

(*mm*) Benedetto SILVATICO così scrisse sopra le malattie del mesenterio: *mesenterium saepe fit sentina multorum excrementorum. Ac obtusi sensus quum sit, diuturnas tolerat affectiones, & in quo non raro suboriuntur apostemata suppurantia, qualia frequentissime a me fuerunt observata, quae tandem subsidebant per defectiones purulentas, iterumque statim temporibus recurrabant, & oblitescabant denno per similes defectiones, non raro cruentas, ita ut imposuerint quibusdam illas pro dysentericis habentibus* (cent. II, obs. LXXXVI.) II Tr.



più caldi che tiepidi della medesima composizione, ed ogni tre dì si purga colla pozione mannata N.º 167.

Ma se le materie purulente, ch'ei rimette colle fecce, indicassero; che l'infiammazione è passata in ascesso, il malato prenda per cibo e rimedj, ogni due ore una tazza di latte alterato con due parti d'infusione balsamica N.º 100.: la bevanda sia una infusione di parti eguali di fiori d'iperico e di margheritine, raddolcita col mele; un giorno sì e l'altro nò, un lavativo di latte con parte eguale d'acqua, ed un cucchiajo di mele; mattina e sera, internamente il balsamo del Locatelli N.º 5. nuovamente preparato, tanto come una noce moscata, soprabbevendo una tazza della sopraddetta infusione.

Se la malattia fosse ribelle si sostituisce all'infusione balsamica le acque di Vals, o quelle di Spà, in proporzione di un terzo sopra due terzi di latte, da continuarsi fino alla guarigione, avvertendo quando la febbre lenta è considerevole, di tagliare il latte con un terzo di decotto di chinachina fatto con due once di questa scorza, sopra tre libbre d'acqua, ridotte a due libbre, mantenendo costantemente l'addomine coperto d'impiastro del sapone del Barbetta, o di cicuta.

Questa infiammazione si forma di rado senza che il mesenterio sia stato precedentemente ostrutto, e l'ingorgamento di queste glandole sono per lo più la sede della flogosi.

#### *Infiammazione dello stomaco (nn).*

L'infiammazione dello stomaco si manifesta da un fisso dolore sulla forcilla dello stomaco, più

o men vivo e pungente, che maggiore cresce alla pressione. Per lo più i malati rimettono al momento gli alimenti presi, ammeno che l'orificio superiore non sia ferrato, e come sigillato. In questo caso, gli alimenti, dopo aver prodotto alcune nausea si precipitano prontamente, e cotai sintomi sono accompagnati da febbre continua sensibilissima al polso, mentre che l'infiammazione è leggiera, e si manifestano meno, quand' ella è considerevole, il malato avendo, in questi casi, il polso debole, piccolo e frequentissimo. Le estremità sono fredde, e l'infiammazione dello stomaco è sempre accompagnata da singhiozzo e da una sì grande debolezza, per cui ad ogni momento s'viene: per lo più orina poco. Questa malattia è pericolosissima: qualche volta finisce colla suppurazione, spesso degenera in scirro, ammeno che la cangrena non ammazzi (oo).

Si salassa dal braccio: subito dopo, e frattanto che l'ammalato vomita materie indigeste catarrose o biliose, bea molt' acqua tiepida, e cominciando a vomitare acqua chiara si replica il salasso; si fomenta la regione dello stomaco col fomento risolvante ed ammolliente N.º 83., beendo molte tazze di siero di latte tiepido od infusione di fiori di malva, ed in sua vece l'infusione di linseme, raddolcita con un po' di siroppo di viole. Si replica il

(oo) L'infiammazione dello stomaco è più familiare, che non si crede dal volgo de' medici. E' sempre un male pericolosissimo, perchè si tratta di un viscere troppo necessario, sempre interessato per le azioni dell'economia animale, e delicatissimo per la quantità dei nervi, dei quali è dotato; onde nasce una generale alterazione di tutto il corpo, e specialmente della testa, come disse GALENO: *nam ventriculus capiti, & caput ventriculo suas affectiones transmittit, propter nervorum ab encephalo ad os ventriculi descendentium magnitudinem, per quos etiam sensus huic parti, quam ulli reliquarum corporis partium, acutior est: (de locis affectis lib. III. cap. IX.) Il Tr.*

salasso ogni otto ore, ma colla precauzione di levarne tanto meno per volta, quanto farà debole l'ammalato, applicando nel mezzo dei salassi il lavativo domestico N.° 108.

Rispetto al regolamento, nel caso che il malato non ritenga i brodi diluti di poltiglia acquosa, prenda ogni tre ore un cucchiajo di gelatina di carne. Se continuasse a vomitare dopo il terzo salasso, si applica sulla bocca dello stomaco, un impiastro vescicante, e se non ostante la vescica alzata continua il vomito, si prescrivano le gocce anodine N.° 89. da replicarsi ogni sei ore fino a cessazione del vomito; e se questi medicamenti fossero infruttuosi, si tenta la mistura d'aria fissa N.° 123., non lasciando però i rimedj e metodo sopraccennato.

Nelle grandi debolezze si ricorre alle acque odorifere, allo spirito volatile N.° 75., ed alla mistura cordiale N.° 124. Cessato il vomito, l'ammalato continui soltanto le bevande da prendersi a forsi; i lavativi ed i fomenti nominati da soprapporli al vescicante; ogni quattr' ore una tazza di brodo chiaro, per sostentarli; e quando i dolori faranno assolutamente dissipati, e la febbre sul declinare, si purghi colla pozione mannata N.° 167.

Se invece di risolversi l'infiammazione sopravvenissero sintomi indicanti la suppurazione riferita all' articolo delle infiammazioni in generale, e che l'ammalato fosse ripreso da nausea e da vomiti con imbarazzo allo stomaco, cessati i dolori e la febbre, affine di far maturare l'ascesso, come anche per detergere la susseguente ulcere, bea ogni quarto d' ora una tazza d' infusione di fiori di malva rad-dolcita collo sciloppo d'altea; sulla bocca dello stomaco pongasi il cataplasma mollitivo N.° 15., e si cibi di latte unito a parte eguale d'acqua d'orzo, fino a che si rimettano materie purulente o per secesso



fecesse o per vomito, nel qual caso si taglia il latte coll' infusione balsamica N.º 100.; e se quest' ulcera fosse ostinata, l' infermo usi il regolamento e i rimedj prescritti per il medesimo caso nella cura della mesenteritide; invece del latte col decotto di china, può prendere per abbattere la febbre lenta i lavativi febrifughi N.º 110.

Passata l' infiammazione in scirro, l' infermo, dopo avere trangugiato qualche cosa di solido o di sapore un po' forte, risente dolore allo stomaco, e nausea che lo eccitano a fare sforzi violenti per vomitare. In questo caso non avvi migliore spediente che un lungo uso delle acque termali saponacee N.º 3. unite ad un quarto di latte, e per bevanda ordinaria la infusione di fiori di malva raddolcita col mele bianco. Se il male resiste a codesti rimedj, o s' egli è invecchiato, si getti alla dieta lattea per ogni resto di vita, giusta le direzioni date sotto la lettera G.

Siccome l' infiammazione dello stomaco non che quella degl' intestini, di cui si parlerà nel susseguente articolo, possono dipendere dalle materie caustiche, in tali circostanze bisogna adoperarsi sulla cagione, investirla e cacciarla coi diversi mezzi indicati, parlando delle acrimonie e dei veleni.

I convalescenti faranno purgati dolcemente colla manna e coll' olio di mandorle dolci alla dose di due once per ciascheduna diluite nel siero di latte: il loro regolamento per i primi otto giorni sarà il liquido specificato sotto la lettera H.; avvertendo di usare gli alimenti più dolci di codesto regolamento e pochi per volta.

*Infiammazione degl' intestini (pp), ossia colica  
infiammatoria.*

L' infiammazione degl' intestini è frequentissima, e la si confonde spesso con grave pregiudizio dell' ammalato, colle diverse specie di coliche, delle quali si parlerà in seguito, e che non sono infiammatorie. I sintomi variano secondo la sede, estensione, grado, e progressi dell' infiammazione. Qualche volta questa malattia è complicata con l' infiammazione di un viscere del basso ventre.

L' infiammazione degl' intestini si annuncia da un dolore e calore più o meno considerevoli nell' interno del ventre: il dolore è permanente, fisso, più acuto alla pressione. Il malato ha il ventre teso con raddoppiamenti di dolore al tatto, accompagnati da borborigmi, da tormini, da nausea, e da vomiti: è alterato, collipato; rimette poche orine; è debolissimo; e cotali accidenti sono seguiti da febbre continua, la quale per lo più comincia con freddo, e questa meno si conosce dall' agitazione del polso, quanto l' infiammazione è più considerevole. Quand' essa è viva, il dolore è crudele con singhiozzo, e sintomi convulsivi (qq).

(pp) Ossia enteritide: SAUVAGÈS distingue due specie di enteritide: quella degl' intestini tenui, *enteritis iliaca*, e quella dei crassi, *enteritis colica*. Il Tr

(qq) Molte volte in questa malattia mancano i segni patognomonici, che la indicano, come ci accerta il cel MORGAGNI; e prima di lui GALENO disse: *ab initio horum affectuum distinctio difficilis est, quo tempore neque magnam praesidiorum differentiam ipsi requirunt*; e buon per l' ammalato, che anche nell' equivoco la cura è sempre la medesima, come lo stesso GALENO soggiunge: *qua propter in curatione nullum augurandum est damnum nobis evenire, quod in se primo horum morborum insultu difficulter illos discernamus; tunc enim neque externis, neque internis differentibus egent auxiliis, sed sufficiunt ea solum, quae dolorem leniant*, (de loc. affect. lib. VI. cap. II.) Il Tr.

L'infiammazione degl'intestini degenera qualche volta in volvolo, e se non si risolve, il dolore cessa improvvisamente, e la parte si cangrena, o cade in alcesso; l'intestino si ulcera, e svaniti gli accidenti della prima malattia, gl'infermi, invece di farsi convalescenti, scaricano materie purulente; continuano più o meno a soffrire; e se l'ulcera è consistevole, nasce la febbre lenta che li porta all'etisi; l'infiammazione trapassa anche in scirro, se invade le glandole intestinali.

Si salaffi immediatamente colle precauzioni raccomandate parlando dell'infiammazione dello stomaco, dando a bere molto siero di latte, oppure l'infusione di linfeme col siroppo di viole; ogni tre ore si dia un lavativo di siero di latte o di decotto di linfeme; e nel caso non si riteneffero per qualche tempo i lavativi interi, si esibiscano a metà dose.

Se i dolori sono violenti s'introduce pel piodice un capo di papavero; e se la costrizione del forame ne impedisse l'applicazione, per rilasciarlo sfintere, s'injetta prima con una piccola sciringa qualche cucchiajo d'olio. Fra un lavativo all'altro, si dà a trangugiare tre once d'olio di mandorle dolci, oppure un' eguale quantità d'olio vergine, unito con un' oncia di siroppo di viole, ed immediatamente dopo i lavativi si porge un brodo di vitello chiaro alterato col cremore d'orzo, fomentando nel medesimo tempo tutto l'addomine col fomento risolvente N.º 83., avvertendo di servirsi di una flanelle semplice per non irritarlo col peso; e se il dolore fosse molto concentrato, tutte le volte che si cangia il fomento, si unge con unguento d'altea il luogo più investito dal dolore (rr).

Y. 2

---

(rr) CELSO riconosceva tanto utili le fomentazioni in questa



Il salaffo si replica una o due volte ogni dodici ore, e sempre dal braccio, di sole sei ad otto once, continuando altronde tutto ciò che è stato raccomandato fino che il dolore sia molto diminuito (*ff*): allora si comincia a purgare con due once di manna, ed altrettanto di olio di mandorle dolci disciolti e diluiti in una tazza d'acqua; e se con questi mezzi e coi rimedj ausiliarj indicati il dolore non fosse sufficientemente calmato, dopo il terzo salaffo si ordina un semicupio d'acqua-crusca un po' più calda che tiepida, da restarvi il maggior tempo possibile, e nel sortire, se non vi è sollievo, si danno le gocce anodine in una tazza d'acqua calda; ed un' ora dopo un brodo; e se la prima presa delle suddette gocce avesse alcun poco sollevato, si rinnovano ogni sei ore, continuando nel medesimo tempo tutto il già prescritto, fino a sufficiente calma del dolore per poter purgare nel modo sopraddetto (*tt*).

Fatto convalescente, se l'ammalato è soggetto alle infiammazioni intestinali, si replica ogni otto giorni il nominato lassativo, e fra gl' intervalli prenda per un mese mattina e sera il latte con parte eguale d'infusione di fiori di margheritine; s'egli fosse di temperamento bilioso, preferisca a questo latte il siero vaccino, ed in seguito i replicati semicupj un po' più caldi che tiepidi.

malattia, che disse: *calida cataplasmata admove, eaque imponere ananims usque ad inguina, & spinum; ac saepe mutare; anzi totum hominem in calidum oleum demittere*, ( lib. IV. cap. XIII. ) *Il Tr.*

(*ff*) Diminuito coi suddetti mezzi il dolore, e calmata l'infiammazione, PRINGLE suggerisce di applicare un largo vesicante sull'addomine, ciò che io pure praticai in due occasioni con esito felicissimo. *Il Tr.*

(*tt*) TRALLES consiglia di alternare gli opiatj coi purganti, per soddisfare contemporaneamente alle due indicazioni, e di calmare il dolore, e di sgombrare gl'intestini dei cattivi umori. *Il Tr.*

Gli scirri delle glandole intestinali vengono tante volte in seguito a questa malattia, e producono le coliche croniche. Ciò è che succede, quando una viva infiammazione non è nè risolta, nè suppurata. I malati provano allora nel luogo stato infiammato un dolore sordo ed un piccolo stiramento, il quale raddoppia dopo i pasti, o frattanto che si esercitano un po' violentemente. Questi scirri sono meno soggetti ad irritazione che gli altri; il malato dimagra; ma con un esatto metodo può vivere assai lungamente.

*Infiammazione delle reni (uu).*

L'infiammazione delle reni è comune soprattutto a quelli che sono attaccati dalla renella. Quand'è forte, è molto pericolosa. Questa malattia si manifesta con un dolore fisso e permanente all'uno o ai due lati della spina del dorso un poco al di sotto delle ultime coste; se è leggiera il malato soffre poco, ma egli ha della pena a reggersi diritto; e più il dolore è vivo, più la febbre è continua ed acuta. A questi sintomi si unisce un dolore al pollice e l'intirizzimento della coscia collaterale al rene infiammato. Nei maschi il testicolo convicino si alza con dolore; il ventre è teso, chiuso; il malato ha dolori colici, rutti, venti, nausea, ed un ostinato e violento vomito, frequenza di urinare, e le orine sono chiare, e nel vigore del male si sopprimono interamente; l'alito e la traspirazione mandano un odore orinoso, e quando la malattia è nel suo declive, le orine sono copiose e sedimentose, o cariche di sabbia, di renella, non che di sangue e di materie purulente.

V 3

La malattia rivolta in ascesso produce gli accidenti proprj dell'ulcera delle reni; e quando il corpo glandoloso di un rene s'inscirrisce, la coscia collaterale diventa appoco appoco paralitica (xx).

La cura delle infiammazioni delle reni è come quella degl'intestini. La prima richiedendo più salassi, si fanno altrettanto più generosi e più vicini gli uni agli altri, quanto la febbre ed il dolore sono più vivi. Il malato raddolcisca le sue bevande collo sciloppo d'altea sciogliendovi ogni due ore sei grani di purissimo nitro, ed unga la regione delle reni cinque o sei volte al giorno con unguento tiepido d'altea. Fatte lotolente le orine si usino i semicupj di acqua-crusca un po' più caldi che tiepidi per facilitarne lo scolo, beendo a piccole riprese e nel modo sopportabile; frammettendo alle bevande qualche tazza d'infusione di radice d'altea raddolcita col medesimo siroppo. Calmati i dolori si purga colla pozione mannata N.º 167.; e dopo la prima purga s'infonde nei suoi brodi qualche pizzico di cerfoglio e di petrosेमоло. Durante il corso del male lasci l'infermo di giacere sul dorso per non riscaldare le reni; e siccome nell'infiammazione proveniente da renella le scosse del vomito contribuiscono molto a precipitarla invece di calmare il vomito che potesse nascere, lo si facilita anzi con molt'acqua tiepida. Se l'infiammazione renale sopravviene all'uso delle cantarelle per vescicante, o di qualche medicamento acre, il malato bea molt'acqua di linseme emulsionata colle mandorle e semi di zucca o di mellone. A questo modo la flogosi nefritica si risolve, quand'anche fosse vio-

---

(xx) Di rado questa infiammazione si risolve: suole ammazzare in sette giorni, e nei vecchi principalmente colla gangrena. *Il Tr.*



lenta o prodotta da un calcolo liscio e di grossezza di potere precipitare per gli ureteri nella vescica.

L'infiammazione delle reni trascurata o mal curata, ed il dolore ed i sintomi suffidenti con violenza dopo il settimo giorno, senza che l'ammalato renda molte urine sabbionose, melmose, o molto sangue per la via delle moroidi, cade in ascesso e vi succede al dolore infiammatorio un senso di pulsazione accompagnato da brividi e peso alle reni. In tal caso si accelera la maturazione dell' ascesso continuando il metodo, i lavativi, l'unzione e i fomenti succennati, beendo molte tazze d'infusione di malva col siroppo d'altea, e regolandosi in questo modo sino a che le urine cominciano a condurre del pus. Allora si purga colla suddetta pozione mannata da replicarsi ogni sei giorni, frammettendo fra le purghe per tutto pasto e bevanda, ogni quattr' ore, mezza libbra di siero di latte con parte eguale d'infusione balsamica N.º 100., e mattina e sera immediatamente dopo la prima ed ultima dose del latte una dramma del balsamo del Locatelli N.º 5. o sei gocce di balsamo copaiva con un pezzetto di zucchero. Se l'ascesso degenera in ulcera ostinata, il latte si unisca a metà d'acqua minerale di Spà, non desistendo per lunghissimo tempo da un siffatto regolamento.

Nel caso che l'infiammazione renale degeneri in scirro, ed il malato diventi zoppo o paralitico nella coscia collaterale, se il male è recente, prenda indilatamente le acque e bagni saponacci, e naturalmente caldi riferiti sotto il N.º 3., dai quali avendone sollievo, protragga l'uso più ch'è possibile; e se l'infermo è inclinato all'eticezza usi contemporaneamente la dieta lattea prescritta sotto la lettera G., coi quali mezzi non arrivando a guarire nascerà l'idrope pur troppo facilmente succedanea allo scirro delle reni.

Allorchè l'infiammazione delle reni è prodotta da grossa pietra acuta, o da calcolo renale, si conosce dalla complicazione dei sintomi infiammatorj, con quelli descritti all' articolo del calcolo renale e da regolarli del pari. I convalescenti di questa malattia, e soggetti alla renella, affine di prevenire la recidiva, non omettino di usare il raccomandato per distruggerla.

*Infiammazione della vescica (yy).*

L'infiammazione della vescica è frequente: dipende qualche volta da un calcolo bitorzoluta od innestato in questo viscere, o dal rattenimento forzato delle urine, e dal rigurgito del sangue emorroidale nella vescica.

Questo male si manifesta da un costante e vivo dolore nell' osso catino, il quale cresce alla pressione fatta sulla regione del pube, e su quella del perineo.

Questi accidenti sono accompagnati da una febbre continua più o meno acuta, e da un frequente ed incessante bisogno d'orinare, non che di andare al cesso; ed il malato non rende che poche urine con molto dolore, rimanendo dopo l'orina senso di ardore al fine dell' uretra; e se l'infiammazione è violenta si sopprimono le urine con ambascie crudeli accompagnate da vivo dolore, che si stende dalla vescica alle reni lungo le direzioni degli ureteri, con vomiti biliosi (zz), e trasporti al cervello, ec.

(yy) *Offia cistitide. Il Tr.*

(zz) *Offervò CELSO che quasi sempre nelle malattie della vescica, il ventricolo pure ne risente, e soffre: non ignoramus, egli dice, orto vesicæ ulcers, sæpe affici stomachum, cui cum vesica quoddam consortium est, ex quo fit, ut neque retineatur cibus, neque, si quis contentus est, concoquatur, neque corpus alatur, (lib. 7. c. 27.) Il Tr.*

Se non si risolve l'infiammazione, le conseguenze a temersi, sono l'ascesso al perineo e all' interno della vescica, il quale degenera in ulcera o in scirro con perdita involontaria delle orine (aaa).

Qualunque ne sia la causa dell' infiammazione, bisogna al più presto cercare di risolverla, usando a questo effetto i salassi, i rimedj interni ed i lavativi raccomandati per le infiammazioni delle reni.

I due primi salassi faranno generosi fatti dal braccio; e se il male dipende dal rigurgito del sangue emorroidale si alterneranno coll' applicazione delle sanguisughe al podice preferendo in questo caso il fomento risolvente ed anodino N.º 82. d' applicarsi ampiamente sul pube e sul perineo. Se la vescica fosse piena si svuoterà col catetere, o colla puntura, se non è introducibile.

Distrutta l' infiammazione si penserà al mezzo di distruggere la cagione che l' ha prodotta. Nel caso che il tumore al perineo si disponesse all' ascesso si regolerà secondo l' indicato all' articolo delle infiammazioni in generale. Finalmente se la soppressione delle orine fosse totale, ostinata, e che la vescica, non ostante i bagni, restasse chiusa e turgida, s' insisterà nei mezzi annunciati fino a che sia svuotata. Rispetto all' ulcera, si tratterà come quella delle reni; e se si fossero formate delle fungosità allo sfintere si manteranno depresse colle candelette le meglio adattate allo stato del male (bbb).

(aaa) Riguardo all' esito di questa malattia ecco ciò che ne disse IPPOCRATE: *vesicae dolor & dolentes penitus quidem horrendae sunt, & perniciosae; periculosissima vero, quae cum febre continua fiunt. Etenim dolores ab ipsis vesicis ad occidendum sufficiunt. & alii non egerunt hoc tempore, nisi durum quoddam, & hoc couctae. Solvit autem urina mixta purulenta, quae albam, ac levem subsiditiam habet. Si vero neque ad urina quicquam venisferit dolor, neque vesica molliatur. & febris continua fuerit, in primis circuitibus morbi aegrum moriturum esse timor est, ( de praenot. p. 464. ) Il Tr.*

(bbb) Le candeie o candelette che si voglia dire, sono una lista



*Infiammazione della matrice (ccc).*

La matrice s'infiamma per diverse cagioni, ma più frequentemente per la subitanea soppressione degli sgravj uterini di tutta specie, per gravidanza, o per aborto. Quand'è considerevole, si manifesta da un dolore permanente, vivo e fisso nel fondo dell'osso catino, nel mezzo della parte inferiore del basso ventre; dolore che si estende alle anguinaglie ed alle anche; che cresce ai movimenti della coscia; e secondo che l'infiammazione invade la parte anteriore, posteriore o laterale della matrice, od i suoi legamenti, vi si unisce più o meno voglia e difficoltà di urinare, di andare al cesso, di stendersi e di coricarsi per ogni verso, con dolori delle reni e della testa, e più vivi sulla fronte e su gli occhi.

Le persone investite da cotesti mali sono pure soggette alle nausea, ai movimenti convulsivi, al singhiozzo, accompagnati da una febbre continua più o meno acuta.

Le conseguenze a temersi, se l'infiammazione non è risolta, sono l'ascesso, di cui il pus si evacua per le parti naturali, o si getta nell'addome dove vi cagiona l'idrope purulenta, o l'ulcera della matrice con febbre etica, oppure lo scirro.

Per evitare questi cattivi eventi, tutto si faccia

di pannolino incrata o diversamente impiastrata e ridotta in cilindro solido, che s'introduce nel canale della verga, per aprire il passaggio dell'urina. Per servirsene s'inzuppano nell'olio, e s'introducono nel canale dolcemente ed a gradi. Quando non si sente più resistenza, si ferma, essendo allora certo che la estremità è penetrata fin dentro la vescica.

Ulteriori e più distinte notizie delle varie specie di candelotte si possono avere nel tomo V. della *Medicina domestica* di BUCHAN, edizione milanese. *Il Tr.*

(ccc) *Offia metritide. Il Tr.*

per risolvere l'infiammazione col metodo indicato per la cura della malattia precedente, applicando i rimedj esterni su tutta la parte inferiore del basso ventre, e sulle anguinaglie (*ddd*); e se l'infiammazione degenera in ascesso, si faccia maturare, secondo fu consigliato all'articolo dell'infiammazione renale. L'ammalata riceverà, e dirigerà spesso col mezzo di un imbuto il vapore d'acqua-crusca calda all'orificio interno della matrice; e se l'ascesso scoppia ed il pus forte per le vie naturali, affine di detergerne il fondo, s'inietta due volte al giorno coll'infusione balsamica N.° 100. animata con una decina di gocce di tintura di mirra sopra ogni oncia d'infusione; non omettendo altronde l'indicato per la cura degli ascessi ed ulceri delle reni; e se l'infiammazione s'inscirrisce, la cura farà come quella dello scirro del fegato.

## DEI TUMORI VENTOSI; OSSIA DEGLI ENFISEMI E DELLA TIMPANITIDE.

**I** primi sono prodotti dall'aria spansa e rarefatta nel tessuto cellulare. Il soggiorno e l'espansione di un volume d'aria nel basso ventre formano la timpanitide.

### *Enfisema.*

L'enfisema sopravviene spesso alle piaghe del petto, quando l'aria atmosferica, o quella che si sviluppa dalle materie purulente s'insinua nel tes-

---

(*ddd*) MOURICEAU suggerisce l'unzione al ventre fatta con olio mandorlino con una quarta parte d'aceto, o sugo di cedro. *Il Tr.*

futo cellulare. Allora i lieviti più sottili della fermentazione seguono la strada, che l'aria ha loro preparata, e ne risulta un tumore enfisematico, il quale cresce col calore del corpo, che rarefa l'aria rinchiusavi. Nello stesso modo, e collo spontaneo sviluppo e rarefazione dell'aria contenuta nei fluidi, si formano gli enfisemi alle palpebre, allo scroto, al prepuzio, non che gli enfisemi interni.

L'enfiagione enfisematica altera poco o niente il colore degl'integumenti; la pelle soltanto diviene lucida dove trovasi molto distesa ed assottigliata: il tumore è elastico e diminuisce ed ingrossa alternativamente a ragione dell'elasticità dell'aria esterna ed interna; compresso col dito, si rialza immediatamente, senza che vi rimanga l'infollatura. L'ammalato prova nella parte tumefatta una tensione più o meno dolente, ed è altronde incomodato dai sintomi dipendenti dalla situazione e funzioni della parte enfisematica.

Quand'egli è considerevole o di lunga durata, i tegumenti s'infiammano; e quand'è prodotto da umori putridi, i corrotti miasmi seguono la strada, che l'aria loro prepara, e l'enfisema può dar luogo a piccole suppurazioni; quindi ne risultano i depositi purulenti che non sono stati preceduti da evidente infiammazione; e la materia che si spande nelle membrane adipose si apre degl'improvvisi pertugi fistolosi interni ed esterni.

Se l'enfisema è prodotto da un'aria introdotta nel tessuto cellulare della superficie del corpo; si pompa quest'aria colla ventosa secca applicata sulla piaga dilatata dall'apertura, per la quale si è introdotta l'aria; si frega il tumore, frattanto che l'aria si succhia, si estrae dalla sua circonferenza verso l'apertura, applicandovi in seguito dei sacchetti di fiori secchi e caldi di sambuco e canfora.



Se al contrario l' enfisema proviene dalle efalazioni delle materie corrotte , e che il luogo , dove giace il deposito , lo permette , si dà sfogo alle materie coi vescicanti o col taglio , o veramente con fomentazione aromatica del N.º 78. , o con compresse inzuppate nell' acqua di calce e parte eguale di spirito di vino ; col purgare ogni due giorni colla polvere purgativa N.º 186. ; e nel medesimo tempo se è possibile , inumidire la parte col vapore d' aceto bollente o distillato sopra mattone arroventito ; e ciò non potendosi eseguire , o già usato inutilmente , si fanno fomentazioni di chinachina cotta nel vino , e se ne prenda anche una dramma in polvere nel vino ogni quattr' ore .

*Timpanitide (a) .*

La timpanitide si conosce da un gonfiamento considerevole e permanente al ventre inferiore teso e meteorizzato . Il tumore è elastico compresso , indica la resistenza dell' aria rinchiusa , e l' addomine risuona . Il malato prova ambascie ed oppressione , che diminuiscono a misura , che gli sfuggono dei venti , e che crescono se non ne rimette per lungo tempo . In allora il ventre è talmente teso e sensibile , che non può sentirsi coperto ; le gambe sono poco o niente gonfie , ed a proporzione che il ventre ingrossa , il resto del corpo si smagra (b) .

Questa malattia dipende da venti e flati inter-

(a) Idropisia ventosa, idropisia secca, come la chiamò IPPOCRATE. *Il Tr.*

(b) La gonfiezza del ventre nella timpanitide è minore , che nell' ascite : rimane sempre la medesima in qualunque situazione del corpo ; non v' è ondeggiamento ; nè la tumidezza si fa insensibilmente come nell' ascite , ma massima in poco tempo : il polso è ancora più duro , e pieno che non nell' ascite . *Il Tr.*

cettati nello stomaco e nel condotto intestinale, particolarmente nell'intestino colon e nel cieco, prodotti dalla fborra delle prime vie, e da un grande rilassamento del condotto cibario, il quale nel medesimo tempo in alcuni luoghi è talmente incre-spato, che gl'inter-spazj di un incre-spamento all'altro formano delle borse ventose. Questa malattia proviene ancora dagli umori o materie sparse nelle cavità del basso ventre, e che per la corruzione e fermentazione la riempiono d'aria prodotta dalla medesima fermentazione o corruzione; e cotesta è la causa più comune della timpanitide, la quale qualche volta è pure l'effetto dell'enfisema degl'intestini, del mesenterio, ec. Ella è spesso seguita dall'idrope ascite e suoi sintomi. La timpanitide enfisematosa è altrettanto rara che difficile a conoscere; l'addominale sopravviene tante volte all'ascite purulento, e queste due specie sono incurabili; rispetto all'intestinale è difficilissima a guarire, e quand'è inveterata, è incurabile (c), perchè la forza del canale intestinale è distrutta talmente da non poter essere ristabilita (d).

Affine di curare con esito la timpanitide suscettibile di guarigione, si distinguerà bene, qual'è la natura della fborra fissata nelle prime strade, da cui l'infermo è incomodato. Se dessa è fredda, l'ammalato si nutrirà degli alimenti della lettera C., presciogliendo quelli ch'ei potrà digerir meglio.

(c) I segni, coi quali poter distinguere la timpanitide intestinale da quella dell'addomine, sono i dolorosi borborigmi, i tormini, l'espulsione dei rutti con sollievo e susseguente diminuzione intestinale del tumore, e la pertinace costipazione: l'altra si manifesta dai dolori piuttosto esterni che interni, dalla mancanza dei borborigmi, dalla minore costipazione, e da un suono timpanico più acuto. *Il Tr.*

(d) La timpanitide, disse CULLEN, è in generale una mortal malattia: è caso raro, che si possa guarire: l'esito ordinario è quello della cancrena. *Il Tr.*

Berà per uso ordinario eccellente vin rosso, nel quale avrà fatto infondere per ventriquattr' ore sopra due libbre, la scorza di melarancia, annacquando questo vino con metà d'acqua.

Rispetto ai rimedj, prenderà la pozione emetico-lassativa N.º 165., purgandosi in seguito ogni sei giorni col decotto lassativo N.º 31., dopo di che si esibisce una presa delle gocce anodine N.º 89., e negl' intervalli, affine di rilasciare gli strozzamenti degl' intestini, i lavativi di brodo di omento di vitello, con infusovi un pizzico di comino, e nel medesimo tempo per iscacciare i venti, internamente le gocce carminative N.º 92. Sul ventre inferiore si stende l'impiaastro di galbano del Sidenamio, impastato con una dramma d'olio d'aniso per ogni oncia. Il ventre si cinge dolcemente a misura che si disenfierà; in inverno con una cintura di flanella, ed in estate con una di cuojo. Ridotto il ventre alla sua grossezza naturale, affine di ristabilire la forza dei solidi, il convalescente usi il raccomandato a quest' effetto per la cura dell' idrope ascite.

Se per lo contrario l'ammalato soffre i sintomi della favorra calda od atrabiliare, si purga colla pozione minorativa N.º 168., salassandolo in seguito; mattina e sera applicasi un lavativo d'acqua di linseme con un'oncia d'olio di camomilla fatto per infusione; la sua bevanda ordinaria sia la tisana di linseme N.º 212. infondendovi sulla fine due pizzichi di fiori di papavero selvatico: ogni otto giorni riprenda la pozione minorativa: negl' intervalli dopo aver reso il lavativo della mattina, si bagni per un' ora in un brodo di budelle con due terzi di satura decozione di crusca, alimentandosi coi più leggeri e meno flatuosi alimenti della lettera B., e fregando al sortire dal bagno il ventre coll'olio di camomilla unito ad una dramma di canfora sopra



un'oncia d'olio (e). Si continua l'uso di siffatti rimedj umettativi e rilassanti, sino a che il dolore e la tensione nel ventre siano bastantemente diminuiti per guerentirsi dalla infiammazione. In allora convergono i rimedj esterui ed interni, raccomandati per il caso precedente; e nell'un caso o nell'altro, se si guarisce, si fanno a stomaco vuoto frequenti, lunghe, dolci frizioni al basso ventre, oltre un lungo uso delle acque minerali acidette e ferrugine N.º 3.

Nella timpanitide intestinale le persone di temperamento freddo e flemmatico soffrono meno. Il rilassamento è più generale nel condotto cibario.

Le persone di temperamento secco e caldo, l'ipocondriache, le isteriche soggiacciono assai più alla timpanitide: le flatulenze in esse s'intercettano nel canale intestinale per l'essiccamento degl'intestini o per le spasmodiche costrizioni che impediscono di schiudere le flatuosità. Le borse d'aria, dov'esse sono intercettate, si dilatano enormemente, e ne risulta un dolore lacerante, che di tempo in tempo è vivissimo. Egli è a togliere questi strozzamenti, e non a discacciare le ventosità coi carminativi che abbisogna adoprarsi. Il salasso è un poderoso rilassante; desso previene l'infiammazione, e più il dolore è considerevole, meno si può dispensarsene.

Superati i primi ostacoli, i bagni ed i fomenti dappprincipio d'acqua tiepiduccia, ed in seguito fredda contribuiranno molto a rendere la forza alla parte degl'intestini, dove le borse si erano formate, ed i bagni freddi preserveranno dalla recidiva. Il flusso spontaneo dell'emorroidi e dei menstrui, gioverà molto a dissipare la timpanitide intestinale; e se si presentassero pustule emorroidali, si preferiranno le sanguisughe al salasso.

Nei

---

(e) Qualche volta giova l'applicazione dell'acqua diacciata, e della neve, e le ventose secche replicate sull'addomine. // Tr.

Nei casi cruciosissimi, il malato essendo tutto-  
za in forza, si potranno tentare i bagni ammollien-  
ti, replicati, ed un giorno sì e l'altro nò, un la-  
vativo di fumo di tabacco, affine di togliere gli  
strozzamenti (f).

## DELLE AFFEZIONI IDROPICHE.

**S**I dividono le affezioni idropiche in idropisie per  
infeltrazione, in idropisie cistiche, ed in idro-  
pisie per ispandimento. Le idropisie per infeltrazio-  
ne sono generali e particolari; e si distinguono in  
edema, leuco-flecmazia, ed anasarca.

### Edema.

L'edema è una gonfiezza pallida, molle, in-  
dolente, che conserva per qualche tempo l'impres-  
sione del dito. Questa gonfiezza dipende dall'infel-  
tramento di un umore linfatico o sieroso nel tessuto  
cellulare posto immediatamente sotto la pelle. La

Tom. I.

Z

---

(f) E' stata proposta nei casi disperati e ribelli l'operazione  
della paracentesi, come si pratica nell'idrope ascite; ma questo ri-  
medio, è molto incerto: appena può convenire nella timpanitide ad-  
dominale; ma egli è poi dubbiosissimo, che quest'ultima possa esi-  
stere indipendentemente della timpanitide intestinale, o per lo meno  
non è così facile a decidere; e quand'anche fosse possibile di assicu-  
rarla di sua esistenza, non pare che si possa guarirla con questo ri-  
medio, nè avvi ancora alcuna osservazione capace di determinare,  
fino a qual punto questa operazione si potrebbe praticare senza pe-  
ricolo della timpanitide intestinale: tale è il sentimento di CULLEN;  
ma LIEUTAUD, quantunque non sembra decidersi a favore di que-  
sta operazione, pure conchiuse, *in re ancipiti, & urgentissima, nonne  
satius est experiri remedium quam nullum? non constat præterea lethali-  
tem fore hanc operationem, etiam vulneratis intestinis; quin potius  
innumera prostant observationes chirurgicæ, quæ contrarium arguere  
videntur: adde quod temeritas nonnunquam præstat, quod prudentia ne-  
quit*, (*Synopsis universæ praxeos medicæ. t. I. p. 218. edit. Padov.*  
3777.) *Id Tr.*

faccia, il di sopra della mano, e specialmente le caviglie sono le più facili al gonfiore edematoso. Alla faccia, l'edema cresce stando coricato; diminuisce, o si dissipa nella notte, quando invade l'estremità; e rinasce tanto più prontamente fra 'l giorno, quanto l'infermo è greve e sta lungo tempo seduto, o riposato, e sempre più poi a raggiuglio del grado di rilassatezza dei solidi.

Quando il tumore edematoso è considerevole, produce tensione incomoda, e dolorosa, risipola, scalfitture nella pelle, con stillamento di umori fierosi, i quali, se sono molto acri, generano ulcera ostinata, e facile a cangrenarsi.

Se il tumore edematoso è recente, e prodotto da un difetto di circolo per cagione esterna, non esige altri rimedj che dolci, secche, e replicate fregagioni dal basso in su con flanella perfumata di tacamahaca, o bacche di ginepro. Nel caso che l'edema sorprenda l'estremità inferiori, si avrà la precauzione di non strignere i legacci, e si collocheranno fra 'l giorno le gambe sopra uno sgabello.

Al contrario se l'edema si sarà formato insensibilmente, o che sarà inveterato; se l'infermo fosse impoverito di forze per istrabocchevoli evacuazioni, o convalescente di una malattia, che lo avesse snerato, conviene un regolamento corroborante, e l'ellettuario N.º 54. Se invece l'ammalato fosse ben nutrito, e sopraccaricato d'umori, si purga dolcemente, ogni sei od otto giorni, con sufficiente dose del decotto lassativo N.º 31.; usando contemporaneamente le frizioni, e precauzioni suddette.

In seguito di cotesti rimedj, si fomenta l'edema con parti eguali d'acqua di calce, e d'acqua vegeto-minerale canforata del Goulard. Le persone colle mani e gambe edematose, porteranno nella notte calzette o guanti a doppia tela, il cui tra-



mezzo farà guernito di eguale porzione di sale tostato, e di fiori polverati di camomilla. Prima di calzare questi guanti o calzette si deggiono asciugare e riscaldare, e sostenere la parte edematosa fra 'l giorno con calze o guanti di pelle di cane o con una fascia conveniente per dare ai solidi tempo di riprendere la loro forza; e per facilitare il circolo ed animare la traspirazione, dopo l'uso del suddetto decotto lassativo, il malato prenderà mattina e sera, a letto, trenta gocce depurative degli umori bianchi N.º 93., soprabbevendo una tazza del decotto di dulcamara N.º 27., evitando le bevande e gli alimenti rilassanti: s'egli fosse flemmatico, e l'elasticità dei solidi alquanto infievolita, osserverà il regolamento descritto sotto la lettera I., esercitandosi molto, e procurando colla traspirazione di dissipare le soprabbondanti sierosità. Se questo corso di rimedj fosse infruttuoso, si passerà a quelli prescritti per l'anasarca (a).

In caso che sopravvenisse la risipola, vi si rimedia come al trasudamento delle sierosità, seguendo i consigli dati all'articolo delle risipole.

La roschezza risipelatosa, che è inveterata, e coperta di scaglie, e di pellicole farinose, è difficile

Z 2

---

(a) Si suole dai chirurghi usare nell'edema la fasciatura così detta *espulsiva*, e le calzette *espulsive*: le calzette espulsive sono fatte a foggia di stivaletti, e si allacciano con correggie od altri legami: se il diverso volume non permette, che si possano stringere uniformemente, si fanno adatte imbottiture; gl'inglesi usano tali stivaletti (si dice nella nota a. delle Opere di BERTRANDI t. 2. p. 50.), immersi prima nell'olio d'ulivo, fatti di seta, e pretendono, che l'olio, ond'essi restano imbevuti, e la stessa gomma della seta, impedendo l'impressione dell'aria esterna sulle gambe, e sui piedi edematosi, facciano sì, che pei pori cutanei per l'azione vitale siano espulse le acque. Queste fasciature non convengono però, e sono anzi dannosissime, se l'edema proviene da malattie dell'addome, del petto, o del capo. Il Tr.

a dissipare. Si possono tentare i bagni delle acque termali-marziali, od in loro mancanza, i fomenti coll' acqua di calce con entro disciolto mezz' oncia d'allume di rocca sopra una libbra della dett' acqua. Un lungo uso delle foglie di bardana, applicate e rinnovate mattina e sera, dissipa qualche volta l' edema.

L' enfiagione edematosa alla caviglia dei piedi, nelle persone molto corpulente è più incomoda che pericolosa. Ella si guarisce di rado come gli altri edemi che sono molti inveterati, atteso il grande rilassamento dei solidi. Affine di arrestarne i progressi bisogna sostenere la fibra con fasce di tela, o con sottocalze di pelle di cane.

#### *Leuco-flecmazia, ed anasarca.*

La leuco-flecmazia consiste nella gonfiezza dell' abito del corpo, che proviene da una linfa spessa infeltrata sotto la pelle nel tessuto cellulare. Quando l' enfiagione è considerevole, e che ritiene l' impressione dell' apice del dito, chiamasi idrope anasarca (b).

(b) Quando il siero stravasato è solamente dentro alle cellule della universal membrana, l' idropisia chiamasi *cellulare*, per lo più nell' integumento comune sparso con tumore adiposo per tutte le membra, detto perciò con greca voce *leuco-flemmatia*, per l'apparente bianchezza di quell' acqua, o umore, o flemma che la produce. Quando poi quest' umore occupa ancora le cellule tra gl' interstizj dei muscoli, e delle membrane, e rende le membra rigide e dure, e quasi inflessibili, allora tale idropisia può distinguersi col vecchio greco nome d' *anasarca*, che significa come insinuata tralle carni. CUCCHI dei bagni di Pisa:

Che che ne sia però della varia definizione di queste due voci, pare che si possa ridurle ad una sola malattia, e perchè le cagioni sono sempre eguali, e non diversa nemmeno la cura.

CULLEN annovera cinque specie di anasarca: primo, l' anasarca sieroso, prodotto o dal rattenimento delle sierosità, quando sono soffermate abituali evacuazioni; o per l' accresciuta sierosità, per l' eccessive bevute di acqua: secondo, l' anasarca di oppilazione, cioè

Si distingue la leuco-flecmazia dalla grassezza , dal pallore della superficie del corpo e dalla impressione che i legacci lasciano nelle persone attaccate da questo male .

Rispetto all'anasarca , a misura che questa specie d'idrope si avvanza , il cavo che faffi col dito , diviene più profondo , e si rialza più lentamente . La regione del basso ventre si ammassa ; senza che il ventre si estendi molto : le gambe , le cosce , e lo scroto si gonfiano , allorchè l'ammalato sta lungo tempo in piedi ; ed a proporzione che l'anasarca si avvanza , queste parti perdono interamente la loro forma . Il gonfiore diminuisce durante la notte : la faccia è pallida , tumida , macilenta ; l'appetito diminuisce , le forze mancano , cresce il peso del corpo , l'oppressione , la pigrizia , la diminuzione delle orine , le quali sono bianche , chiare , saponose e spumose ; le fecce mal connesse , il sonno inquieto ; l'ammalato è oppresso ; cade in una lenta febbre , accompagnata da molta alterazione , da mestizia , e da inquietudini .

Le conseguenze dell'anasarca sono le fessure alla pelle con sieroso scolo , che solleva . Senza questo beneficio , l'idrope del basso ventre e del petto succedono frequentemente all'anasarca , nei quali casi si consulteranno gli articoli , dove si parla di queste malattie .

La leuco-flecmazia si dissipa dopo avere interamente rimediato alla favorra delle prime strade col

Z 3

---

prodotta dalla compressione delle vene , siccome , per esempio , nelle donne incinte , ec. : terzo , l'anasarca efantematico , successivo agli efantemi , e particolarmente alla risipola : quarto : l'anasarca anemio , che è l'effetto dell'impoverimento del sangue per eccessive emorragie : quinto , l'anasarca per debolezza , che nasce nelle persone estenuate da lunghe malattie , o per altre cagioni . *Il 2<sup>o</sup>*.



decotto N.º 30., coi brodi amari N.º 10., col vino callibeato N.º 123., e colle fecche generali frizioni fatte mattina e sera. Se fosse ostinata, si fa infusione di due once di rafano silvestre in due libbre di vin bianco, dandone un bicchiere mezz'ora prima dei pasti; possono pure convenire le acque termali purgative, affine di prevenire la recidiva, ed il regolamento sarà quello prescritto sotto le lettere G. ed I.

Rispetto all'anasarca, nel caso che questa idrope sia venuta in seguito a lunghe e strabocchevoli evacuazioni, o sorprendesse un convalescente estenuato, vi si rimedia con un regolamento corroborante, coll'elettuario N.º 54. colla fregagione mattina e sera generale, fatta con secca fianella profumata di tacamahaca; il tutto accompagnato da molto esercizio.

Quando l'anasarca non provenisse da queste cagioni, o quando il gonfiore sarà considerevole ed inveterato, si purgherà l'infermo ogni tre giorni col decotto lassativo N.º 31. Nell'intervallo delle purghe, prenderà a digiuno e nel coricarsi la polvere N.º 157., ed immediatamente dopo la presa della mattina, il brodo N.º 10. Userà prima dei suoi due pasti, il vino raccomandato per la leucoflecmazia, e continuerà l'uso di questi rimedj, sino a che le eccessive sierosità, e gonfiore sian dissipate. Il suo regolamento consisterà negli alimenti meno rilascianti del regolamento prescritto sotto la lettera B.; osservando in seguito, affine di ristabilire la forza dei solidi, il regolamento specificato sotto la lettera I., oltre le frizioni, e l'uso dell'elettuario corroborante N.º 54. sino a che la sua guarigione sia rialficurata.

Se le acque colassero per le fessure fatte sulla pelle, conviene il regolamento già detto all'articolo della risipola. Se lo scroto fosse gonfiato, lo si so-

fiene con un sospenforio ; e frattanto che il tumore è durissimo , fomentasi questa parte col fomento risolvente N.º 83. Se il gonfiore fosse molle , si perfuma due volte al giorno coll'incenso ; e la notte , vi si applicano sacchetti caldi , pieni di parti eguali di sale tostato , e fiori di camomilla polverati . Nell' un caso , o nell' altro , se la pelle fosse lucida , risipelatosa , o vicina a screpolare , si preferisce di fomentare lo scroto coll' acqua vegeto-minerale del Goulard , animata da un' oncia di acquavita canforata , sopra una libbra di quest' acqua .

Tutte le volte che l' infeltramento è generale , o considerevolissimo , si accelera tante volte la guarigione dell' anasarca , e si solleva sempre l' ammalato , dando ad imitazione della natura , sfogo alle acque , colle punture o scarificazioni superficiali ; e si previene l' infiammazione della pelle , e conseguentemente la gangrena , che facilmente sopraggiunge durante lo scolo , colle precauzioni raccomandate per la cura della risipola e della gangrena (c) .

I sudori copiosi provocati colla stuffa , od infossandosi nella sabbia ; la feccia delle uve , od il concime caldo , guariscono qualche volta l' anasarca .

## Z 4

---

(c) Oltre le scarificazioni proposte dal nostro autore , convengono ancora i cauterj . applicati segnatamente un poco al di sotto del ginocchio ; ma deggiono usarsi , prima che la idropisia siasi molto inoltrata , e le parti abbiano molto perduto della loro elasticità : i vescicanti ancora sono suggeriti per dare maggiore evacuazione agli umori ; ma comechè troppo facili a degenerare in cancrena , o si omettino , o si applichino colla più grande precauzione : le foglie di cavolo , dice CULLEN , messe sulla pelle , hanno tante volte prodotto buon effetto , promovendo un trasudamento acquoso dalla sua superficie . *Il Tr.*

*Idrope cistica, ed idatidi.*

Se avvengono spandimenti d'acqua nelle piccole cavità del corpo, proprie a formare delle borse chiamate cisti, l'acqua che vi s'infeltra, le dilata.

Questi riserbatoj divengono tante volte considerevoli, e queste cisti sono soggette ad indurirsi appoco appoco, e divenire di una forma irregolare, ed anche scirrofa.

Quando al contrario l'acqua si spande in vescichette, le quali abbiano poco corpo, si chiamano idatidi. Il loro volume non eccede quasi quello d'un uovo di piccione. L'acqua ch'elleno rinchiudono, è per lo più linfatica e chiara, invece che le cisti contengono delle acque melmose (d).

(d) L'elegantissimo COCCHI per descrivere queste altre due specie d'idropisia, ecco come si spiega, e come ne porge chiarissima idea della loro diversità, e formazione. L'idropisia è cistica, o vescicolare, o saccata, quando il siero stravaso resta racchiuso dentro a certi sacchi distinti, o vesciche, le quali per essere piene d'acquoso umore, chiamansi idatidi, e probabilmente altro non sono che frammenti di canali linfatici dilatati e chiusi dalle loro valvole, e disgiunti. Queste si trovano dentro alla cavità del ventre, in forma quasi sferica di varia grandezza, e di vario numero, composte nella superficie di più tuniche, e dentro piene di limpida linfa, e talora ancor contenenti qualche altra sfera, o più insieme, o una sola concentrica da distinta tunica circonscritta. Elle sogliono aver tra loro o colle vicine viscere qualche sottilissima connessione membranosa, e alle volte anco si trovano staccate, e disciolte.

Moltissimo, e con copia d'erudizione ha parlato delle idatidi il cel. naturalista di Firenze, Felice FONTANA (*opuscoli scientifici*. Firenze 1783.) Questo illustre scrittore, dopo avere scoperta la vera causa di una singolare malattia, a cui soggiacciono le pecore, chiamata in Toscana, ed in altri luoghi d'Italia, la pazzia, prodotta da minimi corpicciuoli, che si trovano dentro le vesciche del cervello delle pecore (e questi corpicciuoli sono veri animali), viene a far cenno delle idatidi dell'uomo, che si credono dai medici inorganiche, e fatte da rotture, e gonfiamenti di vasi linfatici. Io per me non troverei niente impossibile (è lo stesso autore che parla), che molte di esse potessero essere animali, o simili affatto, o non molto differenti dalle idatidi ritrovate nelle pecore; vi è nel loro



Le idatidi viziano principalmente la superficie delle viscere del basso ventre, e specialmente il fegato, l'utero, ed il polmone: le idropi faccate invadono invece la duplicatura del peritoneo e le ovaie.

Rispetto alle idatidi, che si formano internamente, egli è impossibile di conoscerle; e non si distinguono l'idropi cistiche interne, se non quando hanno acquistato un volume sufficiente per produrre i sintomi dell'idrope per ispandimento. Allora si distinguono dalle idropisie di ispandimento, dai sintomi dipendenti dalla libera fluttuazione non sensibile nell'idrope cistica, a meno che le cisti fra la duplicatura del peritoneo, non sieno considerevolissime. Altronde nell'ascite le acque seguono evidentemente le situazioni che prende il malato; ed i movimenti delle acque infaccate, non facendosi che nelle cisti, sono circoscritti e poco sensibili (\*).

mezzo un umore trasparente come in esse. Non pare che prima di TISONE si conoscessero per veri animali distinti, e organizzati quelle idatidi, che si trovano nel basso ventre dei molti animali, benchè il REDI ed altri le chiamino viventi. Dopo TISONE, l'HARTMANNO le caratterizzò per animali, ma non furono seguite le opinioni del TISONE, e dell'HARTMANNO dai medici. Il famoso PALLAS è fra i moderni il solo, che ha illustrate quelle del basso ventre di molti animali, e le ha conosciute per veri animali; ma nessuno che io sappia, ha parlato di quelle del cervello, nessuno le ha sospettate un ammasso d'animali, nessuno le ha conosciute per esgioni di una malattia sì grande, e nessuno ha provato, che quelle, che si trovano nell'uomo, sieno anch'esse veri animali.

Anche il cel. CULLEN è d'opinione, che vi sia un vivo animale del genere dei vermi rinchiuso in ciascuna di queste idatidi, il quale ha la forza di fororarsi una vescichetta, e di riempirla di un fluido acquoso attratto dalle parti vicine, onde giustamente nominato dai naturalisti *tenia hydatigena*. Il Tr.

(e) L'idropisia incominciante delle ovaie (ci addottrina il valentissimo Sig. Professore NESSI) si sospetta da un gonfiamento limitato, e circoscritto all'una, o all'altra anguinaglia, da un dolore spesso volte ortuso, e gravativo nel luogo, dove comincia la malattia, dalla gamba gonfia corrispondente all'ovaio viziato, e finalmente dal vedere le urine abbondanti copiose e senza cangiamento di colore come nell'ascite, e dall'osservare spesso volte fortire dell'acqua dai

Le conseguenze dell' idrope cistica sono la rottura delle cisti, e la subitanea formazione delle idropisie per ispandimento. Le idatidi del polmone si svuotano qualche volta per la bocca, ed altre spandono le loro acque nel torace.

Le idatidi che si formano alla superficie del corpo, alla palpebra ed al collo, o rassomiglievoli alla broncocele, ec. si guariscono coll' aperture del follicolo fatta secondo l' arte, e medicata in seguito nel modo che si consuma l' invoglio, che forma la borsa .

Rispetto alle idatidi del polmone, se avvi luogo a presumere, che ve ne esista, si facilita la rottura, e la sortita dell' acqua per la bocca, inspirando spesso il vapore d' acqua-crusca unita ad un sesto di aceto, come ancora coll' esercizio del cavallo e della carrozza. Se le idatidi del basso ventre invadono i tegumenti comuni, si svuotano colla puntura, e se ne previene la recidiva, colla iniezione nel follicolo, dopo lo scolo delle acque di una satu-

pori della cute. L' ondeggiamento della materia non è tanto sensibile come nell' ascite, perchè non è precisamente contro del peritoneo, e talvolta è spessa, e densa, e rinchiusa in piccoli sacchetti, o cellule.

L' idropisia del peritoneo poi, altrimenti intermuscolare, si forma con lentezza, e quando è sola, assai tardi diventa incomoda, e dolorosa. Il ventre non gonfia egualmente in tutte le sue parti, ma è circoscritto specialmente nella parte anteriore, e rialzato in fuori, e nei diversi movimenti del malato mantiene sempre presso a poco la stessa figura; il belco ordinariamente è un poco incavato, ma non si è mancato di trovarlo qualche volta prominente. I malati conservano per lungo tempo il loro colorito e l' appetito; digeriscono, e dormono bene; hanno poca sete, e le urine sono conformi al solito; non hanno grande difficoltà di respiro nel camminare e nel montare le scale. L' edema delle gambe, che precede o accompagna per l' ordinario il gonfiamento del ventre nell' ascite, non si manifesta nell' idropisia del peritoneo, se non molto tardi, ed in alcuni mai. Le femmine hanno i loro corsi mestruali, e colano in maggiore abbondanza, che nell' ascite, e possono ancora concepire malgrado questa malattia. *Il Tr.*

ra decozione di fiori di balauſti (f) fatta coll' acqua di calce, fomentando in oltre il ventre col medefimo liquore, e comprimendo l' idatide ſecondo l' arte .

*Idrops aſcite .*

Quando uno o più vaſi linfatici , od idatidi, ſpandono la loro linfa , per qualunque ſiaſi cagione, nella cavità del baſſo-ventre ; come pure che il vapore deſtinato ad inumidire le viſcere dell' addome inſeltraſi in tale quantità, che il riaſſorbimento non è proporzionato alla maſſa che ſi ſvapora ; o quando in ſeguito ad una infiammazione paſſata all' aſceſſo , queſto ſi ſvuota nella cavità del baſſo ventre, ne riſulta nel primo caſo, l' idrops aſcite acquoſa , e nel ſecondo la purulenta . Si riconoſce l' aſcite dal tumore e groſſezza del ventre che creſce più o meno con rapidità . Allorchè l' ammalato è coricato ſul dorſo , il tumore ſi ſtende egualmente ſu tutto il baſſo ventre , e quando invece giace ſul fianco, le acque ed il ventre ſi gettano ſul medefimo lato . Le perſone attaccate da queſt' idrops ſe ne avvedono ordinariamente, nel cangiare con impeto la ſituazione di un fianco all' altro, da una fluttuazione ſomigliabile a quella dell' acqua in una bottiglia piena per metà : applicando eſteſa una mano ſopra un lato del ventre, il malato eſſendo coricato ſul dorſo , e battendo coll' altra mano ſul lato oppoſto, la mano che vi è meſſa contro, per poco ch' ella ſia in ciò eſercitata, ſente diſtintiffimamente la fluttuazione .

Queſta ſpecie d' idrops è ſovente preceduta, o ſeguita dal gonfiore della caviglia dei piedi, che ri-

---

(f) Queſti ſono i fiori del pomo granato: vogliono eſſere ſcelti novelli , ben fioriti e di un roſſo viviffimo . *Il Tr.*



fale e cresce più o meno rapidamente , ed in modo che fulla sera ella è più confiderevole che alla mattina sortendo dal letto . A misura che la malattia si avvanza , lo scroto si gonfia d'acqua , e s'intumidisce tanto più , quanto maggiormente l'ammalato resta su i due piedi ; sparisce in gran parte , restando molto tempo a giacere . Le orine diminuiscono à misura che la malattia fa dei progressi : sono elleno ordinariamente di un rosso fosco e di un sedimento mattonoso ; la voce degli ascitici è alcun poco interrotta ; hanno tosse , alterazione , svogliatezza , oppressione , inabilità a restare lungo tempo coricati sul dorso , e soggetti in tale situazione ad oppressioni , soffocazioni ed ansamenti , che li obbligano ad alzarsi a mezza vita . Sono essi comunemente freddolosi , pesanti , pigri , scaduti di forze , più o meno stupidi ; e questi sintomi , come anche la gonfiezza crescono ; frattanto che le estremità superiori e la faccia si smagrano .

Le conseguenze dell'ascite , sono l'idrope del petto , il rilasciamento dei visceri del basso ventre , i quali si trovano macerati nelle acque , per la loro dimora alterate , ciò che produce qualche volta la flogosi , e la putrefazione delle viscere addominali , da cui risultano la febbre lenta , ed etica , le lipotimie , e la gangrena . Avviene ancora , che le acque traforano i tegumenti delle gambe , e che il tumore del basso ventre produce l'ernia ombilicale , ec.

Per curare questa malattia secondo l'arte , bisogna individuarne l'origine , e distinguerne bene le cagioni dalla combinazione dei sintomi , con che potere annunciarne la guarigione o l'incurabilità . In quest'ultimo caso non si tenteranno per perditempo , rimedj spiacevoli , i quali non faceffero se non abbreviare la vita dell'ammalato ; nel primo ,

invece, niente si ometterà per debellare coraggiosamente il male (g).

L' idrope ascite è giudicata incurabile, quando viene in conseguenza dell' infiammazione dell' uno o l' altro viscere del basso ventre rivolta in ascesso con ispandimento del pus nella cavità addominale . Ella è egualmente incurabile , se avvi qualche affezione scirrofa , ostruzioni insuperabili , o qualche altra malattia incurabile nell' uno o l' altro viscere del ventre inferiore ; come pure quando la parte e le superiori estremità del corpo si consumano rapidamente ; quando il malato ha una piccola febbre, che non lo abbandona mai ; s' egli è molto alterato ; se rimette poche orine , o molto rosse o fosche con sedimento mattonoso ; se ha perduto l' appetito e le forze ; se è sorpreso da risipola alle cosce , o da ardori nell' interno del basso ventre con frequenti brividi seguiti da molta febbre ; se lo spandimento delle acque è antico , e che nel medesimo tempo la tosse sia frequente o violenta ; se avvi apparenza di polipi nel cuore , o se la malattia è una recidiva . Tutto questo essendo di cattivo augurio, si limiterà, soprattutto, se molti di questi accidenti sono riuniti , a sollevare soltanto gli ammalati . Si nutriranno degli alimenti della lettera B. , ch' essi potranno meglio sopportare , e bere a ragguglio della sete le bevande che passeranno , e disseteranno di più , quando ciò non fosse , che acqua fresca inacidita con mezza dozzina di gocce di spirito di vitriuolo sopra una

---

(g) E' sempre stata giudicata la idropisia una malattia difficilissima a superare , cosicchè ARETEO ebbe a dire : *ab hydrope perpauci liberantur , idque felicitate quadam, & deorum potius quam artis auxilio* : ( lib. 2. de caus. & sign. duntur. morbor. ) IPOCRATE lascio pure scritto : *morbis gravis est hydrops, & pauci hunc effugiunt* : ( *De intern. affect.* ) Il Tr.

libbra d'acqua ; ciò che formerà una bevanda egualmente diuretica e propria a resistere alla corruzione delle acque racchiuse. Si tempera l'ardore della sete, coi mezzi indicati per questo sintoma, all'articolo dei sintomi febbrili in generale.

Per evacuare le acque principalmente per le vie dell'orina, il malato continui a prendere tutte le mattine una sufficiente quantità di tisana di cremore di tartaro tiepiduccia per mantenere sciolto il ventre ; un'ora dopo ciascuna bevuta, gli si dia un brodo di coscia di vitello o di pollo bene sgrassato, con infuso un mezzo pugillo di cerfoglio ed altrettanto di petroselinolo. Prima del pranzo gli si frega il ventre, e le reni coll'olio d'ulivo tiepido, con venti grani di canfora polverata sopra un'uncia di quest'olio, sino a che questa dose sia stata assorbita dalla frizione, ed eseguita colla mano riscaldata. Questo metodo contribuisce a diminuire gli umori bianchi, a favorire il riassorbimento, ed a togliere gl'inzuppamenti ordinarj in questa malattia (b). Nel medesimo tempo ch'egli usa di tali medicine, prenda tre ore dopo il pranzo e verso l'ora del sonno, come anche dopo aver leggermente cenato, una presa della polvere diuretica N.º 177., e dopo ciascuna presa, una tazza soltanto del suddetto brodo, o se il malato lo ripugnasse, una tazza d'acqua distillata di cerfoglio: ritengansi le orine del dopo pranzo e della notte, che è il tempo, in cui elleno passano più abbondantemente: al fine di otto giorni, paragonando ciò che il malato bee e rende, come anche coll'esame del ventre, di cui, nel principiare

---

(b) Questa pratica è moltissimo commendata da OLIVER, (*Philosophical Transactions* vol. XLIX. pag. 46.) principalmente nelle idropisie non inveterate. *Il Tr.*



questo corso di rimedj, ne prenderà la misura con un largo papele, si conoscerà, se puossi sperare l'evacuazione delle acque per le orine. In quello caso, soprattutto se l'ammalato avesse acquistato qualche forza, si continueranno tutti i suddetti rimedj, sino a che non vi siano più indizj di fluttuazione nel basso ventre, il quale si stringerà dolcemente, a misura ch'ei diminuisce.

Al contrario se vi fossero ragioni per preferire l'evacuazione delle acque per le vie del ventre, si useranno tutti gli accessorj suddetti; ma in vece delle polveri diuretiche l'ammalato si purgherà; se è possibile, per più giorni consecutivi, od ogni due giorni, alternativamente coi boli idragoghi N.º 7., o colla polvere idragoga N.º 180., osservando quale di questi rimedj faccia scaricare maggiore quantità di acqua pel secesso per insistere con quello, e con maggior frequenza. L'uno e l'altro di codesti rimedj eccitano facilmente uno o due vomiti, i quali, lungi di essere temuti, sono salutari, anzi si deve facilitare questo vomito, beendo acqua pura, tiepida od infusa coi fiori di camomilla. Il sapone toglie alla polvere la sua draficità; opera in meno di tre ore, ed io l'ho ripetuto nel medesimo giorno dopo tre ore, molte volte, senza superpurgazione, nè altri accidenti, tranne la debiltà, che le eccessive evacuazioni avevano prodotto. Non mi è successo che due volte di prescrivere le gocce N.º 89., per acquietate le nauseose irritazioni. La scelta del purgante essendo fatta, se ne continua l'uso, sino a che il ventre sia ridotto allo stato naturale.

Rispetto alle gonfiezze localì, si fanno dolci fregamenti con flanelle perfumate d'incenso, mattina e sera, dal dissotto in su, alle gambe gonfiate; e se gonfio fosse lo scroto, vi si rimedia secondo il prescritto all'articolo dell'anasarca e dell'idrocele.

Dopo il pranzo dei giorni delle purghe, il malato potrà rifocilarsi con una fetta di pane abbrustolita, ed inzuppata nel vino, e con brodi sostanziosi : ne' giorni intermedj, userà alla mattina le polveri e la tisana di cremore di tartaro sopra raccomandata ; e dopo il mezzo giorno i suddetti brodi alterati col cerfoglio e la cicoria . Gli ascitici faranno i loro pasti con un po' di zuppa , corretta coll' acetosa od altre simili erbe, e con alcun poco di carni bianche, arrostiti o condite semplicemente ; mangiare un uovo affogato nell' acqua, ed inzupparne un biscotto in buon vino un po' annacquato ; al pasto bere buon vin bianco diuretico annacquato per metà . I malati flemmatici useranno con grande moderazione la medesima bevanda fra i pasti ; ed i biliosi , la limonca calda . Gli uni e gli altri preveniranno la sete, e si diffeteranno nel modo già indicato all' articolo dei sintomi febbrili . A misura che l' addomine si disenfia, si usa moderata fasciatura .

Evacuate le acque , il metodo di vivere sarà esattissimo per più mesi , scegliendone i più leggieri alimenti dei metodi B. ed I. Continueranno le frizioni e l' uso della fascia , e la purga ogni quindici giorni colla pozione N.° 166. , e nei giorni intermedj affine di corroborare i solidi , l' elettuario corroborante N.° 154. , e nel porsi a tavola , la tintura di Marte , od un pajo di cucchiaj del vino aperitivo corroborante N.° 222. , allorchè le orine non saranno proporzionate alle bevande, non abbandonando giammai questo regolamento, se non quando la guarigione sarà bene assicurata .

Se i primi tentativi fatti colla purgazione , o i diuretici non operassero una considerevole diminuzione del tumore del ventre ; o se cotesti rimedj idragoghi indebolissero l' infermo al segno da prevedere, che non fosse per continuargli una volta sopra  
l' altra

l'altra e nell'ordine prescritto, si svuoteranno subito le acque colla puntura (i) del basso ventre, non lasciandole però colare interamente, atteso che le più spesse rimarrebbero e si riassorbirebbono difficilmente. Si avvertirà di comprimere il basso ventre a misura che le acque coleranno; e per diluirne la posatura, si potrà avanti di ritirare il canello, iniettare nel basso ventre mezza libbra d'infusione di agrimonia un po' più calda che tiepida. Svuotato il ventre, dopo avere medicata la piaga, lo si fonderà con parte eguale d'acqua di calce, e di acqua d'archibugiata (k), tenendo tutto il basso ventre fasciato: l'ammalato stia per un pajo di giorni a letto, coricato colla testa bassa. Trovandoli debole dopo l'operazione, prenda per fortificarsi, la mestura cordiale N.º 124., buoni brodi, e moderatamente gli alimenti e bevande ristoranti (l).

Tom. I.

A a

(i) Ossia paracentesi. *Il Tr.*

(k) L'acqua d'archibugiata, si fa col prendere delle foglie di salvia tre manipoli, foglie e radici di consolida maggiore, di artemisia e di buglossa, quattro manipoli, foglie di betonica, di fanicola, di consolida minore, di piantagine, d'agrimonia, di verberna, di fumaria, d'assenzio, e semi di finocchio, manipoli due, foglie d'ipericum, di aristolochia lunga, cime di melissa, di ruta e d'isopo, un manipolo. Pestò ogni cosa in mortajo di marmo e macerato per tre giorni nel vin bianco alla dose di venti pinte circa in vaso di terra verniciato, si mette in bocce di vetro, e secondo le regole dell'arte a distillare a bagnomaria sopra moderato fuoco tanto che dal becco del limbo ne stilli l'acqua, che si riporà in bottiglie ben chiuse da esporti per un mese al cocentissimo sole: si suggerisce per accrescerne l'efficacia di far seccare il sedimento rimasto, di abbruciarlo per estrarne il sale e disciolverlo nell'acqua descritta: si vuole ancora che le piante siano colte nella luna di maggio, avendo i raggi del sole dissipata la rugiada, e così riescendo più spiritosa la preparazione. *Il Tr.*

(l) Nell'idropisia anasarca, sebbene universale, e nell'idropisia ascite le scarificazioni, dice l'egregio Sig. BRAMBILLA, (*trattato del flemmore*) producono molte volte un esito più facile della paracentesi stessa, purchè siano a tempo debito amministrate: si eseguiscano queste ancora benissimo sopra lo scroto, sopra il membro,



Immediatamente dopo l'evacuazione delle acque, si deve esaminare lo stato delle viscere; e nel caso vi si scopriessero inzuppamenti, si userà con cautela, ed altrettanto che gli aperitivi faranno compatibili cogl' idragoghi, i rimedj indicati in generale, ed in particolare, quelli raccomandati per dissolvere il viscere opilato, combinando questi rimedj nel modo più compatibile, e continuandoli pazientemente.

La seconda scorza verde dei giovani rami di sambuco, cotta col latte, alla dose di due once so-

---

dovunque la gonfiezza e la lucidezza della superficie faranno più visibili. Si faranno queste incisioni superficiali, quando la trasparenza delle parti sarà patente: poichè allora nel momento stesso che con la lancetta si taglia la superficie della cute, subito comincia a colare l'umore limpidissimo consimile all'acqua più pura. Si faranno le scarificazioni più profonde, quando sarà minore la trasparenza, poichè allora è segno, che l'acqua stagnata è più profonda, e condensata, e si devono profondare le incisioni, finchè vedesi colare il siero, avveniendo però di non cacciare troppo oltre la lancetta, acciò non si feriscano vasi grandi, o tendini, o aneurismi: che se poi il fluido fosse talmente denso, che non potesse colare da queste aperture, allora i rimedj interni aperitivi ed incisivi faranno necessarj, come pure i fomenti scioglienti nella parte esteriore: se questi pure non giovano, sarà cattivo segno, e vana ogni speranza di lunga vita.

Alcuni hanno scrupolo, seguita a dire l'illustre chirurgo, a fare queste scarificazioni per timore d'una risipola, o di una gangrena. E' facilissimo, che nasca la risipola, o un poco più di rossore nelle gambe, poichè i vasi debilitati, che non vengono più compressi dalle acque stagnate nella membrana adiposa, ricevono maggior quantità di sangue, che non trovando in essi gran resistenza, vi corre con maggiore impeto, ed in più gran copia, ed alcuni globetti del medesimo possono facilmente insinuarsi anche ne' vasi bianchi, e da ciò nascere il calore e la risipola. Quantunque ciò succeda, non v'è da temere; basta che le parti nobili sian libere; poichè quando il male è ridotto in parti ignobili, come sono le gambe, su queste si possono applicare i medicamenti topici, e da questi se ne può ottenere un più sicuro, e pronto effetto. Dirò di più: è il Sig. BRAMBILLA che parla, che l'esperienza m'ha fatto osservare, che all'evacuare di questo rossore, cessa il più delle volte anche il tumore edematoso, il che forse non succede sì facilmente, quando egli non sopravviene. In somma nulla v'è da temere dalle scarificazioni, sempre però che la persona non abbia affatto corrotti gli umori, e non vi sia speranza di poterli correggere. *Il Zy.*

pra due libbre di latte, presa d'ora in ora a tazze, disensia qualche volta gl' idropici; e se questo rimedio pare che riesca bene, bisogna continuarlo fino a che il ventre sia sgombro da tutte le acque.

Il sapone di Starchei intimamente unito con un terzo di calomelano, e ridotto in pillole col balsamo copaiva è un potente aperitivo, e discioglie maravigliosamente gli umori bianchi tenaci, prendendone una pillola di tre grani ogni quattr' ore, fino a che il mercurio risale alla bocca, sopraggiungendo in allora un placido flusso d'orine, il quale colla continuazione moderata di questo rimedio toglie gl'inzuppamenti e la idropisia.

Non mancano esempj d'idropisie guarite colla bevanda abbondante delle acque minerali leggermente ferrugigne e conosciute per esser molto diuretiche; ciò è che ha moltissimo contribuito a persuadermi, che il regolamento secco non conviene che dopo la totale evacuazione delle acque, e che fino allora i diluenti sono necessarj, soprattutto nei temperamenti secchi e biliosi, ed in tutti i casi nei quali si trova un considerevole condensamento negli umori bianchi.

Un professore medico giustamente celebre ne ha dimostrato la necessità con ragioni vittoriose, uniformi ancora alla speranza. Egli è diffatti che le acque da evacuarfi si riassorbono primamente dalle piccole boccucce, che innumerevoli sono nei tegumenti interni del basso ventre, come anche nelle membrane, che ricoprono le viscere. Siccome le acque spanse sono gelatinose; bisogna assottigliarle con quelle che si spanderanno ancora, procurandone la scorrevolezza a tutta la massa degli umori bianchi colla bevanda moderata ch'ei raccomanda. La guarigione ancora degli ascitici, i quali masticando continuamente dell' uva secca, e che senza bere,

vivono di pane biscotto, e di carni seccate sulla grata, appoggia egli le ragioni del bisogno di attenuare ed affottigliare la massa umorale. La saliva, la quale, colla masticazione accresce appoco appoco la massa dei fluidi per gli organi salivali, ha supplito in essi alla bevanda colla sua copia, colla sua sottigliezza, e colle sue saponose qualità (m).

(m) Egli è abuso generalmente introdotto di non permettere agl' idropici di potersi disfiare, qualunque siasi l' urgente bisogno, ed evidente necessità, sulla falsa supposizione, che colle bevande principalmente rilassanti, si fomenta di più la malattia, introducendo maggior copia di fluido nel corpo degli idropici. Noi dobbiamo ai chiarissimi BAKER, MILMANN, ed ERNST, di avere proposto l' uso delle generose bevande nella cura delle idropisie, già stata da IPPOCRATE, e da GALENO, poi da BENIVENIO, LANGIO, SCHENCHIO, BLONDELIO, PISONE, e finalmente, da BOERHAAVE, COCCHI, QUARIN, CULLEN, VAN SWIETEN, riputate assolutamente giovevoli per vincere siffatto morbo: ed in vero, se si rifletta al carattere della idropisia, si rileva facilmente, che le parti fluide del sangue, e della linfa nelle idropi asciti deggiono essere restituite, affine si ottenga la guarigione; imperocchè le acque sparse nella cavità del corpo, quantunque sieno dolci, non diluiscono la massa degli umori, perchè da quelle nè separate, nè assorbite in sufficiente quantità, onde deggiono poi languire i vasi assorbenti; quindi la principale cagione del raccoglimento delle acque nella cavità addominale. Se poi queste acque hanno contratta dell' acrimonia, accrescono la sete inestinguibile.

*Quibus inflammit suffusa venter ab unda,*

*Quo plus sunt potus, plus sitiuntur aqua,*

promovono la febbre, ed altri sintomi, per quali, se non con una generosa bevanda diluente, ne nasce il pericolo della infiammazione, e della cancrena, e si accelera la morte dell' infermo. E i stessi rimedj diuretici, perchè possono essere decisamente utili, vogliono essere ajutati dalle acquose b'bite; nam (dice benissimo a questo proposito VAN-SWIETEN) *ingesta salina in sano corpore majorem faciunt urinæ secretionem, sed in primis ideo, quia fiti ab his assumtis nata, copiosior prius ingeritur, adeoque & plus urinæ prodit. Nisi enim simul potetur, ab his acrior redi poterit urina, & frequentior ad mingendum stimulus: sed non sequitur semper copiosior urinæ secretio, quæ in hydropse curando desideratur.* Ella è dunque una crudeltà l' impedire assolutamente il bere agl' idropici, essendo la principale curativa indicazione quella di procurare la fluidità della linfa, come in istato sano: a questo fine sono pure consigliati i caldi fomenti rilassanti, applicati sull' addomine, per vieppiù invitare la fluidità, e la scorrevolezza. Quella cura però contiene soltanto nelle asciti accompagnate da inestinguibil sete, aridità di fauci, scarsezza di uri-



Quando gl' idragoghi non fanno il loro effetto , egli è inutile di persistere lungamente , perchè ,

A a 3

ne , rese quali sanguinolente , senza principio di diserasia scorbutica , di pericolo d'imminente corruzione delle acque , di notevole vizio alle viscere , nè finalmente in persona d'abito di corpo flemmatico , e rilasciato .

L' uso ancora degli emetici , prescritti con medica cautela , è stato da valenti professori riconosciuto ottinissimo per la cura delle idropisie . Convien però l'emetico quando l'ammalato non è ancora decaduto di forze ; non abbia le viscere infralite , nè addolentato l'addomine ; e che la malattia sia nel suo principio . La ragione per cui sono consigliati gli emetici nelle idropi , è quella della scossa , che producono al corpo , per cui si contraggono le parti rilasciate e deboli , e si sciogliono e si scompongono gli umori tenaci e condensati . BOERHAAVE , PRINGLE , LUDWIGI , CULLEN , preferiscono gli emetici antimoniali violenti , e ripetuti a corti intervalli . MACHENZIE soleva dare tre grani di vetro d'antimonio cerato ogni giorno , con cui provocava vomiti ed andate di corpo assai salutari . MUDGE trovò utili gli emetici uniti agli anodini . SAGAR assicura di avere guariti molt' idropici , dando ogni tre dì il tartaro emetico , qualora però non vi fossero nè ostruzioni , nè induramenti dei visceri . PERCIVAL persuade l' uso degli emetici nelle idropisie delle ovaie .

Alcuni scrittori hanno insistito per la cura delle idropisie sulla necessità dei purganti , così chiamati idragoghi , coi quali dare valerosa sortita anche per secesso alla superflua quantità delle acque stagnanti ; e fra questi rimedj , i più decantati sono la gomma gotta , l' elaterio , la gialappa col mercurio e coll' antimonio , o la gialappa col tartaro stibiato , il siroppo di spina cervina . STOCHERO , e Matteo de GRADIBUS preferirono il rabarbaro , perchè col soddisfare alla indicazione del purgare , si procurasse di dar tono ai visceri del basso ventre . I rimedj purganti , anche forti convengono , quando gli ammalati abbondano di umori tenaci ; che abbiano abusato di cibi farinosi ; che abitano luoghi umidi paludosi ; che siano senza febbre , senza inveterate ostruzioni del ventre inferiore con pericolo d'inscarrimento , e tuttora forti , e la malattia nel suo cominciamento . IPPOCRATE dissuadeva l' uso dei purganti , se la idropisia era molto avanzata ; ed il latinissimo CELSO , riguardo all' uso dei purgativi nelle idropisie , ecco come si espresse : *alvum moliri , cito melius est , quam medicamento . Si tamen res coget , ex his aliquid , quæ id præstant , erit decoquendum . eaque aqua potui danda* : se l'ammalato non è robusto , è da per se un contro indicante ai purgativi : *ubi fractæ vires , nocet vehemens per al un purgatio : quo plus enim humoris e corpore eiecitur , eo major ipsius copia brevi in cavitates restituit* , disse MEAD , e con non diversi sentimenti anche TISSOT : *collatis virtutibus purgantium , hydropicorum vitii inceptum videntur , in plerisque casibus , pharmacum : QUARIN* si è assicurato dell' efficacia del seguente elattuario purgativo , e che

come si è già detto, non farebbe che stancare l'ammalato in puro perditempo. Si prenda allora il

---

io pure ho adoperato una volta con buon effetto: Recipe di radice di ebbio, e di ginepro, ana once due: ossimele scilittico, once una: radice di gialappa, once mezza: arcano duplicato, dramme due: sciloppo di ianno catartico, q. b., per fare elettuario, di cui se ne porge una dramma replicatamente fino a che purga.

Più comunemente sono stati i medici d'ogni tempo inclinati a prescrivere i rimedj diuretici contro le idropisie, come la strada più ovvia, e più sicura per determinare la sortita delle acque stagnanti; e fra gli altri RIVERIO si era tanto persuaso del loro valore, che si esprime colle seguenti parole: *cæteris præstant medicamentis, quæ per urinas serosos humores evacuant, Et felicior ut plurimum curatio hac via solet succedere*: Anche sul proposito dei diuretici è necessario di avvertire, che non convengono d'essi pure inconsideratamente: primo, sono essi cattivi, quando le acque stagnanti sono tanto tenaci, che non possano essere riassorbite: secondo, se sono forti, e corrosivi, possono infiammare i reni e la vescica con notabilissimo pericolo dell'ammalato: terzo, e se sono finalmente dolci e rilassanti, possono accrescere la quantità del fluido nella massa umorale, senza procurare la sortita di quello già introdotto. Le cantarelle, per esempio, e le varie preparazioni di questi animalcetti, sono state da molti prescritte contro le idropisie; ma la costante osservazione dei più savj pratici ci fa vedere essere queste troppo violente nella loro azione, quasi sempre pericolose, e di rado apportatrici di una vera guarigione. Il meloe profcarabeo di LINNEO, come più mite delle cantarelle, è stato qualche volta da QUARIN adoperato con profitto unitamente al robo di sambuco.

I sudoriferi sono un'altra classe di rimedj, proposti a guarire la idropisia; e fra questi si possono in compendio riferire i bagni di sabbia al sole, già consigliati da CELSO, ed AVICENNA; la insolazione; le cinture piene di sale calcinato; le generali fregagioni con spugne inzuppate d'acqua di calce; il balsamo tolutano, peruviano, di copaiva; l'antimonio; la fuliggine, l'oppio; il vino d'antimonio unito alla tintura d'opio; rimedio assai usitato da MONRO' nello spedale di Edimburgo, ec. Possi leggere i diversi rimedj praticati per muovere il sudore negl' idropici, ciò che ne scrisse SCHULZE nella sua diss. *de hydrop. curat. antiq. Hal. 1743*. Ma anche i rimedj sudoriferi non si deggiono in ogni caso d'idropisia prescrivere indistintamente, massime se forti ed efficaci, perchè irritano, accrescono notabilmente il calore, scompongono e sciolgono il sangue, debilitano gli ammalati, e quasi fomentano la malattia medesima; quindi i giovani medici è bene, che sull'uso dei sudoriferi leggano per loro medica cautela ciò, che scrissero VAN-SWIETEN, e TISSOT.

La squilla è uno dei rimedj famigliari contro le idropisie, di cui fra gli altri il più volte nominato QUARIN ne ha fatto moltissimo discorso, e moltissima lode. TISSOT per avvalorare maggiormente l'azione della squilla, la prescrive unita al cremore di tartaro, il quale di per se è un altro poderoso diuretico. BOSQUILLON dice però di avere trovato più diuretico del cremore di tartaro la terra fogliata

partito di replicare , secondo il bisogno , la puntura , nelle persone altronde ben costituite , la quale uni-

Aa 4

di tartaro . Dandone fino ad un'oncia per giorno in una infusione di qualche pianta tonica : La radice di senega devesi giustamente annoverare fra i potenti anti-idropici , operando non solo come diuretica , ma anche promovendo la guarigione o coll'abbondante secesso , o col vomito o col sudore , secondo che il medico trova più indicato di risvegliare l'una o l'altra di queste escrezioni , ERNST , nella sua dottissima dissertazione *de Therapia hydropis* , propone la seguente ricetta a lui comunicata da cotal WENDT : si prendono due dramme di radice di senega polverata , ed una dramma di squilla egualmente in polvere : con suffic. quan. d'ollimele colchico si fa massa pillolare , da cui si formano pillole di due grani , delle quali se ne prendono mattina e sera daile cinque fino alle dieci : E' stata pure proposta la salivazione per togliere la idropisia , come . fra gli altri , ne parla MONRO' nel suo libro *an essay out the dropsy , and hits different species* ; ed una prodigiosa guarigione di un giovane ascitico guarito per mezzo del tialismo si legge nei commentarj di Liplia vol. IX. p. 441. LIND , *de morbis Europæorum in climatib. calidiorib.* ci attesta desso pure di avere guarito molte persone idropiche colla salivazione . Questa cura è però soltanto indicata nella somma tenacità degli umori , senza pericolo d'imminente corruzione ; che le forze reggano bene ; nè vi sia inscarrimento a qualche viscere : un ammalato con dolori venerei acerbi , caduto in una ostinata quartana , poi divenuto sformatamente gonfio , io lo guarj mirabilmente e dall'idrope , e dalla lue . avendo promossa col mercurio dolce , una lunga e moderata salivazione . Moltissima riputazione hanno avuto le pillole toniche del BACKER , uno dei fautori , come già si è detto , delle bevande zequose e diluenti nella cura delle idropisie : queste pillole sono fatte con un'oncia per forte d'estratto d'elieboro nero vinoso , e di mirra sciolta : una dramma di cardo benedetto polverizzato : si fanno pillole di mezzo grano : se ne prendono dieci di queste pillole , da ripeterli tre volte al giorno , e più o meno secondo il bisogno , e l'elito del rimedio : l'effetto di queste pillole è di promuovere abbondante secesso , ed in seguito copioso flusso d'urina : si beve una generosa dose di decotto di tarassaco , o simile , per ogni presa delle pillole : se provocano nausea , vomito , vertigine , si sospendono , o se ne diminuisce la dose : giovano esse principalmente nelle idropisie consecutive alle lunghe quartane , alle strabocchevoli evacuaizoni , ed ai patemi d'animo . QUARIN , non disapprovando l'uso di queste pillole , insiù però di avvertire infinitamente al loro effetto , perchè non ne debbano nascere improvvisi funesti accidenti ; anzi egli suggerisce di avere ottenuti migliori vantaggi dalla infusione , od estratto d'elieboro unitamente agli amaricanti , massime nei casi . che coll'ascite vi fosse unita ostruzione delle viscere , o troppa tenacità degli umori : Andrea PASTA , uomo di somma dottrina ed esperienza nella sua utilissima lettera intorno ad alcuni rimedj poco o nulla usati dai medici ,



tamente ai rimedj raccomandati agl' idropici incurabili li fa vivere un tempo considerevole, senza essere

dice di avere visti mirabili effetti per guarire l' ascite coll' uso dell' orina di vacca ( già dai Francesi insignita col seducente nome di *eau de millefleurs* ) alla quantità di quattr' once per più giorni . il quale rimedio . se addivenisse , che o si vomitasse , o nilsnn effetto operasse , per disinfalare i canali , si fa pigliare al paziente una o più volte il sale catartico amaro . Si usa anche il vomitivo , nel caso che lo stomaco sempre tornasse a rimettere il piscio di vacca ; e se addivene che ciò succeda per essere sgradito allo stomaco , s'addolcisce con poca porzione di zucchero , o di acqua cannella ; e se mai fosse , perchè l' orina è troppo carica , si usa quella di un' altra vacca , oppure quand' essa s' attrova al pascolo , che in allora è più scolorita e leggiera . Si fa bere all' infermo due once , quattr' ore innanzi il pranzo ; ed a proporzione dell' effetto si accresce o si diminuisce , o si continua : poi , cacciato che sia l' inimico fuori di casa , si fa passaggio ai rimedj calibeati , all' elisir viscerale dell' OFFMANNO , o ad altro tonico nervoso medicamento per rassodare le languide spostate fibre de' minimi insensibili canaletti : STORCK propose l' ossimele colchico , quale poderosissimo anti-idropico , perchè irritando le parti solide , le riduce a maggiore contrazione ; quindi agiscono più validamente sui fluidi ; l' umore tenace viscido contenuto nel condotto cibario lo assottiglia , e coll' accresciuto moto peristaltico fuori lo espelle ; onde la facile e benefica diarrea : Guglielmo WITHERINGS ( *an account of the Fox fove* , ec Birmingham 1735. 8. ) propone la digitale purpurea in tutte le specie d' idropisie , fuori delle faccate : si raccolgono le foglie , allo spuntare dei fiori , e tolte le fibre legnose , si seccano al sole od al fuoco , e si polverizzano : la dose per gli adulti è di un grano ai tre due volte al giorno , sola od unita a qualche polvere aromatica , o ridotta in pillole col sapone o colla gommammoniaco : si compone anche infusione con una dramma delle foglie secche infuse per quattr' ore in mezza libbra d' acqua bollente , aggiugnendo al licore un' oncia di qualche acqua spiritosa : dassi di questa infusione un' oncia due volte al giorno negli adulti . E' però questo un rimedio da usarsi con somma cautela , e da sospenderne l' uso . se porta vertigine , vomito , o dolori di ventre : Un sovrano rimedio ( *a sovereign remedy of the dropsy* , ec. London 1734. ) pubblicato in Inghilterra è quello di polverizzare finamente un' oncia di grano di ginestra ; ed infondere per dodici ore in un bicchiere e mezzo di vin bianco : questa dose vale per una volta presa ogni due giorni a digiuno , e passeggiare in seguito per un' ora e mezzo , e bere poi due once d' olio d' ulivo , e stare un' altra ora senza prendere cosa veruna : MAYERNE ha proposto l' allume come un potente urinario , e capace nello stesso tempo di estinguere la sete , e di guerentire dalla putredine , e di corroborare . PRINGLE raccomanda l' uso degli alcalini : GARDEN , e FRANKLIN le ceneri di tabacco . FORESTI il decotto od il sugo di marrubio nelle idropi con itterizia . DUVERNEY la graziosa . LINEO il sugo d' iride nostrale : MENGHINI il cremore di tartaro : BOSQUILLON l' opio coi cordiali . CIRILLO il solano officinale ;

soggetti a gravi incomodi , si può dire con sicurezza , che i giorni di molti ascitici sono abbreviati . per aver omeſſo questa regola , e perchè si differisce di fare la puntura , fino a che deſſi ſieno ſenza riſorſa , e le viſcere macerate dalle acque .

La difficoltà che avvi a riconoſcere negli aſciti lo ſtato dei viſceri ſepolti nelle acque , rende dubbio il prognostico di queſta malattia , e l'eſito incerto .

E' bene ritirare il canello immediatamente , che ſi rileva , che le acque ſono purulente , ſoſche , grigie , melmoſe , di cattivo odore , ed intriſe di ſanguine craſſo , e caricate nel medefimo tempo di filamenti ſanguigni . In queſti caſi l'evacuazione delle acque accelera la morte , e baſta attenerſi alla cura palliativa ſopra nominata per l'aſcite incurabile .

Le acque di buona qualità che ſi cavano colla puntura , ſono giallognole , inodore , leggiermente ſalate , che ſ' inſpeſſiſcono ſul fuoco come la chiara d'uovo : più elleno ſi allontanano da queſte qualità , più avvi a temere per il malato .

finalmente anche il ſalaſſo è ſtato giudicato valevole in alcuni caſi d'idropiſia : di eſſo ne hanno parlato IPPOCRATE , *Aleſſandro TRALLIANO* , e *Paolo d'EGINA* RIVERIO trovò neceſſario il ſalaſſo nelle idropi prodotte da fermento de meſtrui , o di moroidi . MEDICO parla di una ſpecie d'idropiſia accompagnata da febbre , da lui chiamata febbre idropica , la quale ſvanì coi ſoli rimedj antiſlogiſtici , avendo tutt' i ſegni di una vera infiammazione . DUTTIL ne accerta di avere ottenuti ottimi vantaggi dal ſalaſſo in alcune idropiſie , come poſſi leggere preſſo RICHARD de HAUTESIERCK , *recueil d'obſervat. de mèdec.* , ec. t. II p. 260 . e per ultimo il famoſiſſimo clinico STOLL dice di avere offervata chiaramente la idropiſia pletorica , e la cloroſi pletorica , nelle quali due malattie gli uſuali rimedj anti-idropici , ed anti clorotici ſono ſtati nocivi ; *profuerunt autem phlebotomia moderata , ſed aliquoties repetitate , & anti phlogiſticus victus . ( ratio medendi P. III. )*

Da tutto ciò ſi deduce , che in queſta , come anche in ogni altra malattia , non v'è un rimedio ſpecifico , e generale , dovendo anzi eſſere vario ed oppoſto giuſta le cagioni , che l'hanno prodotta , i temperamenti , ed i diverſi ſintomi , che l'accompagnano . *Il Tr.*

L'oppressione che sussiste dopo l'intera evacuazione del ventre operata dalla puntura, annuncia, che l'ascite è complicata coll'idrope del petto.

Le inquietudini accompagnate da brividi e da febbre, che sopraggiungono dopo che gli ammalati si sono sentiti sollevati dalla puntura, indicano, che si è fatto un ingorgamento nel basso ventre; ciò che è di cattivo augurio, atteso che quest'ingorgamenti finiscono colla gangrena.

Nissuno muore dalla puntura ben fatta; ma quelli che muojono dopo l'operazione, egli è a cagione del cattivo stato delle viscere bel basso ventre (n): in questi casi, la puntura non fa che differire un po' la morte.

Vi sono esempj di ascitici, ai quali si è fatta la puntura più di venti volte, e che negl' intervalli hanno potuto attendere alle proprie incombenze. Molti hanno pure esercitate le più faticose professioni.

#### *Idrope del petto (o) .*

L'idrope del petto, o lo spandimento d'acqua nella cavità del torace, è una malattia, la quale di rado si conosce nel suo principio. I sintomi che l'annunciano ordinariamente, sono un piccolo gonfiore edematoso alle caviglie, e che spesso si manifesta ancora sul di sopra delle mani. L'ammalato risente una strettezza assai leggiera alla forcilla dello stomaco, prodotta dalle acque, che, quand'egli è ritto in piedi, cadono sul diaframma. A questi sin-

(n) I visceri, che più facilmente soffrono nelle idropisie, sono il fegato e la milza. NICOLAI, *Pathologia*, tom. 1. pag. 163. e MORGAGNI, *de sedib. & caus. morb. epist.* 36. *Il Tr.*

(o) Ossia idrotorace. *Il Tr.*



tomi succedono più o meno oppressione e difficoltà a respirare, salendo le scale. Questi accidenti crescono a misura, che la malattia si avvanza. Fra la notte, gl' infermi sono sorpresi da soffocazioni, che si risvegliano come assaliti da timore; sono sforzati ad alzarli a mezza vita per avere il respiro, e respirare colla testa inclinata sul petto (p). Se non vi sono che delle acque sparse in una delle cavità del petto, il malato non può restare coricato sul lato sano, e quando si rivolge subitaneamente, o che per federli, ei si lascia andare sulla sua sedia, si accorge di una fluttuazione sorda, somiglievole al movimento dell' acqua scossa in una bottiglia semipiena (q). La difficoltà di respirare, e l' oppressione crescono più o meno celeremente al segno, che non può montare le scale senza sentirsi a soffocare, mentre che egli è in istato di passeggiare ancora senza grave incomodo sul piano. Le persone affette dall' idrope di petto, provano palpitazioni di cuore e secca tosse ferella; il polso è ineguale, e tante volte intermittente (r); le orine sono dappprincipio assai copiose e

(p) Carlo PISONE, nobile medico loreno, uomo di distintissima fama, nel suo libro *observ. & consil. de prætervisis hæcenus morb. a serosa colluvie ortis*, sect. 3. cap. 7. p. 296., così disse: *signum pathognomonicum statuerè oportet eam in spirando difficultatem, ac crebritatem, quæ de subito somni primo tempore invadat, & quiete defraudet*; questo segno è stato pure annunciato da BAGLIVIO (*præc. med. L. I.*), qual sicuro indizio dell' idrotorace. *Il Tr.*

(q) IPPOCRATE definì questo senso di fluttuazione nell' inclinare del corpo in questi termini: *si multo tempore, aure ad latera adhibitis non audire tentaveris, ebullit intrinsecus velut acetum* (lib. 2. de morbo. p. 35.) *Il Tr.*

(r) Il polso non è mai eguale in questa malattia: *pulsus magnus, elatus, tardus, intercisus erat, ac intercalarem habens in pulsatione una atque altera intermissionem*, riferisce BALLONIO: *pulsus valde inæquales*, RODERICO FONSECA: alcuni vogliono, che i polsi siano molli, frequenti, e piccoli, se l' fluido contenuto è puramente acquoso, e sottile: piccoli, e più frequenti, vibrati, e tesi, se l' umore è salino, e mordente: scaduti, e quasi insensibili, se il pericardio ancora è compreso dalla idropisia, e contenga tanto umore, quanto ne può capire la sua cavità. *Il Tr.*

chiare, ma diminuiscono in seguito e diventano spesse o mattonof. Quando l'idrope del petto è nel suo ultimo periodo, la gonfiezza delle estremità cresce; il malato ha febbre, soffocazioni, ansamenti durevoli e terribili; egli è strozzato e mortalmente sviene.

Quando l'idrope del petto è recente, e per ciò che riguarda la sua origine ed i sintomi generali della natura dell'ascite non incurabile, si userà qualche volta con successo il medesimo metodo ed i varj rimedj raccomandati per evacuare le acque degli ascitici. Si potrà ancora tentare la paracentesi del petto. La pleura e la membrana che involge i lobi del polmone, presentando meno superficie al riassorbimento, e queste parti essendo più tese e più secche, egli non basta di depurare soltanto gli umori bianchi, affine di favorire il riassorbimento di ciò che si è spanso, ma bisogna disciogliergli ancora; e frattanto che il malato sarà ancora in forza, si potrà tentare in questa malattia, di cui la speranza promette sì poco la guarigione (f), le pillole saponacee del Starchei, raccomandate per l'ascite. Ma quando questa malattia sarà inveterata, ed il malato avanzato in età o mal costituito, appena si può sollevarlo, coi mezzi indicati per l'ascite incurabile: si applica negl' insulti soffocativi il lavativo ammolliente e carminativo N.º 109.; e per lo stesso effetto, si esibiscono sette ad otto gocce di spirito di

(f) Ciò è pure asserito da gravissimi scrittori; e RIVERIO ebbe pur ragione di dire: *In iis, qui eo laborant, (parlando dell'idrotorace) color nationis admodum debilis est, viresque naturales languidae ex gravi aliquo viscerum affectu, unde fit, ut quomvis collectus humor remediis idoneis evacuetur, quod tamen difficilimum est, novus subinde fiat novae materiae affluxus, unde morbus non solum fructetur, sed etiam deterior in dies evadit, ita ut tandem in hydropem ascitem corpus incidat. Il Tr.*

sal ammoniaco anisato (t), in un cucchiajo d'acqua di fiori d'arancio.

Il malato eviterà gli acidi, e tutto ciò che potesse eccitare la tosse, e potrà per sollevarsi da questi sintomi, usare l'eglemma raddolcente N.º 44, od il loc di Parigi (u).

### *Idrope della matrice (x).*

L'idrope della matrice non faccata, e che di-

(t) Lo spirito volatile di sal ammoniaco è un alcali volatile, che serve di base al sal ammoniaco sciolto per qualche intermedio, che gli ha levato una parte del suo principio oleoso, che lo faceva cristallizzare e comparire sotto forma concreta; in maniera che dopo questa operazione rimane sempre fluido: Lo spirito volatile di sal ammoniaco anisato si fa con mezza libbra di sal ammoniaco polverato: ceneri erivellate libbre una: semi d'anisi once tre: spirito di vino libbre quattro: si distilla il tutto in vaso di vetro, e si cavano due libbre e mezzo di liquor oleoso volatile. *Il Tr.*

(u) Nei cali disperati, per vivere qualche tempo di più, e con minor pena, è la tenacissima dieta. Il cel. medico WEPFERO non trovò in se medesimo migliore spediente di uno strettissimo metodo di vivere. siccome ne testimonia BRUNNERO: *remedia varia tentavit, sed cuncto & prudenter, aperientia diuretica in usum vocavit, quibus cum vesicam affigi animadvertisset; solius gelatinæ C. C. usus inhaesit tantisper, dum, sollicita attentione, medicamentis nihilum profici expertus, unico dietæ, cujus exactissimus observator semper fuit, studuit, qua tantundem profecit, ut præter spem, hostem, etsi non profugavit, penitus tamen ne vitæ arcem occuparet, prohibuerit per unum alterumve annum.*

Il pericardio, si riempie anch'esso di siero, di linfa, di sangue, e questa malattia si chiama idrocardia o idropisia del pericardio. Il pericardio è un sacco il quale contiene il cuore. Le cagioni dell'idropisia del pericardio sono le palpitazioni violente, e le dilatazioni dei ventricoli e delle orecchiette del cuore; gli aneurismi dell'arteriaorta, l'infiammazione e gli ascessi del petto, ec.

E' difficilissimo a conoscere questa malattia; i segni però meno equivoci sono i deliquj, le palpitazioni, il difficile respiro con senso di oppressione alla regione del cuore, fluttuazione d'acqua che si sente sotto l'insulto delle palpitazioni, fra la terza, quarta, e quinta costa.

Se sono incerti i segni caratteristici della malattia, molto più incerta e dubbia è la cura. Il solo mezzo in cui vi sia qualche lusinga, si è la puntura, la quale si deve sempre arrischiare, qualora la malattia non sia accompagnata da altri vizj del petto. *Il Tr.*

(x) Ossia idrometra. *Il Tr.*



pende dal siero sparso nella sua cavità, è assai frequente. Quest' idrope rassomiglia dapprincipio alla gravidanza: il basso ventre si gonfia lentamente di modo che quantunque invece dei sintomi accessori della gravidanza, tali che la svogliatezza, il gonfiamento delle poppe, il movimento del fanciullo che si fa sentire alla metà della gravidanza, si rileva una fluttuazione oscura, ed il tumore segue le diverse situazioni, che l'ammalata prende.

Le conseguenze di quest' idrope sono la sfogosi o la corruzione lenta della matrice (*y*).

Si purga l'ammalata ogni otto giorni colle pillole purgative N.º 156. Negl' intervalli deve prendere mattina e sera dalle tre fino alle sei pillole gommose N.º 152., e dopo la presa della mattina, il brodo N.º 13. Dirigerà ancora due volte al giorno

(*y*) COUSIN, che ha scritto una diss. chirurgico-medica sopra la cura dell' idropisia di matrice con infiammazione nello stato di gravidanza, stampata in Parigi l'anno 1783., dice, che l'esito più ordinario di questa malattia è la cancrena: egli riporta la guarigione fatta nella Signora Camus, che si trovava gravida fra il settimo, e l'ottavo mese, quando fu presa dalla idropisia della matrice: faceva usare lavativi di linseme e butirro fresco: tutt' i giorni dava quat-  
tr' once per sorte di fiori di sambuco, e di acqua di borragine, con cui si promoveva abbondante sudore: alle parti pudende faceva usare delle embrocazioni, o pannolini caldi sopra la parte superiore del pube, e sopra i gran labbri, con decozione di malva, e fiori di sambuco, cambiati ogni quarto d'ora; e questi rimedj locali calmavano gli acerbi dolori, che la Signora soffriva in queste parti: tre giorni prima del parto vi aggiunse ad ogni libbra di questa decozione tre once di sale, ed ordinò il vin bianco di Borgogna, ed una tisana di guajaco, di cina, di cassaparilla, della seconda scorza di sambuco, di liquirizia, e di una dramma di cristallo minerale in due libbre d'acqua, ciò che la faceva urinare abbondantemente: questi rimedj furono continuati fino al giorno, in cui partorì felicemente: in seguito a che usò dei soliti cristieri, e di una tisana di gramigna, e di radice di canna collo scioppo di capelvenere: nel quarto giorno raddoppiò l'uso dei sudoriferi, colla giunta del cristallo minerale; e con siffatti rimedj l'ammalata guarì perfettamente. Egli abbandonò l'uso delle scarificazioni, praticato da molti professori dell'arte, per la facilità, che ha questa parte di cancrenarsi.  
Il Tr.

all' orificio interno della matrice , con un imbuto guernito , il vapore di una satura decozione di pulegio e di ruta , ungendo ancora mattina e sera , la regione della matrice coll' olio canforato raccomandato per l' ascite .

L' ammalata continuerà nell' uso di questi rimedj , fino a che le acque s' intrudono per l' orificio della matrice , e vengano a colare . S' elleno non producessero questo effetto , dopo quindici giorni che ne avrà usato , prenderà alcuni infessi , ed in seguito , a diverse riprese ogni due giorni , un pajo di grani di tartaro emetico , affine di facilitare l' evacuazione delle acque per mezzo delle scosse prodotte da questo rimedio .

*Idrocefalo , ossia idropisia della testa .*

Le raccolte di acqua nel capo si fanno od esternamente nei tegumenti , ed allora l' infeltrazione avviene fra la pelle ed il pericranio , in modo che il cranio è gonfio ed edematoso ; o le acque sono sparse internamente nei ventricoli del cervello . In quest' ultimo caso , l' acqua nei fanciulli , rimuove le suture del cranio ; la testa diviene insensibilmente di una mostruosa grossezza , e di un peso insopportabile : i malati sono languidi , tristi , pallidi , stupidi ; il naso si schiaccia , la fronte si alza , gli occhi sporgono in fuori , la pupilla si dilata , e la figura della testa diviene irregolare e spaventevole .

L' idrocefalo interno è un male particolare dei fanciulli appena nati : è malattia spesso lunga , incurabile , e muojono gli ammalati anche sotto l' operazione , che si fa per iscaricare le acque (z) .

---

(z) L' idrocefalo può nascere da imperizia delle mammane nel comprimere troppo la testa come fu notato da Paolo d'EGINA, lib. VI. cap. 3. *Hydrocephalum oriri, si caput a partu ab imperitis obstetricibus comprimitur . Il Tr.*

Se si vuole tentare qualche cosa, si purgheranno ogni quattro dì con una dramma, od una dose di siroppo domestico proporzionato alla loro età (*aa*): la testa si fomenterà con acqua di calce, unita ad una eguale porzione di spirito di lavanda, o di acqua della regina. Nei fanciulli, s'impiegheranno i medesimi rimedj con maggiore successo nell'idrocefalo esterno: se l'infermo è avanzato in età, si uniranno ai suddetti medicamenti esterni, quegli interni ed esterni raccomandati per l'anasarca.

Si comprime dolcemente il tumore a misura ch'egli diminuisce; e se l'idrocefalo esterno non si dissipa col favore di questi rimedj, si dà sfogo alle acque colle scarificazioni, o veramente con un setone fatto nella parte più inclinata del tumore (*bb*), mantenendo questo spurgo aperto secondo l'arte, colle precauzioni indicate all'articolo delle scalpature alla pelle, fino a che la gonfiezza sia assolutamente sparita. Nel medesimo tempo, ed ancora qualche tempo dopo l'evacuazione delle acque, si uteranno i fomenti e le compressioni suddette per dissipare le rimanste sierosità; ed affine di riaffermare la forza dei solidi (*cc*).

Idro-

---

(*aa*) Il siroppo domestico, ossia siroppo di spina cervina di VALCORDO è fatto col sugo depurato delle bacche di raano catartico, once venti: zucchero bianco, once trentadue: gengiovo, cinnamomo, cariofilli, ana dramme una e mezzo: matrice, semi d'aniso, ana dramme tre: si cuociono alcun poco, si chiariscono, e si conservano ad uso. *Il Tr.*

(*bb*) Il setone si fa con un filo di bambagia, o piuttosto rotolletto di pannolino introdotto sotto la pelle con una doppia apertura, in modo che il cotone, o pannolino essendo sotto la pelle, lascia vedere al di fuori i due capi: prima d'introdurre il setone, s'immerge nell'unguento basilico o digestivo, per facilitare la suppurazione, che scola per le due ferite: si mantiene questo spurgo, rinnovando il setone sempre spalmato d'unguento, fino a prescrizione del medico: cessato il bisogno, si ritira, e si seccano le ferite coll'impiastro diapalma, • di Norimberga, coperto da un piumacciolo imbevuto d'acqua vulneraria. *Il Tr.*

(*cc*) Anche il cervello è soggetto all'idrope conosciuta sotto nome



*Idrocele ossia idropisia dello scroto.*

Vi sono due specie d'idrocele: l'una che è la più comune, consiste in un infeltramento di sierosità nella membrana cellulare della borsa. Questo è un vero edema, e tale gonfiamento è per lo più complicato coll'idrope anasarca. Le borse sono più o meno gonfiate, pallide, fredde, lucenti, e compresse col dito vi si fa una fossetta come nell'edema.

La seconda specie proviene da uno spandimento d'acqua nella vaginale dell'uno o di tutte due i testicoli. Si distingue dalla durezza del tumore, che circonda così bene il testicolo da non poterli rilevare col tatto. Il tumore è della grossezza circa di un uovo di pollo, di figura ovale, eguale nella sua superficie, ed a meno che le acque non sian tenaci, è sempre più o meno trasparente, allorchè dopo avere un po' schiacciato lo scroto, lo si esamina tenendo un lume all'opposto.

Nella prima specie d'idrocele; sopravvengono spesso delle screpolature alle borse, per le quali le acque scolano, ma che degenerano facilmente in ulcere superficiali, facili a cangrenarsi. La seconda specie dispone all'inflammazione ed alla corruzione del testicolo.

Tom. I.

B b

---

me d'idromeningocoele. Questa idropisia si fa tra il cervello e le meningi, spingendo le dette membrane fuori delle suture del cranio in guisa di tumore. Si divide in semplice ed in composto: il semplice quando il tumore è puramente acquoso: composto, quando col tumore vi è unita qualche porzione del cervello: le cagioni sono le medesime dell'idrocefalo; questa però si distingue dalla gonfiezza della faccia e delle palpebre, da una invincibile inclinazione al sonno; da subdelirio; dalla piccolezza e lentore del polso: la cura, nel suo principio è la stessa dell'idrocefalo interno. Avvertirà solo il professore che l'ammalato cuopra il capo con pannolini inzuppati in qualche liquore spiritoso, e di avvicinare appoco appoco le ossa del cranio, perchè si possano unire a proporzione dello scemamento dell'acqua. Il Tr.

Nel primo caso , conviene il già raccomandato per l'anasarca , e per la gonfiezza dello scroto in particolare . Nel caso che il male sia considerevole , ribelle e non complicato coll'anasarca , si dà sfogo alle acque colle scarificazioni .

La seconda specie si guarisce di rado coi rimedj idragoghi . Si tenterà non pertanto il regolamento ed i rimedj indicati per l'ascite : si fomenterà lo scroto coll'acqua di calce unita ad un terzo di spirito di levanda , o con il fomento aromatico N.º 78. Se questo metodo è inefficace , si svuoterà il sacco colla puntura , perfumando poi lo scroto più volte con l'incenso , affine di corroborarlo . Nel caso che il malato abbia i solidi rilasciati , starà al regolamento , e rimedj corroboranti raccomandati per consolidare la guarigione degli ascitici ; e se il gonfiamento ricomparisse dopo la prima funzione , si limiterà alla cura palliativa , che è di replicare la puntura secondo il bisogno : Nel caso si voglia tentare la guarigione , si aprirà il sacco secondo l'arte , mantenendo la suppurazione per un tempo sufficiente per consumare una gran parte del sacco , affine ch'ei non faccia una cicatrice ristretta e solida : L'idrocele familiare ai bambini , si dissipa tante volte insensibilmente ; basterà d'involgere lo scroto in un pannolino caldo e perfumato d'incenso . In tutti i casi dell'idrocele non si abbandonerà il sospenforio da continuarsi a servirsene , anche un lungo tempo dopo la guarigione (dd) .

(dd) Io credo essere troppo necessario di parlare di un'altra specie d'idropisia , generalmente poco conosciuta , chiamata idrorachite , ossia idropisia della spina , da alcuni nominata spina bifida , quasi che le vertebre si dividessero in due parti .

L'idrorachite è un male proprio dei fanciulli appena nati , quantunque alcune volte si riscontra nelle persone adulte .

## DELLE AFFEZIONI CONVULSIVE, SPASMODICHE, E PARALITICHE IN GENERALE.

**S**I fa dalla anatomia, e dalla cognizione degli usi delle varie parti, che compongono il corpo umano, che i nostri movimenti tanto voluntarj, che involontarj, sono unicamente l'effetto dell'azione dei muscoli, i quali, accorciandosi, avvicinano le parti, ch'essi fanno muovere in vista della meccanica disposizione delle loro attaccature. Egli è ancora provato, che i nervi sono i principali moventi dei muscoli, e che dipende dal loro ministero l'esecuzione della nostra volontà, come anche l'essere

Bb 2

---

Si divide l'idrorachite in semplice ed in complicata: semplice dicesi, quando la spina è soltanto viziata; complicata, quando è congiunta coll'idrocefalo.

I segni della spina bifida sono un pallido, molle, lucido, eccedente tumore della spina. Gli ammalati sono languidi, deboli; perdono inopinatamente le fecce e le urine; le parti sottoposte al tumore si dimagrano, e diventano come paralitiche.

La cagione immediata della spina bifida semplice, è la congestione dell'umore che irrorà la midolla e le membrane interne della colonna vertebrale. La cagione poi immediata della spina bifida complicata, è l'umore che dapprincipio è adunato nella membrana aracnoidea del cervello, ed appoco appoco insinuato nella corona delle vertebre, o veramente nei primi tre ventricoli del cervello, il quale avendo preso in questo caso il suo corso per l'aquidotto del Silvio, è passato nel quarto ventricolo, e da questo si è aperta la via nel foro occipitale, e si è sparso nel canale delle meningi, le quali distende e scosta dalla midolla spinale. *NESSEI Instituz. chirurgiche.*

Le cagioni remote sono le medesime dell'idrocefalo.

Difficilissima è la cura di questo male; e l'apertura stessa del tumore cagiona tante volte la morte.

La cura pertanto della spina bifida si comprende consistere principalmente in un metodo palliativo, cioè a dire nei corroboranti e negli spiritosi rimedj, applicati però in modo, che non comprimo il tumore per non eccitarne la convulsione: giova un setone grosso, fatto in modo che lascia lentamente scorrere l'acqua stagnante del tumore. *Il Tr.*



noi sensibili ed irritabili. Altronde, la medicina pratica c' insegna, che le principali malattie dipendenti dai disordini dell' azione muscolare, si riducono alle convulsioni, agli spasmi, ed alle affezioni paralitiche, senza, o con perdita del sentimento nella parte affetta (a).

(a) Il sistema nervoso è l'organo del sentimento e del moto: gli oggetti esterni non si presentano all'anima nostra, se non che coll' ajuto dei nervi; e tutt' i movimenti del nostro corpo sono eseguiti dalle fibre muscolari, di cui l' azione trovasi strettamente legata a quella dei nervi. Col mezzo dunque dei nervi soltanto noi possiamo comunicare con tutto ciò, che ci circonda: per opera loro avviene, che noi viviamo; ed essi sono il principale agente dell' economia animale.

I fisiologi non hanno generalmente ammesso, che le fibre muscolari sieno una continuazione della sostanza del cervello, e dei nervi; e gli anatomici non l' hanno affatto dimostrato; ma ciò poco importa. A noi basta il sapere, che, eccettuandone la contrazione e la forza di coesione delle loro parti, i muscoli non possiedono punto altre proprietà diverse da quelle dei nervi, posto che gli uni, e gli altri servono egualmente a propagare que' movimenti, che nervi vengono appellati.

Lo spasmo differisce dalla contrazione naturale in ciò, ch' egli sussiste senza il concorso della volontà, e degli altri stimolanti naturali de' muscoli: quando la contrazione muscolare viene prodotta da altre cause diverse da quelle, che l' eccitano generalmente; qualora ella si fa con velocità, e forza straordinaria; e soprattutto quando le contrazioni e i rilassamenti alternativi si ripetono frequentemente, ed in una maniera, che non è naturale. Simili movimenti si chiamano convulsioni: lo stato però di convulsione non viene abbastanza distinto da quello di spasmo, spessissimo si confondono, ed applicasi loro indifferentemente l' uno e l' altro di questi nomi. Sembra però, ch' essi differiscano essenzialmente, da che la contrazione spasmodica è di lunga durata, quando che la contrazione convulsiva è più breve, ed alterna naturalmente con uno stato di rilassamento. Vero si è, che noi non siamo bastevolmente istrutti delle loro cause, per distinguerli, come bisogna, in patologia; osserviamo però che sovente s' incontrano insieme, o si succedono l' uno all' altro, come accidenti della stessa malattia, e spesso ci riesce di guarirli co' medesimi rimedj. Nulla di manco può dirsi, benchè ciò non sia senza eccezioni, che lo spasmo va congiunto coll' eccesso di qualcheduna delle forze, donde dipende la causa prossima della contrazione; ovvero con qualche irritamento costante, e soprannaturale, e che la convulsione è piuttosto l' effetto di un eccesso di mobilità, ovvero di qualche irregolarità nella distribuzione, e nell' influenza delle forze animali.

Così ragiona *De la ROCHE* nella sua *Analisi delle funzioni del sistema nervoso. Il Tr.*

La convulsione consiste nella contrazione momentanea, replicata, violenta, ed involontaria dei muscoli, il cui grado più leggiero è nominato tremore di nervi.

Lo sternuto e 'l singhiozzo, sono de' pure movimenti convulsivi. Il primo passa dalle narici al petto, ed il secondo dallo stomaco al diaframma.

Si sopprime tante volte lo sternuto, col tirare su per le narici del latte tiepido; ed il singhiozzo, quand'è leggiero, col ritenere reiteratamente il respiro per tutto il possibil tempo; ed ancora coll'excitare lo sternuto, o con una paglia, o con una presa di tabacco (b). Se ciò non arrestasse il singhiozzo, e che il malato fosse soggetto all'acrimonia dello stomaco, berà latte tiepido; e se fosse incomodato dagli acidi, prenderà alcuni cucchiaj d'olio vergine, o di ora in ora, la polvere assorbente N.º 169. Quando il singhiozzo sopravviene immediatamente dopo aver mangiato troppo, o troppo celeremente, si calma con un pajo di tazze d'infusione di camomilla, e si applica ancora sulla bocca dello stomaco una crosta di pane tostato, inzuppata nell'acquavite. Nei casi indicati, tutte le volte che il singhiozzo sarà ostinato, si purgherà colla pozione lassativa N.º 166.; e se andasse e venisse abitualmente senza manifesta cagione, si darà mattina e sera, per una decina di giorni, mezza dramma di china polverata (c).

Bb 3

(b) *Singultum sternutatio superveniens solvit*, disse IPPOCRATE. *Il Tr.*

(c) Convengono nei singhiozzi semplicemente convulsivi, il muschio, e l'opio. Se è prodotto il singhiozzo da veleno, o da foverchia bile, senza infiammazione, si dà l'emetico; se da vermi, i purganti antelmintici mercuriali; se da gotta o da altra materia acre ripercossa, il vesicante all'addome, ed alla pianta dei piedi: *Il Tr.*

Il singhiozzo sopraggiunto alla ipercatarisi, senza segno d'infiammazione, si toglie con una presa di diascordio, o delle gocce anodine N.º 89., avvertendo di prendere per primo alimento due ore dopo una fetta di pane abbrustolita, aspersa di zucchero e cannella, ed inzuppata nel vino. Per ciò che riguarda il singhiozzo sintomatico, che sopravviene nelle febbri continue ed infiammatorie, si consulti l'articolo dei sintomi febbrili in generale.

Le convulsioni propriamente dette si conoscono dai movimenti irregolari dei muscoli delle parti affette; per esempio da quelli del globo dell'occhio, dallo stridore dei denti; e da diversi altri movimenti involontarij, e replicati, o della faccia, o delle altre parti del corpo. Gli ammalati sembrano qualche volta ridere o piangere; fanno tutta sorte di contorsioni, ora più ora meno, con una o più parti del corpo, secondo la natura e la violenza della cagione, e delle parti convulse.

Il frequente ritorno delle convulsioni dispone allo stupore; alla debolezza delle parti, spesso attaccate; alla paralisi, alla defformità, alla stupidità, ec.

Le convulsioni subitanee sopraggiungono nelle soffocazioni isteriche, nelle grandi perdite del sangue, nei vivi dolori; e nella irritazione delle prime vie, prodotta da materie acri, dai vermi, dalla dentizione, ec. Succedono ancora alla morficatura degl' insetti velenosi, alle passioni ed affezioni vive dell' anima, ec.

Nelle affezioni isteriche, e nella dentizione si consulti il già prescritto a questo proposito.

Se le convulsioni sopraggiungono all'emorragia, si cerca di sopprimerla, usando in appresso gli alimenti, ed i ristoranti indicati per le copiose emorragie. Nel secondo caso, se il dolore è esterno, si applica, per calmarlo il cataplasma ammollente,



unito ad un fello di triaca; e per indebolire la sensibilità, si danno le gocce anodine N.º 89.

Se il dolore proviene da qualche filamento nervoso, punto, od offeso, e che non si possa raggiungere, si assopisce con alcune gocce di spirito caldo di trebintina, fatto colare sul filamento, o lo si distrugge col ferro, o col cauterio. Nel terzo caso, se lo stato dell'ammalato non permette immediatamente l'evacuazione della cagione irritante, si calma frattanto, come si è detto più sopra, ed ancora colla bevanda abbondante d'infusione di fiori di tiglio, svuotando nel medesimo tempo gl'intestini col lavativo domestico N.º 108.; e se vi fosse pienezza, col purgativo N.º 111. Si saprà cogl'indizj dati, parlando dei vermi, se il malato ne ha, per curarlo conseguentemente. Nel caso che la favorra allo stomaco, o l'acrimoniosa pienezza del basso ventre fossero le cagioni stimolanti, si evacueranno secondo la loro sede colla polvere d'ipecacuanà N.º 102., o colla pozione mannata N.º 167., da replicarsi, come pure i lavativi, secondo il bisogno.

Le convulsioni che sopraggiungono al morso degl'insetti velenosi, si tratteranno, com'è stato detto, parlando dei veleni.

Quand'elleno invadono persone agitate da vive passioni, si acquietano colle gocce anodine, e colla copiosa bevanda d'acqua fresca, o colla infusione di fiori di tiglio, e se ciò non basta, si ricorre al salasso.

Allorchè le convulsioni nascono senz'alcuna cagione evidente, non si può che ricorrere agli specifici, già stimati per i buoni effetti, che hanno costantemente prodotti. A questo titolo si userà la mistura, e le gocce anti-spasmodiche, N.º 120., e 90., delle quali la prima si darà alle persone deboli, e nelle leggiere convulsioni; ma nei mali più urgenti, si preferiranno le gocce. Finalmente, in tut-

ti questi casi, ad eccezione del primo, si daranno uno o due lavativi domestici, e per bevanda la infusione anti-spasmodica N.° 86.: durante gli accessi, basterà il solo brodo, e negl' intervalli, gli alimenti del regolamento B., i più confacevoli al temperamento ed alla conosciuta cagione del male.

Alle convulsioni dei fanciulli poppanti, per lo più provenienti dal latte rappreso nelle prime vie, vi si rimedia, com'è stato detto nell' articolo delle malattie dei fanciulli.

Quelle consecutive alle ferite, ai vivi dolori prodotti dalla piaga, si calmano con alcune gocce di spirito di trebentina, stillate calde nella ferita, come ancora, tagliando interamente i filamenti nervosi, che sono frammezzo, e coll' estrazione dei corpi estranei, se ve ne fossero.

Le accidentali sopravvenute alle febbri, si curano, come si è detto, parlando dei sintomi febbrili in generale.

Il latte d' asina preso mattina e sera, con un bolo di sei grani di estratto di valeriana minore, ed altrettanto di estratto di chinachina, ordinariamente riesce nelle affezioni convulsive croniche, soprattutto quando nel medesimo tempo si passa appoco appoco ai grandi esercizi. Quelli di temperamento secco prendano preventivamente una ventina di bagni domestici tiepidi.

*Ballo di S. Vito (d).*

Questa malattia è un' affezione convulsiva, la

(d) Il nome di S. Vito è stato dato a questo male, perchè ogni anno nel mese di Maggio si celebra la festa in una cappella di S. Vito vicino ad Ulm, città imperiale, dove tutti i fanatici circonvicini vi concorrono per ballare il giorno e la notte in onore del Santo, finchè cadono in convulsioni, o come in una specie di estasi. Questa malattia è stata chiamata *chorea S. Viti* da SYDENHAM, e da altri *Scelotirbe*: *Il Tr.*

quale invade principalmente i fanciulli dei dieci anni, fino alla pubertà. La si conosce da una specie di zoppicamento: i malati strascinano le loro gambe, come fanno gli stupidi: allorchè portano il braccio al petto od altrove, ponno appena tenerlo un momento nella medesima situazione, e sono obbligati di cangiar luogo continuamente; fanno infiniti gesti, prima di portare, p. e. il bicchiere alla bocca; e la mano che è rimossa dai movimenti convulsivi, s'avvolge dall'un lato all'altro in un modo, che raggiungono, quasi per azzardo, i bordi del bicchiere.

Se non si scopre la cagione, per combattere ragionevolmente questa malattia, in seguito ad evidenti indicazioni, siccome di vermi, subitaneo spavento, imitazione, irritazione seminale, ec., si salassa, e si purga alternativamente, due o tre volte nello spazio di quindici giorni. Negl' intervalli, si tentano gli anti-spasmodici raccomandati all' articolo precedente, i quali riuscendo inutili, si praticano i bagni, il latte d' asina, ed i boli proposti per le convulsioni croniche.

Si sono viste persone sorprese da questa malattia, danzare come fanatici (e). I malati soggiacendo a recidivare alla fine dell' anno, si guerentiranno col salasso, colla purga, coi bagni, e per otto giorni, coi boli suddetti, raddoppiandone le dosi (f).

---

(e) Tante volte s' infigge questa malattia dagli scelerati e dai furbi per esimersi dalle fatiche, o da qualche castigo, o per invitare alla compassione; quindi è necessario, che il medico, per non essere ingannato, rilevi attentamente, quant' è possibile la cagione del male: *Il Tr.*

(f) Convengono ancora mirabilmente i bagni freddi, l' embrocazioni delle acque termali, la musica, e soprattutto la elettricità, tanto comendata da *de HAEN*: *Il Tr.*



*Epilessia (g).*

Si conosce questa triste e funesta malattia, in ciò, che quelli che ne sono attaccati, cadono e perdono subitamente ogni senso e cognizione: hanno dei movimenti convulsivi, che gli scuotono, e producono contorsioni, ed agitazioni così variate, che non avvi gesto o posizione, che non si veda eseguire durante il parossismo: ordinariamente essi ripiegano il pollice dentro la mano; stridono i denti; gettano spuma dalla bocca, e spandono, nei forti insulti, lo sperma (*b*); le orine, gli escrementi. I parossismi epilettici, sono sospesi per alcuni momenti, e gl' infermi si trovano dappoi scaduti di forze, ed oppressi dalla fatica e dalla debolezza.

Oltre le conseguenze delle convulsioni indicate, l'epilessia dispone ancora all'apoplessia, all'emorragie, ed a tutti gli accidenti provenienti dalle cadute; e commozioni, ec., alle quali sono essi esposti (*i*).

Tutto ciò che può farsi negl' insulti di questo male, è di prevenire che gli epilettici non si taglino la lingua, frapponendo perciò fra i denti qualche cosa, che impedisca le mascelle di avvicinarsi,

(*g*) L'epilessia è pure chiamata mal caduco, mal maestro, brutto male, mal benedetto, ad imitazione dei Greci, appresso dei quali dicevasi *morbus sacer*, essendo loro uso di chiamare sacra ogni cosa grande, onde VIRGILIO disse: *Auri sacra fames quid non mortalia peiora cogis?*

CELSE chiamò l'epilessia il male maggiore: nelle sacre carte è detto male lunatico e presso alcuni altri scrittori dell'antichità trovasi detto, male erculeo, male dei comizj, male della terra, male di S. Giovanni. ec.: *Il Tr.*

(*b*) *In epileptico paroxysmo ( interdum ) semen profuit.* ARÆTÆUS: *Il Tr.*

(*i*) *Desinit epilepsia in apoplexiam, paralysem, hemiplegiam, maniam, fatuitatem, hecticam, omne fatali.* WEBER, *de caus. & sign. morbor.*: *Il Tr.*

siccome un cucchiajo , una chiave, ed ancor meglio un pezzo di legno duro ed appiattito ; coricarli in modo che non si offendano colle convulsive distensioni , e si fanno generali fregagioni , o dove può essere praticabile , con panni caldi .

Rispetto alla cura , dirò in primo luogo , che quella ereditaria , e che passa dai genitori ai fanciulli , o dagli avoli ai pronipoti , come quella che si riporta col nascere , per essere stata la madre colpita nella sua gravidanza dalla vista di un accesso epilettico (*k*) , sono dichiarate incurabili . Nel caso contrario , avvi luogo di sperarne la guarigione se i parossismi sono sempre preceduti da un medesimo male che si faccia sentire al basso ventre od altrove fuori della testa (*l*) . Bisognerà dunque investigare la natura e la sede di questo primo irritante ; e se gl' insulti dipendessero dall' una o dall' altra delle cause , che producono le convulsioni , siccome dai vermi o da un' acrimonia caustica nelle prime vie , si cureranno i malati in conseguenza di queste ca-

(*k*) Egli è innegabile , che la epilessia sia ereditaria , ma non puossi accordare all' autore , ch' ella nasca dallo spavento o dall' immaginazione della madre in istato di gravidanza . Conviene leggere a questo proposito il Trattato dell' epilessia di TISSOT , e soprattutto il grande HALLERO , il quale francamente asserisce essere falso ciò , che diceasi delle voglie delle donne gravide , e degli effetti della loro riscaldata immaginazione : *Il Tr.*

(*l*) Le specie della epilessia sono idiopatiche o sintomatiche . Le specie d' epilessia idiopatica , sono 1. l' epilessia cerebrale : 2. l' epilessia simpatica : 3. l' epilessia occasionale .

1. L' epilessia cerebrale sopraggiunge in un tratto senza veruna evidente cagione ; nè è preceduta da alcun senso disagiabile , tranne qualche volta leggiera vertigine .

2. L' epilessia simpatica nasce dessa pure senza manifesta cagione ; ma è preceduta da un senso di vapore che pare alzarli da una parte del corpo , siccome dal piede , o dalla mano , e portarsi alla testa ; questo vapore è nominato volgarmente *aura convulsiva* , *aura venesca* , cc.

3. L' epilessia occasionale è chiaramente prodotta da una irritazione , e cessa , quando l' irritazione finisce . BOSQUILLON l. c. : *Il Tr.*

396 *Delle affezioni convulsive, spasmodiche,*  
gioni, e come è stato raccomandato all' articolo delle convulsioni, e favorra nelle prime vie.

Nel caso che al principio del parossismo, il malato senta risalire una specie di freddo vapore, dal dito grosso del piede, o da un altro dito, si legherà questa parte colla seta alcun poco superiormente al luogo, da cui questa sensazione prende origine. Questa legatura sarà forte; e non bastando essa per arrestare l'ascesa di questo vapore, si distruggerà colla moxa o coll' incisione, il nervo, daddove ella deriva, o si potrà ancora amputare la falange affetta.

Allorchè il parossismo nasce in una parte, dove si possa applicare un vescicante, si farà; e s'egli solleva il malato, converrà mantenerlo e rinnovarlo ancora (m).

Quando al contrario l'epilessia succede alle soppressioni delle emorroidi, dei menstrui, o di altro consimile beneficio, si ristabiliscano questi scoli benefici, coi mezzi indicati parlando di queste soppressioni.

Se la cagione dell'epilessia fosse oscura, ed incognita, il malato sanguigno, e la malattia suscettibile di guarigione, si toglie indebolendola col salasso al piede, replicato ogni tre mesi, poco prima del plenilunio o novilunio, secondo che gli accessi hanno relazione con quest'epoche. Purgasi l'ammalato una volta al mese, e si replica la purgazione tre o quattro volte, e questa pochi giorni prima dei parossismi se sono regolari (n), colle pillole N.° 155. Negl' intervalli delle purghe, si rimedia alla costipazione, ed alla stituità, col clistere am-

---

(m) In questi casi hanno pure giovato i cauterj ed i setoni messi sulla parte, dalle quali si conosceva insorgere l'accesso: *Il Tr.*

(n) Nei parossismi regolari della epilessia non vi è più sicuro rimedio della chinachina: *Il Tr.*



molliente carminativo N.º 109.; e per lo spazio di tre meſi, ſi dà la mattina a digiuno, e quattr' ore dopo il mezzo giorno il bolo dei due eſtratti raccomandati alla fine dell' articolo delle convulſioni, il quale ſe non rieſciſſe, ſi dà 20. grani di polvere di goteta (o), ed immediatamente dopo l' uno o l' altro di queſti medicamenti, ſei once del decotto fatto con un' oncia di legno guajaco, due once di radice di valeriana minore, e mezz' oncia di viſchio quercino, che ſi fa bollire a piccolo fuoco con tre libbre d' acqua, tritate ed unite aſſieme per lo ſpazio di un quarto d' ora. Sè ciò foſſe infruttuoſo, daſſi, nel primo cucchiajo di queſto decotto, ſei gocce d' olio animale del Dippelio (p).

Se al contrario il malato foſſe ſtemmatico, ſi omette il ſalaffo; ma invece ſi appone un cauterio alla nuca, ed un altro alla gamba; ſi danno i medicamenti ſopra deſcritti, aggiugnendo a ciaſcuna preſa della ſuddetta decozione, dieci gocce dello ſpirito volatile oleoſo del Silvio (q), invece del ſud-

(o) La polvere di goteta è fatta con viſco quercino, e radici di ditamo bianco e peonia, e ſemi di peonia, un' oncia per forte, ſemi di atrepice, e coralli roſſi preparati, mezz' oncia per forte, unghia d' Alce un' oncia: *Il Tr.*

(p) L' olio animale del DIPPELIO ſi cava con conveniente apparato dal corno di cervo. Egli è ſtato dichiarato, rimedio ſpecifico della epileſſia, ed in oggi della idrofobia e buono ancora a correggere il veleno del Lauroceraſo, *VATER Program. de olei animal. efficacia contra hydrop., & venenum Lauroceraſi*: L' olio animale del DIPPELIO ſi deve ſcegliere bianco, trasparente, aromatico, il più leggiere, dopo l' etere, di ogni altro liquore: *Il Tr.*

(q) Lo ſpirito volatile oleoſo del SILVIO, detto anche aromatico del SILVIO è fatto con ſei dramme per forte di ſcorze freſche di cedro e di arancio; con due dramme per forte di vaniglia e di macis; mezza dramma di garofano, una dramma di cannella, e quattr' once di ſal ammoniaco. Ammaccate tutte queſte ſoſtanze ſi mettono in una ſtorta di vetro, e vi ſi verſa ſopra quattr' once per forte d' acqua ſemplice di cannella e ſpirito di vino rettificato. Si fa digerire queſto miſcuglio per alcuni giorni, agitandolo di tempo in tempo, aggiugnendo allora nella ſtorta quattr' once di ſale di.

detto olio animale. L'epilessia la quale senza cagione evidente attacca le persone deboli e molto irritabili, si guarisce facilmente coll'uso di un esercizio continuato, e col bolo sopra descritto, continuato lungamente, avvertendo di accrescere appoco appoco le dosi sopra mentovate.

Rispetto al regolamento, tutti gli epilettici osserveranno esattamente quello della lettera B., evitando tutto ciò ch'essi avranno provato essere contrario; siccome i piaceri di Venere (*v*), il vino e ciò che riscalda, irrita, snerva od agita il corpo, e specialmente lo spirito.

L'età pubere nei maschi (*f*), e le menstruazioni nel sesso, fanno terminare spesso l'epilessia; e la dentizione per lo contrario la produce nei fanciulli.

Le cagioni assolutamente diverse che promuovono l'epilessia, tolgono ogni speranza di ritrovare in un solo e medesimo rimedio uno specifico per questa malattia (*t*); ma ve ne hanno e se ne ponno scoprire ancora dei rimedj efficaci per distruggerne

tartaro. Adattati alla storta un pallone forato di piccolo buco, esattamente chiuso con loto, e messo a distillare a bagno-maria, conservandone il liquore che ne proviene.

Questo rimedio non è solo chiamato anti-epilettico, ed anti-storico, ma ancora buono nella paralizia, nello scorbutico, e segnatamente come sudorifero nelle febbri maligne: *Il Tr.*

(*v*) L'uso di Venere, siccom'è nominato una leggiere epilessia, non conviene negli epilettici, se il male è essenziale: è però necessario, se la epilessia è prodotta da soverchio seme ritenuto: *Il Tr.*

(*f*) Riferisce SVETONIO che col beneficio dell'età, l'imperatore CALLIGOLA si liberò dall'epilessia: *Il Tr.*

(*t*) Benchè nella maggior parte degli uomini, dice benissimo a questo proposito l'eruditissimo COCCHI, soggetti a questo male, si offervi l'inutilità anco dei più decantati rimedj, e benchè il toscano Esculapio REDI non potesse curarlo in se medesimo, ragion vuole, che si creda, che qualche artificio medico può almeno facilitarne la natural soluzione, che alle volte felicemente succede, e può prolungare gl'intervalli di quiete, e accorciare e mitigare gl'infulti. Massime se tale infermità dependa non tanto da solida ed organica lesiva difformazione delle parti contenenti, quanto da viziato moto, o distribuzione, o quantità, o evacuazione degli umori, o da qualche loro deposizione, e corrutela, che operi come materia estranea, e venefica: *Il Tr.*

alcune . Io quì non riferirò i medicamenti , che sono stati annunciati come specifici , per non dar luogo agli abusi , innanzi che i casi , nei quali riescissero , siano bene determinati (u) .

Sarà bene lo sperimentare le polveri anti-convulsive , motivate al fine dell' articolo delle convulsioni , le quali lungamente continuate , hanno prodotto buoni effetti e mai alcun nocumento .

## DELLO SPASIMO IN GENERALE , E DELLE AFFEZIONI SPASMODICHE ESTERNE (a) .

**L**O spasimo consiste nella contrazione violenta , involontaria o dolorosa di uno o più muscoli .

(u) I rimedj dichiarati specifici di questo male , ed usati qualche volta con buon successo , sono , l' opio , le foglie d' arancio , il mercurio , l' antimonio , la chinachina , la canfora , il castoreo , l' asafetida , i fiori di zinco , l' arsenico , il rame e tutte le sue preparazioni , il ferro ed i varj suoi preparati , il cinabro , l' acqua fredda , la valeriana , la peonia , il giosquiamo , il muschio , ec. : *Il Tr.*

(a) L' aumento di mobilità , o di tensione , o di forza nei muscoli , che superi la facoltà animale di ritenerli quieti , e lenti secondo la volontà , costituisce un contrario genere di mali del cervello , o nervosi , che nel linguaggio comune , che ora si usa dai medici alquanto infetto di barbarismo , si distinguono col nome di convulsivi . I Greci chiamaronli spasimi , ed i Latini o distensioni o rigori , o contrazioni , sicchè nel nostro volgare ben se ne esprime la medesima generale idea , quando si dicono stiramenti . **COCCHI :**

Gli spasimi , o stiramenti , che vogliansi nominare , si dividono in tonici , e clonici : Nello stato di malattia , le contrazioni dei muscoli e delle fibre motrici , che ordinariamente dependono dalla volontà , si fanno senza il suo concorso , od in un modo opposto alla volontà ; e le altre funzioni sono determinate ad eseguirsi per l' azione delle cagioni , che non sono nè ordinarie , nè naturali . In questi due casi vi ponno essere due stati diversi di contrazione : nell' uno , le contrazioni sono portate a un grado più considerevole , che non è l' ordinario nello stato di salute , e non sostituite da uno spontaneo rilasciamento ; non cedono ancora facilmente alla estensione , nè anche quando vi si applicano altre potenze capaci di produrre l' estensione . Questo stato di contrazione è ciò , che chiamasi spasmo tonico , e che **CULLEN** chiama semplicemente e strettamente spasimo . L' altro stato morboso delle contrazioni è quello , in cui succede un rilasciamento ; e questo stato morboso di contrazione è quello chiamato spasmo clonico , e che **CULLEN** chiama semplicemente , e strettamente convulsione : *Il Tr.*



La contrazione spasmodica dura sempre qualche tempo, e perciò la si distingue principalmente dalle convulsioni.

Lo spasmo che attacca le polpe delle gambe, le dita, o i pollici del piede, è chiamato granchio. Questo incomodo è passeggero, non pericoloso; ma invece egli è tante volte dolorosissimo e cronico.

Quando lo spasmo sorprende la bocca, di maniera che venga stirata verso l'orecchio, questo male è conosciuto sotto nome di spasmo cinico.

Se il collo s'irrigidisce con spasmodica contrazione, e se i muscoli flessori ed estensori sono nel medesimo tempo contratti con forza eguale, dicesi tetanos.

Quando la testa, il collo, il torace, ed i lombi sono piegati in avanti dalla spasmodica affezione dei muscoli destinati a questo movimento, chiamasi embrothotonos; e quando queste medesime parti sono piegate indietro, ciò forma l'opisthotonos (b).

Nei tre ultimi casi, la faccia è molto rossa: i malati risentono gravi dolori: le mascelle sono immobili, gli occhi lagrimosi, e rovesciati. Nell'opisthotonos il malato getta delle grida speciali: egli parla sconsideratamente; nei suoi più forti dolori egli sbalza dal letto; perde la voce, e pare furioso.

Il granchio delle gambe (c), è qualche volta così violento, che si grida ad alta voce. Puossi abbreviare

(b) Il precitato CULLEN riguarda tutte queste distinzioni come improprie; ed ei crede, che tutti questi diversi termini indi hino solo varj gradi di un solo e medesimo male. *Il Tr.*

(c) Nomina il granchio anche una malattia puramente nervosa dello stomaco, la quale tante volte affale improvvisamente, e richiede i più pronti rimedj per essere una malattia pericolosissima; soggiacciono al granchio dello stomaco le persone gottose, le isteriche, le ipocondriache, ec.

Si cura questa malattia coi rimedj anti-spasmodici, colle fomentazioni alla regione dello stomaco ammollienti, con i clisteri anodini, qualora gli accessi siano assolutamente spasmodici: *Il Tr.*

viare questo insulto, comprimendo fortemente colla mano il mezzo della gamba affetta. Le persone soggette a questo male, porteranno sulla pelle, al di sopra della polpa della gamba, un cappio corfojo, di seta o di pelle, ed al momento che saranno sorpresi dal granchio, lo faranno scorrere sul luogo più rialzato di questa parte. Si praticherà lo stesso alle dita, ed ai pollici del piede con un anello, che si spingerà sul luogo, che ordinariamente si gonfia (d). Per liberarsi da questi granchj, prenderanno per una quindicina di giorni i bagni domestici tiepidi N.º 2., al sortire dei quali, si ugneranno le parti affette, coll'unguento anti-spasmodico N.º 132.

Il tetanos, l'embrothotonos e l'opisthotonos esigono di salassare incessantemente, e se abbisogna, a diverse riprese; dare in seguito ogni ora una tazza della misura anti-spasmodica N.º 120.; fregare le parti investite dallo spasmo, ogni quarto d'ora, dapprincipio a secco, ed in seguito coll'unguento d'altea unito ad un quarto d'olio di giosquiamo; e se l'insulto non diminuì in poco tempo, si pone il malato in un bagno di brodo di budella, od in sua vece nell'acqua di linseme, avvertendo poi alla cagione principale di questi mali, per potervi rimediare conseguentemente (e).

*Tom. I.*

C c

---

(d) Siccome il dolore vivissimo, che si sente nel granchio delle gambe, può dipendere da una contorsione o leggiero slogamento dei muscoli dei tendini, vi si rimedia tante volte col fare scorrere dolcemente la mano sopra il muscolo, o contraendo il suo antagonista. I legaccioli e le fasce strettissime prevengono questo incomodo: // Tr.

(e) Un rimedio specifico del tetanos egli è l'opio, dato a generosissima dose, il quale se arriva a promuovere il sudore, puossi sperare certa la guarigione: tale almeno è la mia pratica osservazione. Alcuni consigliano di applicare l'opio unitamente alla canfora sotto forma di cataplasma, alla pianta dei piedi. Lo stesso non puossi dire del mercurio da taluno riputato lo specifico di questa malattia, preso internamente ed esternamente, fino a promuovere molta salivazione.

Gli spasimi della lingua, degli occhi, delle mascelle, e delle altre parti muscolari della testa, sono spesso accompagnati da crudeli dolori. Si cureranno come il tetanos, ammeno che non si scuopra qualche cagione particolare di questi mali, tali che una malattia cutanea ripercossa, i germi gottosi, reumatici, ec. In questi casi si consulteranno, e si seguiranno i lumi dati a questo articolo.

Un largo vescicante applicato a questi muscoli affetti dallo spasimo, in molti casi abbrevia questi mali; e le più volte solleva il fomento N.º 82.; e dacche arriverassi ad aprire la bocca, si terranno le mascelle separate con un turacciolo di sughero.

### *Catalessia.*

La catalessia consiste nella contrazione permanente di tutti i muscoli, che sono in azione al momento dell' insulto; di modo che i catalettici rimangono ad un tratto immobili in quella medesima positura di corpo e delle membra, in cui si trovavano, quando ne furono sorpresi, perdendo il senso, la cognizione, e ciò senza considerevole alterazione nel respiro e nel polso (*f*).

Le conseguenze di questa malattia sono la disposizione alla recidiva; l' atrofia delle membra più

Un rimedio certo, qualora il tetanos sia periodico, è la chinachina. I vescicanti io li ho trovati sempre inefficaci, tante volte dannosi: le unzioni, raccomandate da molti autori non sembrano essere meglio giovevoli: il bagno caldo, ed i replicati salassi non guariscono mai di per se il tetanos: è pure suggerito per la cura del tetanos il bagno freddo, ma niente posso dire della sua efficacia, perchè nè da me, nè da veruno de' miei colleghi stato adoperato: *Il Tr.*

(*f*) L' estasi non differisce poi dalla catalessia, se non perchè i membri non restano nella situazione, in cui si pongono, e conservano quella, in cui si trovavano nel tempo dell' accesso; e sono affatto mancanti il senso ed il moto: *Il Tr.*



facilmente sorpresa da questo spasmo; le convulsioni; l'indebolimento delle facoltà dello spirito, l'epilessia.

Si cerca nel parossismo di richiamare il malato con un qualche spirito volatile, siccome quello del N.º 75., posto sotto il naso; colla scossa; colla fregagione sulla testa, dapprincipio secca, poi in seguito coll'acqua della regina d'Ungheria (g), della quale se si può, se ne fa trangugiare un cucchiajo da caffè pieno, con il doppio d'acqua. Se non rinvenisse in se coi suddetti mezzi, si applica il lavativo purgante N.º 111., o si salassa dal naso, irritando fortemente l'interno delle narici con una paglia lacerante; e se il malato fosse moroidario, si aprono le pustole moroidali, che si presentano.

Rispetto alla cura della catalessia, scuoprendosi la cagione principale, la si combatte coi rimedj convenienti; nel caso contrario, l'infermo stia al regolamento B.; cambiando aria, esercitandosi moderatamente, ed evitando i travagli dello spirito: conviene il salasso al piede in primavera ed in autunno, purgandosi un pajo di giorni dopo colla pozione lassativa N.º 166.; e fare in ciascuna settimana due volte i piediluvj tiepidi, con entro un cucchiajo di senape polverata. S'egli avesse il sangue acre, si apre un cauterio alla gamba, e per più elati di seguito, deve prendere primieramente una quindicina di bagni domestici tiepidi, ed in seguito le acque minerali acidette e ferrugigne N.º 3.

C c 2

---

(g) Quest'acqua non è altra cosa che lo spirito di rosmarino. Si pigliano i fiori, i calici, o le foglie verdi di rosmarino munde dai loro steli; vi si versa sopra dello spirito di vino in modo che soprannoti un buon dito trasverso. Si distilla in seguito per ritrarne tutto lo spirito di vino, che si è impiegato. Per rendere quest'acqua più aggradevole si distilla a bagno-maria, e se ne ritrae cinque selti:  
*Al Tr.*

Quando questa malattia accompagna l'ipocondria, l'isterismo (*b*), la melancolia, l'indebolimento per i travagli dello spirito, s'ella viene in seguito alla soppressione menstruale o moroidale, come ancora quando invade persone soggette ai vermi, si guarisce liberando il malato da codesti diverli mali.

I catalettici si ricordano poco o niente dei loro insulti: riprendono il filo del discorso come persone che non si siano accorte della interruzione. Io ho visto un ecclesiastico soggetto alla catalessia, riprendere dopo sei minuti circa, che aveva durato l'insulto, il filo del suo discorso, esattamente all'ultima parola pronunciata. La medesima cosa gli era successa più volte nelle sue declamazioni (*i*).

## DELLE AFFEZIONI SPASMODICHE, E CONVULSIVE INTERNE.

**Q**uantunque le affezioni spasmodiche e convulsive interne sieno frequentissime, la grande variazione dei sintomi che risultano dalle differenti funzioni e connessioni delle parti, che ne sono attaccate, ne rende ordinariamente difficile la cognizione.

Avvi luogo a crederne un ammalato affetto, allorchè essendo esente dai dolori del reumatismo e della gotta, e senz' avere sintomi d' infiammazione, nè di altra evidente malattia, si lamenta di una irritazione dolorosa, accompagnata da stiramento, o tensione più o meno permanenti, e più o meno in-

(*b*) Della catalessia isterica dottamente ne ha parlato la METTRIE: *Il Tr.*

(*i*) Rari esempj di catalessia si possono leggere presso FERNELIO, *univers. medic.* L. V. c. 2. De HAEN, *rat. med.* P. III. c. 5. §. 3. RONDELEZIO, *method. cur. morb.* cap. xx. *Il Tr.*

terrotte, da debolezze delle une e delle altre parti interne del corpo. Se ne accerta ulteriormente, se questi sintomi si comunicano alle parti vicine, ed a quelle ancora lontane, ed i di cui nervi corrispondono colla parte affetta; soprattutto ancora se il malato rende nel forte del male, orine chiare come l'acqua fontana, e che il suo polso sia piccolo, fredde le estremità, ed il ventre incomodato da flati; siccome ancora s'egli ha mali di testa rassomiglianti alla micrania, e palpitazioni di cuore. Questi sintomi uniti a quelli particolari dipendenti dalla situazione, corrispondenza, sensibilità e funzione della parte attaccata, decideranno fermamente dell'esistenza delle affezioni spasmodiche e convulsive interne, soprattutto se il malato è soggetto a sbadigliare, a distendersi, ed a rimettere dei flati per bocca, sul declinare degli accessi.

Se non si può scoprire alcuna cagione speciale di questi mali, avrassi tutto il luogo di credere, ch'elleno non sono che l'effetto dell'increspamento di alcuni filetti nervosi, distribuiti nei muscoli presi dallo spasmo, o nella irregolare distribuzione degli spiriti, che fanno giuocare i muscoli. Si solleverà il malato, nei due casi, coi medicamenti interni ed esterni, raccomandati per sedare le convulsioni. Ma prima d'intraprendere la guarigione, abbisogna nel primo caso ben conoscere il principio irritante. Nel secondo caso si cerca unicamente di fortificare il corpo con un regolamento ristorante, proporzionato alle forze dello stomaco, con esercizi graduati, coll'uso, nell'inverno, della chinachina infusa a freddo, in proporzione di due once sopra tre libbre d'acqua, ed in estate, prendendo le acque minerali acidette e ferrugine, e colle abluzioni della superficie del corpo, fatte a stomaco vuoto, e con acqua fredda; trattenere nel medesimo tempo lo spirito in



ciò che diverte e distrae; e condurre una vita esente da fastidj, e se trovasi in situazione di farlo, si fanno viaggi comodi fino a perfetta guarigione. Le persone di costituzione secca accelereranno la guarigione coll' uso di due bagni tiepidi per ciascuna settimana prima delle abluzioni coll' acqua fredda.

Per ciò che riguarda lo spasmo per incretamento, la causa irritante essendo per lo più nello stomaco o nelle prime vie, se vi sono indicj di questa cagione, si consultino gli articoli delle favore, rimediandovi assiduamente; ed arrivati ad estirpare i vizj del tubo cibario, la chinacchina, e le acque suddette consolideranno la guarigione.

Se la causa irritante non fosse nelle prime vie, questa sarà nella massa dei fluidi; allora si consulti ciò che è stato detto delle acrimonie in generale ed in particolare; e l' acrimonia esistente essendo distrutta, si avrà fatto tre quarti dell' opera. Un derivatorio promosso colla scorza di mezereon, o d' un cauterio, la dieta lattea della lettera G.; le frizioni generali fatte mattina e sera, per animare la traspirazione, come pure i moderati esercizi, ma replicati, faranno il resto, avendo prima rimediato alla plethora con piccole cacciate di sangue di cinque o sei once solamente.

La polvere anti-convulsiva citata al fine dell' articolo delle convulsioni ha spesso prodotti felici effetti in questi casi (a).

---

(a) Il Sig. de la ROCHE, in una sua diff. inserita nel *Giorn. di Medic. di Francia* 1779.; sopra l' uso interno de' fiori di zinco, asserisce che non avvi di questi più valido anti-spasmodico, i di cui effetti sono più costanti, i suoi usi applicabili ad un maggior numero di casi, e dai quali vi sia meno a temerne un sinistro evento: La dose per gli adulti è di due o tre grani di tre in tre ore, che si accresce sino ai sei, e più, se la malattia non obbedisce, ed il rimedio non porti mali di cuore: per i fanciulli si principia da un

## DELLE AFFEZIONI SOPOROSE ED APOPLETICHE.

**L**A terza classe di malattie che affettano particolarmente i nervi ed i muscoli, comprende le affezioni paraltiche, alle quali conviene far precedere le affezioni soporose, conosciute sotto il nome di catafora o coma, di letargo che partecipa dell'apoplessia sierosa, e del caro, che s'avvicina all'apoplessia sanguigna. Ciò fatto, si parlerà delle diverse specie d'apoplessia, di cui le affezioni paraltiche ne sono ordinariamente la conseguenza.

### *Catafora (a).*

Oltre le affezioni soporose che sono assolutamente sintomatiche, ed esposte all'articolo dei sintomi febbrili in generale, si vede cadere gli ammalati senza cagione manifesta, cogli occhi chiusi, in un lungo sopore, rassomiglievole qualche volta ad un sonno profondo e tranquillo: si chiama questo stato sonno comatoso. Altre volte l'ammalato oppresso dal sonno non è che assopito: egli è agitato, e porta spesso la mano alla testa. Questa specie di sopore prende il nome di veglia comatosa, ed è accompagnata da un po' di febbre. Nelle due specie di catafora, avvi della pena ad eccitare gli amma-

Cc 4

---

terzo ad un quarto di grano, da aumentarsi secondo il bisogno.

Il Sig. ODIER della facoltà di Ginevra propone il magistero di bismuto, come un nuovo rimedio contro i mali di nervi: egli prescrive la dose di due o tre grani, accrescendola fino a dodici grani quattro volte al giorno, dato in polvere, ed allungate in un po' di sciloppo di capelvenere, ed acqua: *Il Tr.*

(a) O coma sonnelento: *Il Tr.*

lati per far loro prendere qualche cosa: rispondono male, o non rispondono alle domande, che loro si fanno per essere illuminati sul loro stato; ed infligati dai bisogni della natura, dimandano di soddisfarli, o dimenticano ciò ch'essi avevano ricercato, e ricadono sul momento nel sopore.

Il salasso abbondante dal naso e la diarrea hanno qualche volta terminato questi sopori; e siccome la sezione dei cadaveri ha assicurato più d'una volta, che nel sonno comatoso, avvi un piccolo spandimento di sierosità nel cervello, il quale nella veglia comatosa è accompagnato da flogosi; quest'ultimo caso avendo relazione col caro, ed il precedente col letargo, si consulerà ciò che sarà detto sopra queste due malattie, come pure del sopore e della veglia febbrile nell'articolo dei sintomi febbrili in generale, affine di usare prudentemente, ciò che potrà convenir meglio.

Si è visto succedere queste affezioni comatose alle cadute e ad altre forti commozioni della testa. In questo caso il balsamo N.º 4., ha più di una volta fatto rendere del sangue intriso di materie dalle narici, e dalla bocca, ciò che ha dato termine alla catafora: si adoprano gli antelmintici, quando questa malattia attacca persone, che hanno dei vermi.

#### *Letargo.*

Si è fatto parola del letargo sintomatico nella cura dei sintomi febbrili in generale.

Il letargo propriamente detto, e non accidentale, consiste, rispetto alla cagione, in un imbarazzo pituitoso o sieroso al cervello. Le funzioni dei nervi che derivano dalla parte, la quale è ingorgata, o compressa, sono comunemente sospese: tante volte questa malattia è preceduta da una grande pi-



grizia, da annichilamento delle forze, da vertigini, da debolezza dei sensi, da tintinnio delle due orecchie, da peso di testa, e da un invincibile trasporto al sopore. Ella si manifesta in seguito da un insupidimento così profondo, che gli ammalati trascurano tutto, fino ancora a chiudere la bocca, dopo avere sbadigliato: dimandano nel medesimo momento di certe cose, e si dimenticano di ciò che hanno richiesto; si stenta molto a svegliarli, e quando vi si riesce, rispondono alle domande come persone stordite dal sonno. Dapprincipio il loro respiro è più eguale e poco frequente; il calore ed il colore della faccia sono assai naturali; le orine per lo più bianche o torbide, ed i malati in appresso hanno poca febbre con respiro profondo, o con qualche difficoltà a respirare (b).

Si porge al più presto possibile la pozione emetica e lassativa N.° 165.; si rade la testa, e dopo averla ben fregata, cuopresi in guisa di berrettino coll' impiaastro di bacche d'alloro, cercando di eccitare l'ammalato, scuotendolo, ed apponendo spesso sotto il naso lo spirito volatile N.° 75., l'acqua di luce (c), o lo spirito di sale ammoniac fatto

(b) *Intra septimum diem moriuntur lethargici, nisi febris supergeneris, aut pus ex functibus, naribus, vel auribus succedat; vel stertutatio frequens cum narium, vel oculorum stillicidiis eveniat; aut abscessus post aures fiant. Solvitur quoque aliquando pedum tumore, furunculis, abscessibus, erysipelate; vel junctim, vel scorjim incidentibus.* WEBER: *Il Tr.*

(c) L'acqua di luce, chiamata ancora spirito volatile succinato, si fa con quattro once di spirito di vino rettificato, in cui vi si fa sciogliere a freddo dieci grani di sapone bianco; si feltra, e se si fa disciogliere in questo spirito di vino saponaceo due dramme d'olio di succino rettificato, si avrà lo spirito di vino succinato. Unendo poi cinque once d'alcali volatile fluido con un'oncia di spirito di vino succinato, si avrà l'acqua di luce.

L'acqua di luce si prende anche internamente dai quattro grani fino a mezza dramma unita al zucchero, od a qualche oncia di veicolo acquoso: diseca lo specifico del veleno della vipera e della rabbia: *Il Tr.*

colla calce viva, e coricarlo colla testa molto alta, ed applicare alla pianta dei piedi il cataplasma N.º 16.

Se con questi rimedj, e dopo l'operazione della bevanda emetico-purgativa, l'ammalato non è riavuto dal sopore, si applicano i vescicanti alle gambe ed alla nuca; mattina e sera, il lavativo purgante animato N.º 114.; e per rimedj interni, si dà ogni due ore un cucchiajo della mestura cefalica N.º 123., e per bevanda ordinaria l'infusione cefalica N.º 102.: si nutrice negl' intervalli, con buoni brodi, e si continua il tutto fino al declive della malattia; epoca alla quale si purga colle pillole cefaliche N.º 151., da replicarsi ogni tre giorni, e nella convalescenza una volta al mese in tre volte, osservando per alcuni mesi il regolamento della lettera B., oltre il molto esercizio e la fregagione mattina e sera per tutto il corpo colla spazzola inglese. Per prevenire la recidiva, si prenda a digiuno, per i primi quindici giorni di convalescenza, un cucchiajo della misura nominata, soprabbevendovi due tazze della suddetta infusione.

Il letargo essendo, a vero dire, un leggiero insulto dell' apoplessia sierosa, si preverrà tante volte questa specie di apoplessia, usando secondo il bisogno ciò che è stato superiormente raccomandato, dacche si conosceranno i forieri dell' apoplessia sierosa.

Il letargo dei vecchi, come pure quello accompagnato da tremore o sudore freddo, sono i più pericolosi.

*Apoplessia sierosa (d).*

L'apoplessia sierosa di rado è fulminante. Se avvi della disposizione a questo male, sopraggiunge spesso dopo i pasti, nei quali siasi sopraccaricato lo stomaco, o mangiato alimenti indigesti o bevuto eccessivamente bevande spiritose, e che fermentano nello stomaco. L'apoplessia sierosa è prodotta immediatamente da un imbarazzo al cervello, così grande, che le funzioni nervose, le quali partono dalla parte del cervello, che ne è ingorgato, o compresso dallo spandimento di umori sierosi o pituitosi, sono affatto sospese.

Questa malattia si distingue dall'apoplessia sanguigna, da ciò che attacca particolarmente i vecchi catarrosi, ed i flemmatici o pituitosi. L'apoplessia sierosa è per lo più annunciata dai sintomi che pre-

(d) Molte sono le specie di apoplessia: il caro, e la catafora si possono ridurre alle specie apopletiche. Oltre la decisione degli autori dell'apoplessia sierosa, e sanguigna, vi è 1. l'apoplessia idrocefalica, propria dei bambini, e delle persone non ancora arrivate alla pubertà: questa si conosce dalla debolezza generale, dalla febbre, dal dolore di testa, dal polso lento, dalla dilatazione della pupilla, e dalla sonnolenza: 2. l'apoplessia biliosa, prodotta da soverchio esaltamento della bile, di cui un particolare esempio si legge presso BUCHAN, *medicina domestica*: 3. l'apoplessia mentale, nata da vive affezioni dell'anima, siccome dall'eccessiva gioja, o da forte improvviso spavento, o dall'amore: 4. l'apoplessia soffocante, siccome quella degli appiccicati, o degli annegati, ec.: 5. l'apoplessia velenosa, consecutiva cioè all'ubriacchezza, all'opio, allo stramonio, al giosquiamo, ai vapori di carboni, ai funghi, come ne riferisce LUPIN (*histor. morb. difficil.* Ratish. 1768.) guarita coll'emetico, ec. 6. l'apoplessia per inanizione, di cui ne abbiamo una bellissima dissertaz. di PEZOLD, *de apoplexia ex inanitione vasorum cerebri*. Gott. 1783.: 7. l'apoplessia nervosa, che trae origine soltanto da vizio dei nervi: 8. l'apoplessia precordiale, come ci descrisse SCHROEDER nella sua erudita dissertaz. *de apoplexia e præcordiorum vitis origine*. Goett. 1767. Finalmente vi sono le apoplessie sintomatiche, prodotte cioè o da vermi, o da gotta risantiz, o da terzane maligne, ec.: *li Tr.*



cedono il letargo. Innanzi l' insulto, i malati sentonsi già un po' stupidi, e parlano più lentamente dell' ordinario: i loro occhi sono gonfi, e la vista fosca; hanno la testa sfordita e pesante, ed il menomo movimento li mette in affanno. Al momento dell' insulto sono sorpresi da un tremore al labbro inferiore, ed egli è dopo questi preliminari, o dalla subitanea abolizione dell' uso di tutt' i sensi tanto interni che esterni, e dalla sospensione dei movimenti volontarj, che l' apoplessia sierosa si manifesta; il polso è in allora assai forte, e profondo il respiro: il malato russa, e sembra sepolto in un sonno profondissimo cogli occhi socchiusi, e la pupilla molto dilatata.

Le conseguenze di questo male sono la disposizione alla recidiva; diversi gradi di paresi e di paralisi; l' indebolimento delle facoltà dello spirito, ec.

L' apoplessia sierosa o pituitosa si cura coi rimedj tanto interni che esterni raccomandati per il letargo, amministrati senz' alcuna riserva nel medesimo ordine, a riserva della pozione emetico-lassativa, che si prenderà due giorni di seguito, a meno che l' ammalato non sia fortemente già scosso e purgato, per replicarlo. Siccome in questa malattia si è meno sensibile all' imprèssione dei rimedj, se al termine delle due ore la dose prescritta non avesse prodotto molto vomito, si daranno da un' ora all' altra due grani di tartaro emetico in un cucchiajo d' acqua di cannella orzata (e) fino a sufficiente vomizione; e replicando più spesso i lavativi purganti. Non si desista da questo metodo, se non se prima il malato sia perfettamente rinvenuto in se me-

---

(e) L' acqua di cannella orzata si compone col doppio d' erp e cannella: *Il Tr.*

desimo, e fatto padrone di tutti i suoi movimenti. Ottenuto un costante miglioramento, per assicurare la guarigione e prevenire la recidiva, non solo si eseguisca il prescritto per ovviare la recidiva del letargo, ma prendansi nella prossima buona stagione i bagni delle acque termali ferrugine del N.º 3., e frattanto i bagni N.º 1. (f).

*Caro.*

Il caro è rispetto all'apoplessia sanguigna ciò che è il letargo all'apoplessia sierosa. Ma in questo caso l'imbarazzo al cervello e l'instupidimento dei nervi sono prodotti dall'ingorgamento dei vasi sanguigni delle meningi. Questo male è per lo più annunciato da mali di testa ottusi, permanenti e profondi, accompagnati da pulsazione nella testa e delle arterie del collo, non che ancora dalla palpitazione del cuore. I malati hanno la faccia più rossa dell'ordinario, abbagliamenti, tintinnio d'orecchie e vertigini. A questi sintomi succede una specie d'insulto apopletico con perdita quasi assoluta dei sensi interni ed esterni, come pure dei movimenti volontarj; di modo che ciò che loro rimane di cognizione e di sentimento nel forte insulto, è po-

---

(f) L'autore quì prefcinde dall'uso del salasso; ed in vero il più delle volte egli è nocivo, ma non lascia però di essere in alcuni casi indicato: resta escluso affatto, se il polso è troppo debole, se gli occhi sono rientrati, se la faccia annuncia estremo sfinimento di forze; ma fuori da queste circostanze conviene salassare anche nell'apoplessia sierosa. MORGAGNI riferisce molti esempj dell'efficacia del salasso in casi simili, ed egli è facile di renderne la ragione in seguito alla teoria di CULLEN, che prova, consistere la causa prossima dell'apoplessia sierosa nello stato di pletora dei vasi del cervello: si proscrive soltanto il salasso nelle apoplessie prodotte da idrope già formata, e da una ritenzione d'urina incurabile. BOSQUILLON: II Tr.

chissimo e momentaneo; ond'è perciò che si distingue il caro dall'apoplessia, come anche perchè nel caro il polso è più o meno febricoloso, ed il respiro meno eguale, e meno profondo che nell'apoplessia.

Si salassa subito generosamente dal piede, s'egli è possibile, o altrimenti dal braccio (g); si eccita

(g) Il salasso dalla giugulare sembra in questo caso, come pure nell'apoplessia sanguigna, assai preferibile: quello dalla temporale si può anche omettere. perchè la esecuzione è incerta, come dice CULLEN, e può produrre degl'inconvenienti; ed in vero, (avverte benissimo il più volte citato BOSQUILLON) l'arteria temporale non è che un ramo superficiale della carotide esterna; ella non porta il sangue nell'interno del cranio, che per mezzo d'alcuni rami-celli, che con essa si anastomizzano, il resto si distribuisce alle parti che servono d'invoglio alla testa; quindi anche nel caso che si riesca ad aprire quest'arteria, non si potrebbe diminuire di molto la quantità, o l'impeto del sangue, che si porta al cervello: altronde questo vaso s'incava profondamente sotto i tegumenti; se lo si divide interamente, le sue due estremità si separano l'una dall'altra, in ragione della elasticità della loro tonaca muscolare; le aperture si chiudono, ed il sangue dopo aver colato assai vivamente, si ferma: se si punta soltanto il vaso, non si può chiuderne l'apertura, che con una compressione considerevole, e senza una stretta legatura, che si deve evitare, almeno più ch'è possibile, perchè trattiene la circolazione in tutt' i vasi, che si diramano sulla parte esterna della testa.

Un rimedio più decisamente benefico sono le ventose scarificate sulle tempie, e sull'occipite; ed in seguito i larghi vescicanti sulla testa medesima, o sue vicinanze; il canterio attuale alla nuca, od alla pianta de' piedi. La trapanazione non farebb'ella significante nelle apoplessie prodotte da qualche caduta, e che sono accompagnate da un vivo e permanente dolore della testa? Un'altro spediente, non certamente disapprovabile è quello della forte legatura alle coscie, affine di ritardare il ritorno del sangue dall'estremità inferiori verso le superiori.

In generale però conviene avvertire al carattere dell'apoplessia, per adattare giustamente i convenienti presidj. Il credere sempre in ogni apoplessia essere causa la soverchia quantità di sangue, e conseguentemente cavare, e ricavare sangue, è pur troppo cagione di molte morti. Chi crederebbe, che una generosa dose d'opio potesse convenire in un'apoplessia? eppure l'HOFFMANN diede con profitto ottanta gocce di laudano liquido in una sol volta in una apoplessia accompagnata da febbre periodica. Vedi SCHOMBURG, *diff. de venæ section. in apopl.* Goett. 1783. e KORTUM, *de apoplexia nervosa.* Goett. 1785. come anche BALDINGER, *de venæ section. abusive*



l' ammalato, lavando le tempia coll' aceto dei quattro ladri, od aromatico (b), o con quello di ruta di cui pure se ne appone sotto il naso (i).

Si scuota per lo stesso effetto, ma con molta moderazione: sia coricato a letto con origliere molto alto, ed in una stanza temperata, tenendo spesso e più che sarà possibile le gambe fino al ginocchio nell' acqua crusca tiepida colla giunta di qualche tazza d' aceto. Essendo a letto gli si fomenteranno le gambe col fomento rinfrescativo N.º 81., ed alla pianta dei piedi si applicherà il cataplasma N.º 16.;

*in variis morbis.* Goett. 1778. Disse pur bene CORNELIO CELSO sul proposito del salasso nelle apoplezie: *Si omnia membra vehementer resoluta sunt, sanguinis detractio vel occidit, vel liberat. Aliud curationis genus vix unquam sanitatem restituit; saepe mortem tantum differt; vitam interim infestat. Post sanguinis missionem, si non redit & motus & mens, nihil spes superest: si redit, sanitas quoque prospicitur* ( de medicina lib. III. cap. xxvii. edit. Krausii Lipsi. 1760. p. 128. ); e su questo aureo precetto benissimo dissertò poi VAN-SWIETEN ( *commentar.* §. 1029 ): *Il Tr.*

(b) L' aceto dei quattro ladri si fa colle cime d' assenzio maggiore e minore, rosmarino, salvia, menta, ruta, un' oncia e mezzo per sorte; fiori di lavanda once due; calamo aromatico, cannella, garofani, noci moscate, spicchi d' aglio, due once per sorte; mezz' oncia di canfora, ed otto libbre di aceto rosso. Tutti questi ingredienti secchi si pestano grossamente; i spicchi freschi d' aglio si tagliano in fette; tutto si pone in un matraccio, versandovi sopra l' aceto; si fa digerire il mescolaglio al sole od a leggier calore in fornello di sabbia per tre settimane od un mese; allora si cola con espressione; si feltra il liquore per carta bigia, e si aggiunge la canfora disciolta in un poco di spirito di vino. Si conserva il liquore in vaso di vetro esattamente chiuso.

L' aceto aromatico è una preparazione assai dispendiosa, composta con mezz' oncia di radici di galanga e zedoaria, erbe di ramerino, ruta, e maro vero, e fiori di lavanda, due dramme per sorte; scorza di cedro fresca, cariosili aromatici, cubebbe, cardamomo minore, mezz' oncia per sorte; tagliuzzate li mescolano e s' infondono in quarant' once di ottimo aceto con due once per sorte di giglio convoglio, e gherofano. Si conservano in vase perfettamente chiuso: *Il Tr.*

(i) Non convengono i liquori spiritosi, e le acque odorifere in simili malattie: Nel primo insulto dell' apoplezia però, massime prodotta dai vapori del carbone, si può coraggiosamente prescrivere l' alcali volatile fluore, il quale se non corrisponde subito all' effetto desiderato, se ne deve sospendere l' uso, e ricorrere ai metodi ordinarij: *Il Tr.*

416 *Delle affezioni soporose ed apopletiche:*

si scioglierà il ventre con lavativo d'acqua crusca e mezz' oncia di nitro, replicando il salasso dal piede dopo rimesso il clistere, e prendendo in seguito la tisana di cremore di tartaro N.° 211. con entro disciolti due grani della polvere N.° 178., da prenderne alla mattina una sufficiente quantità per iscacciare cinque o sei volte in ventiquattr' ore: dopo il pranzo berà molta limonea tiepida e leggiere. Tutte le sere rinoverassi il lavativo suddetto; in ventiquattr' ore prenderà tre o quattro brodi di coscia di vitello alterati con un manipolo di cerfoglio e borragine, non delistendo dai rimedj annunciati, nè interrotti da altri medicamenti. Se non per tanto, ventiquattr' ore dopo il primo salasso, non fosse bene rinvenuto l' infermo dal suo sopore, si salasserà dalla giugulare; se sei ore dopo questo salasso il cervello fosse ancora imbarazzato, si ventoserà alla nuca ed alle spalle colla macchinetta inglese, od in sua mancanza colle ventose ordinarie. S'egli avesse della disposizione all' emorragia nasale, s' inviterà con una p<sup>z</sup>lia ben affilata.

Il letargo ed il caro sono qualche volta accompagnati e seguiti se non da una paralisi perfetta, almeno da piccoli accidenti paralitici, e sono quelle paralitiche affezioni che prontissimamente si dissipano; mentre che la vera apoplessia tanto sanguigna che sierosa, si distingue principalmente dal caro e dal letargo, a motivo delle paralitiche affezioni, che accompagnano l' apoplessia, e che sono di più o meno durata dopo gl' insulti.

Il convalescente del caro vivrà sobriamente, e si farà salassare verso gli equinozj, ed avendo disposizioni alle moroidi, dopo il salasso si farà applicare le sanguisughe all' ano.

*Apoplessia sanguigna (k).*

Quest' apoplessia è fulminante, quando colla rottura di un vaso si fa una effusione di sangue nel cervello, che comprime l'origine dei nervi a segno di annichilare interamente le loro funzioni e quelle di questa parte.

L' apoplessia sanguigna, che si guarisce qualche volta, differisce dalla sierosa, perchè l'imbarazzo e la compressione al cervello sono prodotti dall' ingorgamento dei vasi sanguigni.

Questa malattia invade più particolarmente le persone di testa grossa, di collo corto, di corpo solido, pingue, e di temperamento sanguigno o bilioso; soprattutto quand' elleno si abbandonano ai soverchj piaceri della tavola, e dell' amore. L' apoplessia sanguigna attacca ancora le persone delicate d'ambo i sessi, che conducono una vita sedentaria, accompagnata da inquietudini, e che s' indeboliscono a motivo dei travagli dello spirito. Ella è qualche volta annunciata dai sintomi, che precedono il caro, da veglie, o da sonno profondissimo, da frequente intirizzimento delle membra, tumidezza dei vasi della testa, aspetto triste e feroce, rossezza del vol-

Tom. I.

D d

(k) Volgarmente l' apoplessia si chiama, colpo apopletico, accidente, morte improvvisa. Il volgo crede, e ce lo disse ancora MOLANO nel suo trattato delle immagini, che S. CRISTOFORO rappresentavasi d' una sì prodigiosa grandezza, perchè quando avevasi potuto vedere l' immagine di questo Santo, si fosse sicuro di non morire d' accidente in quel giorno.

*Cristophori sancti speciem quicumque tuetur*

*Illa nempe die non morte mala morietur*

il che è stato detto da altri in meno parole

*Cristophorum videas, postea tutus eas.*

Il Tr.



to, tremore delle labbra e della voce, e fridore dei denti durante il sonno. Ma il più spesso i malati sono assaliti improvvisamente da intera abolizione dei sensi tanto interni che esterni, e di tutt' i movimenti volontarj, di modo che le braccia e le gambe, quando gli si alzano, ricadono come un piombo, abbandonate a se medesime. Le premure che si danno per eccitarli, riescono infruttuose; sembrano sepolti in un profondo sonno; la bocca è torta, ed inabilitati sono nell'uso degli occhi e delle orecchie. Il polso è forte e pieno; la faccia molto colorita; il respiro raro, profondo, ruffante, e tante volte con perdita di sangue dal naso o dalla bocca.

Le conseguenze che ne risultano, sono le medesime, che le riferite per l'apoplessia sierosa.

Questa malattia si cura interamente come il caro, e si guarisce, se n'è suscettibile, coi medesimi rimedj. Ma siccome dessa è acutissima, si avvicineranno i salassi, quanto lo esige la violenza dell'insulto, da replicarsi ogni quattr'ore, se l'attacco è forte e vivo, e l'infermo sia di sufficiente età, senza sospendere mai però i lassativi e gli altri rimedj (1).

Il caro è frequentemente giudicato un'apoplessia sanguigna, ed il letargo un'apoplessia sierosa; ed egli avviene tante volte, che gli ammalati si rimettono perfettamente, quando si prende questo sbaglio; invece che nelle vere apoplessie, s'essi si rianno, sentono l'una o l'altra delle conseguenze riferite all'articolo dell'apoplessia sierosa.

Gli apopletici improvvisamente assaliti con intera abolizione dei sensi e del moto, con profondo stertore, con getto di molta schiuma vischiosa, con

---

(1) TULPIO faceva trar sangue da tutte due le braccia in un tempo solo per soccorrere più prontamente l'ammalato (*observ. l. 1. c. 7.*); *Il Tr.*

freddo sudore, non si recuperano guari, specialmente allora quando questo male è stato preceduto da mali di testa lunghi, da epilepsia, o da altre affezioni convulsive o paralitiche; come anche quando la vera apoplessia è una recidiva od ereditaria.

I sudori copiosi e caldi su tutto il corpo; il flusso d'orine consistenti; quello delle moroidi o de' menstrui, come anche l'emorragia nasale o la diarrea, tutte queste evacuazioni, quand' elleno sono state copiose, hanno sovente salvati gli apopletici; ond' è, che si ajuteranno giusta i precetti dati per la cura dei sintomi febbrili in generale; e se i malati diverranno febbricitanti, si avrà luogo di sperarne la guarigione, a misura ch' ella si raddoppierà.

Si previene il caro, non che l'apoplessia sanguigna, usando, dacchè si provano i sintomi indicanti queste malattie, il salasso dal braccio, da replicarsi all'indomane dal piede, o colle sanguisughe negli emoroidarj; e nel medesimo tempo i lassativi indicati per il caro, da prendersi frai salassi, e per più giorni ancora dopo l'ultima cacciata di sangue.

Le persone disposte alle affezioni apopletiche, perchè il sangue si porta impetuosamente alla testa, a cagione della debiltà dei vasi, potranno prevenire l'apoplessia, prendendo un pajo di volte per settimana i semicupj tiepidi, e nel medesimo tempo per un pajo di minuti la docciatura fredda sul cranio.

Il sangue degli apopletici sanguigni essendo ordinariamente spesso ed acceso, la bevanda abbondante di un' acqua di sorgente leggiera acidulata aggravidolmente collo spirito di zolfo o di vitriuolo, lo renderà diluto e temperato; per cibo preferendo i frutti e gli erbaggi, e cenando sobriamente, questo metodo diminuirà la disposizione a quest' apoplessia. In tutti gl' insulti apopletici, sopravvenienti a stomaco pieno, conviene sbarazzarlo dagli alimenti

indigesti prima ed immediatamente dopo il primo salasso, ed in aspettazione dell'emetico, l'ammalato trangugierà un pajo di cucchiaj da caffè di acqua carmelitana nel doppio d'acqua tiepida, soprabbevandone molte tazze (m).

## DELLE AFFEZIONI PARALITICHE.

**L**E affezioni paralitiche sono l'effetto di un imbarazzo nel cervello, o nello spinale midollo, o in un ramo nervoso, o soltanto in uno dei suoi rami, che vivificano qualche muscolo del corpo. La tolta azione di uno o più muscoli, e conseguentemente dei movimenti risultanti dal suo ufficio, annunciano questo stato, ed il luogo ove risiede la causa. Altronde la privazione del movimento avviene senza o con perdita del senso.

Nello stesso modo che l'apoplessia ha qualche volta per foriere la paralisi delle palpebre, ed altre piccole affezioni paralitiche; la paralisi è facilmente la conseguenza dell'apoplessia; e quand'essa non succede a questo male, è ordinariamente annunciata dallo stupore, dall'affidazione, pallore, debolezza, freddo, flacidezza od atrofia delle parti che ne sono prossimamente minacciate. Ella si manifesta ancora dalla perdita intera del movimento volontario dei muscoli paralitici, che sono nel medesimo tempo, più o meno senza senso.

---

(m) L'acqua carmelitana, ossia di melissa composta e corretta del LEMERY, si fa con dodici once di cime fresche di melissa, due once di spichi di cedro fresco, un'oncia di noci maseate, quattro once di semi di coriandolo, un'oncia per sorte di carosilo aromatico e di cinamomo, mezz'oncia di radice d'angelica, e sessantaquattr'once di spirito di vino rettificato. Tagliuzzate e contuse tutte queste specie si tengono in infusione per alcuni giorni, poi si distillano a bagno maria ad un dolce calore a riduzione di quarantott'once. La sua dose qualora si prescrive come corroborante, non oltrepassa un piccolo cucchiajo; serve pure ad uso esterno come disenziente, corroborante ed eccitante: *Il Tr.*



*Emiplegia (a) .*

Quando la paralisi invade tutta la metà del corpo dall'alto al basso, chiamasi emiplegia. Il lato non paralitico è soggetto a movimenti convulsivi; la bocca è un po' torta, i malati pronunciano male, restano quasi inmemorati, e privi delle facoltà intellettuali (b).

Rispetto alle paralisi locali, quantunque tutte le parti muscolari ne siano suscettibili, la palpebra superiore, l'occhio, la lingua, i muscoli che servono alla deglutizione, lo sfintere dell'ano e della vescica, e le estremità superiori, ed inferiori sono pertanto le parti, che ne sono più facilmente invase. Queste paralisi si manifestano per difetto delle funzioni muscolari loro proprie; per esempio la palpebra superiore ricade sull'occhio, senza tumore nè dolore, e l'ammalato non può alzarla.

Nella paralisi dell'occhio che si chiama gotta serena, l'ammalato non vede dall'occhio infermo,

Dd 3

(a) Si dividono comunemente le paralisi in universali, ed in particolari. La prima è quando tutto il corpo è affetto, e si chiama paralisi apopletica, o apoplezia: la seconda, se è lesa una grande, o piccola parte di esso, e si dice paralisi, la quale si divide poi in paraplegia, se tutto il corpo dal di sotto del capo fino ai piedi; ed in emiplegia, se un lato solamente del corpo destro o sinistro, e qualche volta la parte corrispondente della faccia: la paralisi delle palpebre chiamasi blefaroplegia: quella della retina, amaurosi: del naso, anosmia: della lingua, glossoptegia: del pene, cauloplegia. Se poi le facoltà motrici e sensitive non sono affatto distrutte, ma soltanto alterate, nominasi paresi. Alle paralisi sineomatiche poi si riferiscono 1. la paralisi renuntica: la paralisi intermittente: l'emiplegia esantematica, ec: *Il Tr.*

(b) *Ebriosi in paralyfim labentes omnem simul memoriam. & ingenium perdunt. WEBER* e poco dopo: *Paralytici memoria sunt debiles, obliuiofi, ac tandem quasi pueriles. maxime linguæ paralyfi correpfi; hi quidem, si juniores, superstites diu esse possunt; si annosiores, facile recursus paralyticam, fatalem, sustinent; Il Tr.*

quantunque il globo appaja sano, la pupilla essendo solamente molto dilatata ed immobile

La lingua paralitica s'ingrossa; ella è più o meno immobile, ed incapace di fare i movimenti necessarij per articolare e mangiare. Le orine e le fecce sfuggono involontariamente nella paralisi degli sfinteri della vescica e dell'ano, ed il malato non può sbarazzarsene senza gli ajuti dell'arte.

Nella paralisi dell'estremità i malati sono tante volte interamente impotenti dell'una o delle due estremità inferiori, o dell'uno o dell'altro braccio, o non rimane loro che la facoltà di strascinare queste membra come masse inanimate.

La paralisi del braccio che succede ai forti accessi di colica, è conosciuta sotto nome di paresi; e quando questa malattia attacca gli scorbutici, acquista il nome di paralisi scorbutica.

Per curare con successo le affezioni paralitiche, si esaminerà immediatamente, se elleno sono la conseguenza dell'apoplessia o nò; e si distingueranno le recenti dalle inveterate. Quando la paralisi è consecutiva all'apoplessia sanguigna, ed è recente, l'ammalato si nutrirà cogli alimenti i più leggieri dei regolamenti B. ed H. Berà molto fiero di latte, o tisana comune N.º 210. ; mattina e sera si freggeranno le parti affette, e sempre la nuca e spina del dorso, dapprincipio a secco colle flanelle calde, ed in seguito coll'unguento anti-spasmodico N.º 132., unito a parte eguale d'unguento d'altea canforato. Si applicheranno tutt' i giorni le ventose secche sulle parti paralitiche, ed ogni quattro giorni scarificate. Negl' intervalli, il malato userà la tisana purgativa N.º 215., continuando su questo andare fino a perfetta guarigione.

Se non arrivasse a guarire, prenderà al più presto possibile i bagni delle acque termali saponacee

riferite sotto il N.º 3. Allorchè la paralisi sarà recente, ed una conseguenza dell'apoplessia sierosa, l'ammalato offerverà il regolamento sotto la lettera B., da alternarsi cogli alimenti più facili a smaltirsi del regolamento sotto la lettera I. Berà secondo l'ordinario e molto della tisana di pareirabrava N.º 214., da rinforzarsi con mezz'oncia di radice di valeriana silvestre, ed altrettanto di vincetossico, replicando un pajo di volte, nello spazio di cinque giorni, la pozione emetico-lassativa N.º 165., e fra questi due rimedj, la mestura e l'infusione cefalica N.º 123. e N.º 262. raccomandati per il letargo, oltre le fregagioni sulle parti paralitiche, mattina e sera, dapprincipio con flanelle calde; poi coll'unguento antispasmodico N.º 132. Se al fine dei dieci giorni, non si ottenesse considerevole miglioramento, converranno per quindici giorni i bagni aromatici N.º 2.; e sortendo dal bagno, la fregagione collo spirito risolvente N.º 74.; e se la paralisi attaccasse solamente una piccola parte, il vescicante N.º 63., continuando, a riserva della pozione emetico-lassativa, tutt' i rimedj suddetti fino a perfetto risanamento, il quale mancando, si daranno al più presto possibile i bagni d'acque termali, più sulfuginose e ferrugine possibili (c).

Dd 4

---

(c) Sono utilissimi nella paralisi l'olio di cajeput, quello animale del DIPPELIO, la infusione d'arnica, la tiatura di cantarelle, la colochintide, i mercuriali nel lentore degli umori, nella verminazione, e nella discriasia venerea, che accompagnano o cagionano la paralisi; i decotti dei legni sudoriferi, i diversi aromi; siccome ancora è predicatissimo nella paralisi l'alcali volatile fluore. Esternamente poi conviene, ciò che ha raccomandato TRONCHIN di mettere le parti paralitiche in un animale appena scannato, come pure utili sono i bagni freddi, la elettricità, i fanticoli, le spiritose, od altre fregagioni, la flagellazione, la musica, l'orticazione, la insolazione, il vapore della fiamma dello spirito di vino, il fuoco:



Rispetto alle affezioni paralitiche recenti non consecutive dell'apoplessia, in un soggetto sanguigno, pletorico, o con soppressione di qualche accumulata perdita sanguigna, senz'alcun'altra evidente cagione, si salassa immediatamente, usando in appresso il regolamento e rimedj tanto interni che esterni indicati per la paralisi succedanea all'apoplessia sanguigna. Se vi fosse soppressione di moroidi, di menSTRUZIONI, ec., si ristabiliranno queste evacuazioni abituali, coi consigli dati a questo effetto, parlando dei menstrui e delle moroidi.

Se al contrario questo caso succedesse in persona pituitosa e flemmatica; s'impiegheranno successivamente tutt'i rimedj tanto interni che esterni indicati per la paralisi succedanea all'apoplessia sierosa; e per ciò che riguarda i bagni, nei due casi si farà la docciatura a sei piedi d'altezza appoco appoco con più grosso sgocciolamento, sulle parti possibili ad applicarsi.

Eseguiti i bagni naturali e le docciature, rese celebri dai loro buoni effetti, prenderanno i bagni delle acque termali sulfuree, e marziali, quelli di temperamento flemmatico; ed i bagni saponacei di calore temperato, quelli di temperamento colerico e sanguigno (d).

lo spavento può essere ancora uno dei rimedj anti-paralitici. VALE-RIOLA riferisce, di aver visto un paralitico, che da molti anni se ne stava infermato in un letto, sbalzare impetuoso, e correre, per improvviso incendio suscitato in casa; e BARTOLINO racconta di un muto, che si accese di tanta collera contro una stolta vecchiarella, che la malmenò con furioso trasporto: nella paralisi prodotta da essiccamento di qualche ulcera, o da retrocessa malattia cutanea, si fa uso delle fregagioni, dei senapismi, dei vescicanti, dei fonticoli, dei fiori di zolfo, ec.: *Il Tr.*

(d) Il Sig. PERCIVAL POIT ci ha data la descrizione di quella specie di paralisi degli arti inferiori, che d'ordinario si trova accompagnata dalla curvatura della spina. che è riguardata come proveniente da tal causa, nominata dal nostro autore p. 422.

*Paralisi della palpebra.*

Rispetto alle paralisi parziali, quella della palpebra si guarisce difficilmente. Si possono però im-

Ne' ragazzi usciti dall'infanzia e negli adulti facilmente si possono notare le prime apparenze ed i progressi del male: Cominciano ad esser languidi, sfogliati, e gravi nel camminare; ben presto perdono la fermezza nelle gambe, e facilmente inciampano e sdruciolano, ancorchè la strada sia piana; sentono nelle cosce un insolito grado di sensibilità, e frequenti ed irregolari scosse ne' muscoli: non va gran tempo che ad ogni tentativo di muoversi un po' più presto dell'ordinario, od anche volendo stare diritti su due piedi, le ginocchia si piegano loro sotto, ed essi cadono sovente indietro: in progresso a malattia più avanzata, non possono che a grande stento e se non dopo molta riflessione diriggere il loro piede precisamente verso un qualche dato punto; le cosce e le gambe perdono una buona parte della loro sensibilità naturale, e diventano perfettamente inette per tutti gli uffizj, ai quali erano dalla natura destinate.

Questa specie particolare di malattia differisce in alcune essenziali circostanze dalla comune nervosa paralisi: gli arti non hanno nè l'insensibilità, nè l'apparente debolezza delle giunture, nè la totale incapacità di resistenza, per la quale si fanno loro prendere tutte le situazioni, come avviene nella vera paralisi: per lo contrario le giunture hanno frequentemente un grado considerabile di rigidità, particolarmente le caviglie, per la quale i piedi dei ragazzi sono generalmente rivolti colla punta in giù, e non possono perciò collocarli piani sopra il terreno.

Parlando POTT col Dott. CAMERON e JEFFRYS, l'uno medico, e l'altro chirurgo a Worcester, gli fecero rievolvere di un passaggio d'IPPOCRATE, dove parla di una paralisi degli arti inferiori guarita da un ascesso spontaneo nel dorso, e nei lombi; e lo assicuraron, che dietro a questa traccia, essi avevano tentato d'imitare la natura, coll'aprire ed intradare un'uscita vicina al luogo, dove manifestavasi l'alterazione della spina, e che tale sperimento era stato seguito da un esito felice. POTT segnò pure lo stesso metodo coll'egual buon successo, anche nei casi apparentemente inoltrati, e meno suscettibili di soccorso. Ad ottenere questo fine POTT servivasi di varj mezzi: egli adoperò il setone, l'incisione, ed il caustico; ma addottrinato dalla esperienza, preferì quest'ultimo, come quello, la cui azione è più sicura e meno soggetta agli inconvenienti degli altri: Egli forma da ciascun lato della curvatura un'escara di figura quasi ovale, lunga quali tre quarti di pollice, e larga mezzo, lasciando frammezzo ad esse una sufficiente porzione di pelle; e da che la suppurazione comincia a formarsi, vi sparge ogni tre o quattro giorni sulle piaghe una piccola quantità di finissima polvere di cantarelle, per mantenere più a lungo continuato lo spurgo delle piaghe, le quali debbono tenersi aperte fino a per-

piegare e modificare, secondo il temperamento, ec., i rimedj generali raccomandati per la paralisia; e mattina e sera suffumicare la palpebra, ammalata, la testa rimanendo coperta da una salvietta, col caldo sopportabile, colle specie per il fomento aromatico N.º 78., cotte in parti eguali di acqua e di aceto, e negl' intervalli ungere questa medesima parte ogni tre ore collo spirito risolvente N.º 75.: giova ancora il vescicante alle tempie. Tutto ciò riescendo inutile, si tiene fra 'l giorno, la palpebra rialzata con una bendella d'impiaastro diapalma (e).

*Gotta serena.*

La gotta serena recente, che si forma improvvisamente in un soggetto sanguigno o pletorico, si guarisce col salasso dal piede, e replicato alla giugulare, coi semicupj tiepidi per quindici giorni, e colla tisana lassativa N.º 215. presa mattina e sera. Quando al contrario questo male, quantunque recente ancora, si è formato appoco appoco in un soggetto flemmatico, si toglie colla pozione emetico-lassativa N.º 165., replicata ogni quattro giorni, e

fetta guarigione; anzi è prudente cosa di non asciugarle ad un tratto, ma di lasciarne una a purgare per qualche tempo, fino a tanto che ogni più piccola orma della precedente alterazione è del tutto svanita; vuole però l'autore, che si adoperino contemporaneamente la chinachina, il bagno freddo, le fregagioni: il buon successo della cura dipende dalla prontezza, colla quale si farà praticato il rimedio; mentre se le vertebre sono già cariate, è inutile allora ogni tentativo, e l'ammalato conviene, che ceda al suo fatal destino. *Vedi Giornale medico di Venezia ann. 1784.: II Tr.*

(e) Hanno i chirurghi una particolare operazione in questo vizio di palpebra, però non prodotto da paralisia, ma unicamente quand'è molto allungata per rilasciamento (malattia distinta col nome di *ptosis*) il di cui modo di eseguirla puoi vedere nelle più volte citate *istituzioni di chirurgia dell' esimio scrittore Sig. NESSI* tom. III. pag. 276. e 277.: *II Tr.*



negl' intervalli, tutte le mattine, il lavativo purgante N.° 111.; rimesso il quale, si ordina la mistura e l'infusione raccomandata per il letargo. Se al fine di una diecina di giorni, la vista non è ristabilita, si pone un setone alla nuca, ed un leggiero vescicante posteriormente all' orecchio colla seconda scorza di mezereon, o col vescicante N.° 63., steso molto sottilmente (f).

### *Paralisi della lingua.*

La paralisi della lingua esige la distinzione ed i rimedj generali indicati per le paralisi. Il malato si lavi spesso la bocca con un gargarismo composto di parti eguali di spirito di lavanda, di coclearia, ed il doppio di acqua di salvia, e masticando costantemente la radice di piretro, di cardamomo, od altri simili aromi.

---

(f) Celebrano il pepe di Ciaga, dice il REDI, per medicamento specifico contro al mal caduco, e contro a quella cecità, che da' Greci fu detta amaurosi, e da' Latini de' secoli più bassi gutta serena. Ma non ardirei di affermare, che fosse d'intero giovamento contro a siffatti mali, avendolo in diversi soggetti sperimentato lungamente, e senza profitto. Il mercurio è stato creduto convenientissimo in questo male; e di tale avviso sono, per nominare fra i molti, i più celebri, PITCARNIO (*elementa medicinae*), EISTERO (*differt. de amaurosi salivatione curata*. Altorf. 1713.), e soprattutto BOERHAAVE io più luoghi ripete il valore del mercurio nell'amaurosi. Alcuni prescrivono i purganti idragoghi, massime quando rilevano dipendere la malattia da inerzia della retina, e del nervo ottico. STORCK ha tentato l'uso della pulsatilla nereggiante (*libell. de pulsatill. nigr.* Vindob. 1771.), COLLIN il decotto d'arnica (*observ. circa morb. acut. & chron.*). De HAEN (*rat. med. Tom. I. Part III. cap. 3.*). WARE (*remarks on the ophthalmia*, ec. ec. London 1770. 2.), HEV (*medical observations, and inquiries by a society*, ec. Vol. V.) e POUTEAU, la elettricità, i fonicoli, il setone, la moxa, (*œuvr. posthum.* Tom. II.) LIEUTAUD, il muschio (*precis de medec. prat.* Tom. II.), ec.: *Il Tr.*

*Paralisi dell' esofago.*

Nella paralisi dell' esofago, oltre i suddetti rimedj generali, si applichi un setone alla nuca: si fregghi spesso il collo, alternativamente collo spirito risolvente N.º 74., e coll' unguento anti-spasmodico, gargarizzando spesso col gargarismo raccomandato per la paralisi della lingua; e se questi rimedj riescissero inutili in queste diverse paralisi locali, si ricorra ai bagni termali, e soprattutto alle docce prese sulla testa e sulla nuca.

*Paralisi della vescica e dell' intestino retto.*

Se la vescica od il podice sono affetti da paralisi (g) per interne cagioni, si usi, secondo il temperamento dell' ammalato, i rimedj generali sopra descritti, ed i bagni aromatici N.º 3. o quelli termali sulfurei e marziali N.º 3., come ancora le frizioni al perineo, al pube, ed alla parte inferiore della spina del dorso. Si lavi la regione di queste parti collo spirito risolvente N.º 74.; oltre un lavativo mattina e sera di tre o quattro once di decotto di tabacco, per irritare i nervi insupiditi; e per rianimarli si useranno i semicupj aromatici N.º 1. (b).

(g) Secondo ARETEO si dovrebbe chiamare *parestis: urinae in vesica aut suppressio, aut retinendi impotentia, parestis proprie est: Il Tr.*

(b) Nel secondo volume delle osservazioni di medicina di Londra si trova la storia di una paralisi dello sfintere della vescica, tolta coll' applicazione di un vescicante sull' osso sacro: *Il Tr.*

*Paralisi del braccio .*

Ella sopravviene qualche volta per un' eccessiva dose di opio somministrato nella colica.

Si purgherà un pajo di giorni di seguito colla pozione mannata N.° 167. : si darà sulla fera un lavativo d'acqua di linseme, ed in seguito i bagni aromatici N.° 1., le fregagioni mattina e sera e le lozioni del braccio affetto, alternativamente collo spirito risolvente e l'unguento anti-spasmodico N.° 74. e 132. (i).

*Paralisi scorbutica .*

La paralisi scorbutica è frequentissima . Si useranno immediatamente i rimedj indicati per le acrimonie scorbutiche; e dopo avere corretto il sangue, si procurerà la guarigione coi bagni aromatici N.° 1., facendovi infondere un formicajo legato in un sacchetto, e fregando le parti affette al sortire dal bagno, ed ancora mattina e sera, alternativamente collo spirito risolvente N.° 74., e coll'unguento anti-spasmodico N.° 132. Se al fine dei quindici giorni dall' uso di questi rimedj, la guarigione non fosse niente avanzata, si sospenderanno, per purgarli due giorni di seguito colla polvere purgativa N.° 186., prendendo per otto giorni, il vino anti-scorbutico N.° 221., o l'infusione scorbutica N.° 97. Ciò fatto, si riprenderanno i bagni, e si continueranno questi rimedj, come pure le frizioni e le unzioni suddette, alternando i bagni cogli anti-scorbu-

---

(i) Merita di essere letta la diss. di Dan HOFFMANN de *paralysi*, Tubing. 1746., in cui si promove la quistione: *cur pes paralyticus citius restituitur, quam brachium?* Il Tr.



tici fino a perfetta sanazione. Gli ammalati offeriranno secondo il loro temperamento, i metodi raccomandati per le paralisi sierose o sanguigne, e più particolarmente per le diverse acrimonie scorbutiche.

I malati, i quali perdono interamente il moto ed il senso, e quelli, in cui le parti paralitiche sono atrofiche, fredde, pallide, sfosse, sono pressochè incurabili. Quando per lo contrario il calore sussiste con qualche po' di movimento, e con sensibilità, e che i malati risentono un movimento quasi di formicolamento nella parte affetta, avvi luogo a sperare la guarigione; soprattutto se il calore della state favorisce la cura, o se il paralitico è sorpreso da molta febbre.

Le paralisi che divengono dalla lussazione delle vertebre o dalla pulsazione dei nervi per qualche tumore irrisolvibile, sono incurabili.

### *Affidderazione.*

Si chiama affidderazione il diminuito senso ed agilità di uno o più membri. Questo male è frequente negli scorbutici, e spesso ancora è il foriere della paralisi scorbutica; e quand'essa si manifesta subitamente sopra una metà del corpo, annuncia l'emiplegia.

L'affidderazione leggiera si supera colla frizione secca e coll'esercizio; ma quando replica spesso, o sussiste ostinata, s'impiegheranno secondo il temperamento dell'ammalato, i rimedj indicati per le paralisi sanguigne o sierose, colle convenienti modificazioni.

*Tremore .*

Il tremore dei membri succede ai violenti trasporti, agli stravizj replicati del vino e dell' amore: attacca più particolarmente gli operaj in metallurgia ed i vecchi. Degenera spesso in paralisi ed altri cattivi mali nervosi.

Il tremore si cura come l'affidazione, non eccettuato il salasso e le purghe, se vi sono indizj di pletora o di pienezza. Ma s'egli unicamente è prodotto dalla debiltà, si useranno gli alimenti, le bevande ed i rimedj corroboranti, le fregagioni replicate sulle parti affette con calda flanella, e mattina e sera, collo spirito risolvente, e l'unguento anti-spasmodico N.º 74., e N.º 132.

La dieta lattea, cominciando dal latte d'asina, e l'uso della china polverata, con un quarto di radice di valeriana silvestre, hanno prodotto a lungo andare buoni effetti. La dose è di venti grani quattro volte al giorno, cioè a dire al primo svegliarsi, al coricarsi, e mezz' ora prima dei due pasti, nell'acqua.

Per dissipare i reliquati della paralisia sierosa e delle piccole affezioni paralitiche mentovate, i brodi di vipera sono stati molte volte efficaci.

**DELL' EMORRAGIA IN GENERALE.**

**Q**Uando le estremità dei vasi capillari sanguigni sono dilatati e forzati dall' impulso del sangue, o corrosi da materie acri; ed allorchè i vasi d'ogni calibro si rompono per isforzo, o sono tagliati da una potenza esterna, questi lasciano traboccare il sangue ricevuto; e quando lo spandimento è considerevole, si chiama emorragia.

I vasi più suscettibili di emorragia, per cagioni interne, sono quelli situati nell' interno delle narici, quelli del polmone, dello stomaco, delle vie orinarie, della matrice, dei vasi moroidali, da cui nasce l' emorragia nasale, l' emotisi, il vomito di sangue, le perdite delle donne, ed il flusso emorroidale, che si fa per l' ano. Le due ultime emorragie faranno trattate agli articoli dei menstrui e delle morroidi.

Le conseguenze generali dell' emorragia frequenti od abbondanti, sono gli svenimenti, i moti convulsivi, lo scadimento delle forze del corpo, e dello spirito, il languore, la cachessia, l' idrope, ec.

Se l' emorragia è esterna e leggiera, si applicherà solamente sui vasi tagliati della vecchia di lupo (a), un pezzo d' esca, o compresse inzuppate nello spirito di vino, lasciate sopra per ventiquattr' ore, avvertendo nel levarle, di sollevarle dolcemente dopo averle inumidite, ammolite, e rialzate con vino o con acqua tiepida.

Se al contrario i vasi tagliati fossero più considerevoli, trovato un punto d' appoggio, si arresta il sangue alla meglio, comprimendoli con filaccia e compresse graduate, inzuppate nello spirito di vino. Per dare maggiore solidità alle compresse, si colloca fra le prime e le seconde, un pezzo di carta, od una piccola lastra d' argento; e se il sangue zampillasse per balzo, si asperge il di sopra dei piunaccioli, con polvere di vitriuolo verde, o colla polvere stitica N.º 189., assicurando l' apparecchio con conveniente fascia, che non si leverà, oltre le precauzioni suddette, se non dopo trentasei ore; o pure ogni tre o quattr' ore solamente, se il sangue ha sgorgato con grosso soffio, Ma

---

(a) *Lycoperdon Bovista* LINNÆI: II Tr.



Ma se per mancanza del punto d'appoggio, questo metodo non fosse praticabile, l'emorragia essendo considerevole con iscopertura dei vasi, si arresta il sangue colla legatura, o cauterizzando gli orificj dei vasi; e se vi fossero vasi mezzo tagliati, si tagliano interamente.

Ma se anche tutto questo fosse impraticabile, si applicheranno sui vasi, daddove spiccia il sangue, il più bene che sarà possibile, filaccia inzuppata nell'acqua stitica N.º 41.; e carica della polvere stitica suddetta, ritenendo il tutto, come si è detto più sopra; e levando l'apparecchio nel medesimo modo.

In tutti i casi, nei quali siavi a temere il ritorno dell'emorragia, si pone il malato al metodo H., e quieto di corpo e di spirito. S'egli fosse pleutorico, o riscaldato, si salassa; e per rallentare la circolazione, si comprime, s'egli è possibile con un torniquetto, l'arteria che porta il sangue ai vasi aperti. Si replica, se abbisogna il salasso: il malato bea molt'acqua fredda gradevolmente inacidita collo spirito di vitriuolo o di zolfo; tutte le fere l'emulsione N.º 66.; e se in conseguenza dell'emorragia, si trovasse molto debile, si deve seguire i consigli dati superiormente per questi casi.

Nell'emorragie interne, l'ammalato stia perfettamente tranquillo, sostenuto con soli brodi di coscia di vitello, alterati col riso passato, o con polte d'avena, beendo acqua fresca inacidita nel modo sopra indicato, o la tisana di riso N.º 215. raddolcita col siroppo di granata o di limone. Ma le persone di sangue sfibrato, o di fibra debole, preferiranno a queste bevande la tisana di sinfio N.º 219., e l'orzata leggiere: si fa un salasso di dieci a dodici once nella più remota parte dal luogo, daddove sfugge il sangue: immediatamente dopo il salasso si sbarazza il ventre col lavativo N.º 108., con di-

sciolto mezz' oncia di nitro, il quale rimesso, si esibisce la mestura stitica N.º 129.; verso sera l' emulsione N.º 66.; e nei casi pressanti, un altro salasso due ore dopo il primo, cercando di rallentare il circolo del sangue, infondendo le estremità nell' acqua tiepida unita ad un dodicesimo d' aceto. Nei due sessi si fomenteranno le parti genitali colla medesima mestura fredda, che si rinfrescherà spesso, agguugnendo ad ogni libbra di questo fomento, mezz' oncia di sale di Saturno negli uomini (b). Si comprimeranno secondo l' arte, i tronchi delle più grandi vene delle estremità, con legature alle cosce ed alle braccia (c), prendendo mattina e sera la polvere di magnesia N.º 181., affine di mantenere sciolto il ventre e di prevenire gli spasmi. Se questi rimedj fossero insufficienti, si sospenderanno, per esibire le pillole dell' Elvezio N.º 153., delle quali, nei casi urgenti, la dose sarà di tre pillole. A questo modo si cureranno l' emorragie interne in generale: le eccezioni a farsi saranno osservate nella cura di ciascuna specie in particolare.

(b) Le preparazioni saturnine sono in Inghilterra ed in Germania usitate internamente nell' emorragie; ma il loro uso, a dir vero, è troppo incerto, e pericoloso, ed è bene ricorrere a' rimedj più moderati, e sicuri: *Il Tr.*

(c) Le legature proposte nell' emorragia, per ritardare il sangue venoso, sono un presidio incerto e dubbio. CULLEN: i loro effetti sono precarj: se queste legature sono troppo forti, impediscono al sangue di colare nelle arterie, ciò che è nocivo: se sono troppo molli, non comprimono le vene, e sono inutili. Supponendo ancora, che si possino stringere a un segno considerevole, il loro effetto non può essere che momentaneo, perchè quando le vene cominciano a riempirsi, deggiono opporre maggiore resistenza alle grosse arterie, ed impedire di svuotarsi; perciò il circolo del sangue si trova fermato nelle grosse arterie, e questo fluido forte difficilmente dal cuore, quindi le legature nell' opporsi alla circolazione, sembrano favorire l' emorragia. Non si deve dunque affidare su questo presidio; ed i medici pratici lo hanno diggià abbandonato. BOSQUILLON: *Il Tr.*

In seguito all' emorragie interne ed esterne, affine di riparare il sangue e le forze, i convalescenti di un sangue disciolto, osserveranno il regolamento F., e gli altri, quello B., in modo però che nei primi dieci giorni i loro pasti sieno leggeri. Potranno prendere, una volta in ventiquattr' ore una tazza di cioccolata di sanità (d), e fra i pasti un buon brodo, un uovo affogato nell' acqua, un poco di gelatina, od un dito di buon vino rosso annacquato, un biscotto, e nei casi di maggiore debolezza, la dieta lattea della lettera G., per un mese.

Gli svenimenti e le convulsioni sopraggiunte nell' emorragia, principalmente le ultime, sono di cattivo augurio, ed il malato muore, se non si può immediatamente arrestare il sangue, o ripararne la perdita coll' uso di buoni brodi presi ad ogni mezz' ora, interposti con mezza tazza della mestura cordiale N.º 124., usando nel medesimo tempo, nei casi violenti, l' epitema N.º 62., e fasciando dolcemente il basso ventre con salvietta, e le estremità con legacci per rimandare il sangue necessario alle parti nobili.

La febbre lenta che succede alle grandi, o lunghe emorragie, si guarisce con un alimento sano, ristorante, prendendo prima della colazione dei due pasti, e nel coricarsi mezza dramma di china polverata, in un po' di vin rosso. Se l' ammalato fosse molto debile, sostituirà alla polvere un bicchiero d' infusione di chinachina fatta per ventiquattr' ore con due once di chinachina ammaccata, e due libbre di acqua fredda (e).

E e 2

---

(d) La cioccolata di sanità è fatta secondo l' uso ordinario, se non che sono omissi interamente gli aromati: *Il Tr.*

(e) Fra i rimedi reputati giovevoli nell' emorragie in generale, sono gli emetici, senza che i fautori di cotai rimedio ne possano dar



*Emorragia nasale (f).*

L'emorragia del naso è comunemente preceduta da mali di testa, da alienazioni, e da tintinnio d'orecchio.

Se l'emorragia nasale è leggiera e periodica, come vedesi succedere nella gioventù, è questo un beneficio, da non intorbidarne punto il corso. Si eviterà soltanto di riscaldarsi col vino, cogli esercizi violenti, ec. Tutte le volte però ch'essa sarà strabocchevole, si deve moderare colla quiete e coi piediluvj tiepidi colla giunta di una tazza d'aceto, applicando frattanto, sulla fronte e sulle tempie, compresse inzuppate in parti eguali di acqua, e di aceto freddi, da replicarsi quando sono secche. Ciò malgrado se il gocciolamento di sangue persiste, si gettano improvvisamente un pajo di tazze di acqua fredda sulla faccia dell'ammalato, come anche sulla nuca (g); e con ciò l'emorragia se non è soffermata, si salaffa dal piede, esibendo l'emulsione N.º 66., o le polveri N.º 190., introducendo nello stesso tempo assai innanzi della narice, daddove spiccia il sangue, una tasta o turacciolo inzuppato nell'acqua stitica N.º 41.; e se non si potesse sorprendere il vaso aperto, s'injeterà dolcemente nella narice dello spirito di vino rettificato, o dell'acqua stitica suddetta, stando il malato al regolamento, bevande,

ragione del loro operare. BRYAN ROBINSON di Dublino gli ha proposti colla indicazione di corroborare. CULLEN, nella sua materia medica, dice di avere usato con profitto nell'emorragia uterina il vetro cerato d'antimonio, e la ipecacuana, aggiugnendo, che in questo caso giovano gli emetici come nelle dissenterie: *Il Tr.*

(f) *Epistaxis: Il Tr.*

(g) E' pure suggerito in questi casi d'incutere un forte spavento, con cui sospendere l'emorragia: *Il Tr.*

ed ( a proporzione del bisogno ), a tutto il consigliato nell' articolo dell' emorragie interne (b). Soffermato il sangue, si lascia di soffiare il naso, fino a che non sieno fermamente chiusi i vasi, regolandosi altronde rispetto ai consecutivi accidenti, come per l' emorragia in generale; moderando i salassi, troppo frequenti, o troppo abbondanti, col salasso invece dal piede verso gli equinozj, col metodo della lettera D., col siero di latte tamarindato N.º 148. preso per una quindicina di giorni in primavera ed in autunno, coi piediluvj un pajo di volte per settimana, colla lozione mattina e sera della faccia e qualche volta della testa, e finalmente coll' evitare ciò che riscalda ed agita il sangue.

Quando l' emorragia nasale indebolisce, produce le conseguenze mentovate all' articolo dell' emorragia in generale. Quelli nei quali è familiare in gioventù, soggiacciono, se la si sopprime, alla febbre, alle vertigini, ai mali di testa, palpitazioni di cuore, risipole, emostisi, moroidi, e disposizione agl' ingorgamenti delli visceri del basso ventre, ai reumatismi, ec.

Le accidentali emorragie nasali che sopravven-  
gono nelle febbri, e che annunciano le crisi, operano tante volte la guarigione; e quand' anche copiosissime, sono di rado da temersi. Non pertanto s' elleno fossero strabocchevoli, non si esibirà l' emul-

E e 3

---

(b) S' introducono taffe o filacce nelle narici investite. p. e., con chiara d' uovo, e polvere composta di parti eguali di zucchero candi, allume calcinato e vitriuolo ceruleo: convengono ancora i vescicanti applicati al dorso, i lavativi quasi freddi col nitro, i fomenti di acqua diacciata e d' aceto sulla fronte e sulla nuca; e finalmente quando l' ammalato è in pericolo di soffocazione per il sangue che cola nelle fauci, si ricorre ad un chirurgo per la necessaria operazione usuale in questi casi: *Il Tr.*

sione, nè i topici sopra esposti, se non dopo aver consultato, quanto si è detto dei sintomi febbrili in generale (i).

### Emorragia dello stomaco.

Il versamento di sangue nella cavità dello stomaco è per lo più preceduto da pulsazione, tensione e sordo dolore sotto la forcilla dello stomaco verso l'ipocondrio sinistro. I malati risentono un peso allo stomaco, accompagnato da calori, ansamenti e nausea con suffeguenti vomiti replicati di un sangue ordinariamente scuro, o rappreso, di cui ne passa anche per le vie del ventre una porzione che si precipita in grumi, e tinge gli escrementi di sangue.

Le conseguenze che ne risultano sono le medesime riferite all' articolo delle emorragie in generale (k).

(i) Per sopprimere l' emorragie ( principalmente nasali ), molti incantesimi, e rimedj superstiziosi furono commendati, e si è preteso, che abbiano avuto buoni effetti. Ma l' apparente esito di questi ( dice CULLEN ) si ripete generalmente dall' errore degli astanti, che lo spontaneo cessare di un' emorragia prefero per effetto di tali rimedj; nonnostante io credo, che questi possano essere riesciti alcuna volta utili per un' impressione d' orrore, o di spavento.

Il bagno locale d' acqua fredda è il più usuale presidio nell' emorragie nasali. MESUE disse: *infuso aquae veri frigoris super caput, & constrictione facta in temporibus ex pila infusa in aqua homini stringit sanguinis fluxum.* ( *Pract. de flux. sanguin. nar.* )

I rimedj così detti astringenti per soffermare l' emorragie sono piuttosto dannevoli, che benefici: internamente presi, la loro prima impressione è sulle vene lattee e sulle vene assorbenti, che corrugano, e ristringono, o se accompagnati da diluente bevanda, e trasportati al sistema dei vasi, prima i vasi polmonali, e tutti quelli che dapprima incontrano, stringono, e per conseguenza accrescono l' impeto del sangue verso la parte debile; quindi durante l' emorragia, non pare che sian giustamente indicati: *Il Tr.*

(k) Le cagioni predisponenti di questo male sono l' infarcimento dei vasi del ventricolo, degl' intestini, principalmente nelle persone



Si cura questo male esattamente secondo gl' insegnamenti dati per la cura delle emorragie interne in generale, colla sola differenza, di bere freddo, fra i vomiti, preferendo per bevanda l'acqua fresca inacidita collo spirito di vitriuolo. Soppressa l'emorragia dopo molti giorni, si sbarazza dolcemente lo stomaco dai rimasti grumi di sangue, colla tintura di rabarbaro temperato N.º 204., ed eseguendo, rispetto ai sintomi e conseguenze, come anche per prevenire il ritorno dell'emorragia, il raccomandato per l'emorragia in generale, e per quella nasale in particolare.

Nel vomito di sangue, i vasi chiamati corti, distribuiti nelle membrane dello stomaco, sono ordinariamente molto distesi e come varicosi. Per restringerli, e per prevenire la recidiva, i fomenti prudentemente fatti fra gli insulti, coll'acqua diacciata, produrranno un buon' effetto.

La malattia è delle più gravi, quand'è accompagnata da febbre od ostruzioni evidenti nell'uno o nell'altro dei visceri del ventre inferiore. Se le moroidi od i menstrui fossero soppressi, si ristabiliscono quest' evacuazioni, com'è insegnato nei loro rispettivi trattati: Il vomito di sangue nelle donne gravide cessa per lo più dopo il salasso dal braccio.

Allorchè dopo aver vomitato un sangue nero, se ne rimette per secesso del colore e consistenza della pece, puzzolente e corrotto, forma il morbo nero d' Ippocrate, che è incurabile (1).

E c 4

---

emoroidarie, melancoliche ed ipocondriache, come ancora nelle sospese menstruazioni, e negli omessi consueti salassi. Le cagioni remote sono la rilassatezza dei vasi, la mancanza di esercizio, l'incurvatura continuata del corpo; e finalmente l'abuso del caffè, degli spiriti ardenti, degli emetici antimoniali ripetuti, ec.: *Il Tr.*

(1) *Morbus niger*, o melæna: *Il Tr.*

*Emoftifi (m).*

L' emoftifi è pure una effufione di fangue fatta per la bocca . Differifce dalla precedente , perchè il fangue viene dal polmone ; perchè uno o più vafi di quefto vifcere fi aprono nei loro orificj , o fi trovano corrofi dagli umori acri , o nel loro corpo , o nella loro eftremità : succede ancora che uno o più vafi fieno rotti per una fcoffa violenta di tutto il corpo , o del folo polmone . Quefta effufione fi fa fenza o con toffe : il fangue per lo più è vermiglio e fpumofò , i malati lo fputano replicatamente a piene gorgate , e tante volte per più giorni di fe- guito con intervalli più o meno lunghi . Queft' emor- ragia è preceduta da rilafciatezza , abbattimento , op- preffione , accorgimento di fapore di fangue alla boc- ca , non che da palpitazioni di cuore , con fuffe- guenti frizzi nel petto , calori meno vivi che fafti- diofi , e lo fputo di fangue , che tante volte viene fenza toffe , o fi rimette con una toffe rauca , pro- pria di quefto male .

Oltre le confequenze riferite all' articolo dell' emorragia in generale , l' emoftifi difpone alla reci- diva , alla polmonia (n) , ec.

*Sputo di fangue .*

Il vomito di fangue e l' emoftifi fono le capitali emorragie che fi fanno per la bocca . Siccome egli

(m) Chiamata anche emorragia dei polmoni : *Il Tr.*

(n) OVIDIO diffe , effere male mortale .

*Cernis ut e molli sanguis pulmone remiffus*

*Ad ftygias certo limite ducit aquas .*

*Il Tr.*

succede , che i malati si allarmino mal a proposito , confondendo l' emostisi collo sputo di sangue , che viene dalle gengive , o che cade dalle narici posteriori nella bocca , o con quello della laringe , o solamente dalla trachearteria , se ne accerterà del luogo , da cui parte , da ciò che ne segue .

Il sangue delle gengive si sputa come saliva , e viene alla bocca , succhiandole : se dalle narici , se ne soffia nel medesimo tempo più o meno , e si risente alla parte superiore delle narici , irritazione , o solletico , ed il sangue cade nella bocca , dacchè fassi l' usitato movimento per attrarre le pituite del naso in questa parte . Quando il sangue viene dalla laringe , o dalla trachearteria , si sente qualche pizzicore nel fondo della gola ; allora si sputa di tempo in tempo uno o più piccoli cucchiari di sangue puro , con un po' di tosse , e più spesso , fienime variegate di filamenti sanguigni .

Gli sputi di sangue delle gengive , delle narici posteriori , della laringe e della trachearteria sono più tribolanti che pericolosi . Ordinariamente se ne guarisce , se dopo il salasso dal piede , si fa un lungo uso del regolamento e rimedj indicati per l' acrimonia scorbutica , di cui l' ammalato potrà esserne infetto . S' egli non fosse incomodato da queste acrimonie , basta per bevanda ordinaria , la tisana di sinfio N.º 219. , il siroppo anti-moistico N.º 196. , e ciascuna settimana , un pajo di piediluvj tiepidi di acqua-crusca , continuati fino a perfetta guarigione ; il che non riuscendo , si esamina , se avvi qualche altra acrimonia nel sangue , che per distruggerla , si regolerà secondo il prescritto per i vizj sanguigni .

Rispetto all' emostisi , si arresta immediatamente il sangue senza l' uso dei stitici , salassando generosamente dal braccio , e sbarazzando il ventre col lava-



tivo N.º 108. animato da mezz' oncia di nitro: reso il lavativo, si salaffa dal piede, ed il malato offervi quanto si è prescritto per l' emorragie interne in generale. Se le bevande acidette, come pure le fredde, eccitassero la tosse, berà dell' acqua pura posata, acqua di riso o della suddetta tisana di sinfito . Il malato farà coricato colla testa alta; asterrassi dal parlare, e dalle agitazioni di corpo e di spirito, evitando più che sia possibile di tossire, di sternutare, di scaricare il ventre con forza, come anche lasciando tutti i movimenti che mettono in azione il petto . Nelle prime ventiquattr' ore prenderà per tutto rimedio di dieci in dieci ore, la metà dell' emulsione N.º 66., ed ogni mezz' ora dieci grani di nitro depurato, in una tazza di acqua fresca. Affine di ritardare il ritorno del sangue al cuore, si faranno nel medesimo tempo le legature alle braccia ed alle cosce, ed i piediluvj prescritti per l' emorragia in generale . Ma se al fine di questo tempo, l' espettorazione del sangue puro non fosse interamente soppressa, si replicherà il salaffo dal piede, usando ancora per lo spazio di 24. ore, la misura stitica N.º 129., come anco la tisana di sinfito . Se questi rimedj fossero inefficaci, si tornerà a salaffare dal piede, passando subito all' uso delle pillole d' Elvezio N.º 153., accrescendo la dose di questi due ultimi rimedj tutte le volte, che l' effusione del sangue farà copiosissima, avvertendo inoltre di tenere libero il ventre col lavativo suddetto, ed in seguito colle polveri di magnesia N.º 181.

Se l' ammalato cadesse svenuto, si farà rinvenire gettandogli dell' acqua fresca sul volto . Rispetto alle convulsioni, e debolezze dei convalescenti, si consulterà e seguirassi il già detto per l' emorragie in generale .

Siccome questa malattia è soggetta alla recidiva,

si userà per prevenirla , quanto è stato detto a quest' uopo per l' emorragia da naso ; e se l' emoftisi fosse una malattia di famiglia , l' effetto di un sangue disciolto acre , o preceduta da qualche malattia polmonare, ella avrà conseguenze altrettanto più cattive, quanto maggiore sarà stata la necessità, per salvare la vita al malato, coll' uso dei rimedj astringenti . Il malato sputerà ordinariamente dopo il sangue vermiglio , per alcuni giorni, sangue spesso e nero , il quale appoco appoco s' impallidirà , con susseguenti sputi purulenti, seguiti da sintomi di polmonia .

Al momento che si rileva questo cattivo successo , si fa immediatamente un piccolo salasso , per poco che l' agitazione del sangue lo indichi, e le forze del malato lo permettano . All' indomani si purga colla pozione mannata N.º 167. ; il giorno in seguito ogni quattr' ore si dà una dramma del balsamo del Locatelli unito a sei grani di estratto di chinachina, soprabbevendo a ciascuna presa una tazza dell' infusione balsamica N.º 100. ; e per tutto pasto fra gl' intervalli dell' uso di questi medicamenti , una tazza di latte vaccino con un terzo d' infusione di fiori di margheritine ; e se affronte di queste precauzioni , la spettorazione purulenta e la tosse sussistessero al di là di tre settimane , si tratta l' ammalato giusta gl' insegnamenti dati per la polmonia (c) .

(c) Bisogna essere molto cauti nell' uso dei balsamici , perchè sono incendiarij , e fomentano maggiormente la emoftisi : *A balsamicis natis, ut terebinthina, de Copaiva. Peruviano, de Mecca, & similibus, plane abstinere* : NEIFELD : *ratio med. morb. circuli sanguinei*, pag. 387.

Il nitro è stato riputato un sovrano rimedio di questo male , e DICKSON protesta nel quarto volume delle osservazioni mediche di Londra , avere trovato tanto sicuro questo sale nella emoftisi , come la chinachina nelle intermittenti ; questo autore lo esibisce alla dose di mezz' oncia unito a quattr' once di conserva di rose rosse , per formarne elettuario , da prenderne alla grossezza d' una noce molca-

L'emoftifi delle perfone altronde fane , avve-  
nuta per un grande rifealdamento, eccelfo nel vino,  
trasporti violenti , o grandi sforzi del petto , come  
pure quella che nafce nelle donne gravide e nelle  
donne molto fanguigne , è tante volte fenza confe-  
guenza .

Ceffati gl' infulti dell'emoftifi , i vafi non fono  
ficuramente riuniti dopo una diecina di giorni ; ep-  
però i convalefcenti avvertiranno di regolarfi con-  
fequentemente , fopra tutto quando l'emoftifi parte-  
ciperà delle fuddette caufe interne .

Quando fra 'l fangue degli emoftici fi trovano  
delle membrane , concrezioni polipofe o materie pu-  
rulente , ciò è di cattivo augurio .

L'emoftifi confe cutiva alla polmonia , accelera  
la morte .

Quando l'emoftifi è una malattia di famiglia ,  
fi uferà il falaffo , da replicarfi ogni tre mefi dall'  
età dei quindici anni fino ai trentacinque ; prenden-  
do per un pajo di giorni , in ciascuna settimana , le  
polveri di magnesia N.º 181. e di fpeffo i piedilu-  
vj tiepidi . Con quefti mezzi , e coi metodi delle  
lettere B. ed F. fi preverrà l'emoftifi come anche

ta , quattro , fei , od otto volte al giorno , più o meno fecondo il  
bifogno , non ometti però i falaffi nelle dovute indicazioni . Quefta  
fteffa proprietà era già ftata rilevata da STAHL , di cui eccone  
le fteffe parole : *Affeverare possum , quod numerosis hæmoptoicis ,*  
*drach: dimid: , scrupol: duob: ad drach: integr: nitri , per vices oppor-*  
*tunas exhibiti , ita efficaciter subvenirim , ut coercito , quicumque su-*  
*berat , sanguinis orgasmo , non modo citissime , sed etiam constantissime*  
*cessaverit eruptio , atque fluxus ( obs. chymic. phys. medic. curios. ,*  
*pag. 464. )*

BOSQUILLON dice effere fenza fondamento , che li pref rivono  
le germinie animali , come un mezzo di dare maggiore confidenza  
agli umori , e di prevenirne la rifecata ; imperocchè non folo que-  
fte gelatine accrefcono la diarefi infiammatoria , ma fi digerifcono in  
generale difficilmente ; diminuiſcono perciò la trafilazione , e fono  
più difutili che vantaggioſe . L' ufo del latte , i mucilagginoſi vege-  
tali , la gommara bica fono più indicati : *Il Tr.*



la susseguente polmonia; e se il soggetto ha il sangue acre, gli si farà un cauterio alla gamba (p).

*Piscio sanguigno.*

I due sessi sono soggetti a perder sangue per le vie dell' orina. Questo sangue può venire dalle reni, dalla vescica, o solamente dall' uretra. Quando egli si filtra dalle reni per gli ureteri nella vescica senza sintomi, che annunciano il calcolo orinale, i malati sono unicamente affetti da un po' d' imbarazzo alle reni, e da un senso di stanchezza. Il sangue ch' essi rendono, è sì bene unito colle urine, che la mistura appare tutto sangue; ma nel lasciarlo riposare il sangue si separa e si precipita al fondo senza essere grumoso.

Questo piscio sanguinolento nasce facilmente nelle persone, le quali hanno le reni rilasciate, od il sangue disciolto o molto rarefatto da violenti esercizi, e rendono con facilità molto sangue colle urine.

Quando al contrario il sangue, che si rende per le vie orinarie, viene dai vasi della vescica, o col suo sfintere, l' emorragia è ordinariamente annunciata da frizzi e dolore ai dintorni del pube e del perineo. Il sangue reso, non è bene collegato colle urine; precipitato, appare grumoso, e questa specie di piscio sanguinolento è per lo più preceduto od

---

(p) CULLEN è di sentimento, che possono giovare nell' attuale emostisi, i vescicanti applicati al petto. od alla schiena; e che i cauterj negli stessi siti possono esser utili a prevenirne la recidiva. Il Dott. BRYAN ROBINSON di Dublino è forse stato il primo ch' io mi sappia, il quale abbia fatto uso dei vescicanti nell' emorragie: si vuole però che disconvengono nell' emorragie uterine, e moroidali, per la irritazione, che su quelle parti potrebbero produrre le cantarelle: *Il Tr.*

accompagnato da gonfiore dei vasi moroidali; se ne rimette poco per volta; non dura molti giorni, e gli ammalati emoroidarj, soggiacciono a periodiche recidive annunciate dal bisogno frequente e difficoltoso di urinare, con tanto maggiore d'inquietudine, quanto più è considerevole il gonfiamento dei vasi sanguigni dello sfintere.

Tutti questi sintomi crescono, quando una parte del sangue si spande nella vescica, e vi si aggruma: questi grumi acquistano col loro soggiorno nella vescica una consistenza fibrosa, e cagionano tante volte la soppressione assoluta delle orine, con dolori accompagnati da ambascie, da nausea, da vertigini, lipotimia, raffreddimento delle estremità, da polso piccolo ed inceppato, che annuncia la flogosi, dichiarata da brividi seguiti da ardore alla vescica, da calori febbrili, come anche da alterazione.

Quando il sangue viene dall'uretra, vi cola senza che l'ammalato rilasci le orine. Questo caso è raro, e s'egli succede, il sangue fluisce in affai grande quantità.

Oltre le conseguenze dinotate, parlando della emorragia interna in generale, l'emorragia delle reni, copiosa e lunga, conduce più particolarmente alla stasi. Quella della vescica dispone al rattenimento d'orine, alla infiammazione della vescica, ec. (q).

(q) *Sanguinis miſtus tametſi non admodum cito enecat, tempore tamen procedente infinitos jugulat. ARETÆUS. Miſtum ſanguinis plus ſæpe ſuccedit ulceratio, atque tabes; violentus, ſive exceſſivus facile tabem inferit. WEBER. Qui cum puris miſctu, ex rene & veſica, profundius læſa, ulcerata, cum dolore proficiſcitur; omnium periculoſiſſimus eſt. NEIFELD. Nonnullos hic morbus poſt breve tempus aufert; alios febris lenta, hydrops, aut tympanitis eum ſubſecuta necat. QUARIN: Il Tr.*

Si cureranno quest' emorragie metodicamente com'è stato insegnato per la cura dell' emorragie interne in generale, colla differenza soltanto, che i salassi si faranno dal braccio. Si eviterà di riscaldarsi le reni ed i lombi, avvertendo di stare coricato il meno possibile su queste parti. Si fomenteranno i lombi, il pube, od il perineo, o la regione, daddove il sangue apparirà staccarsi, pannilini piegati assai doppj, ed inzuppati nell' acqua stitica tiepiduccia N.º 41 (r). Se il flusso di sangue dell' uretra fosse abbondante, vi si faranno ogni mezz' ora replicate iniezioni colla medesim' acqua stitica, unita a parte eguale d' acqua di piantagine, imbianchita colla schiuma di una chiara d' uovo. Queste iniezioni si faranno alla dose di mezzo cucchiajo, ed introdotte dolcemente con piccola siringa d' avorio, con cannello abbottonato.

Nel caso che l' emorragia della veseica non consistesse che in un piscio sanguigno periodico, lo si risguarderà come un supplemento del flusso emorroidale, da non sopprimerli se non quando sarà copiosissimo, cercando di ristabilire il flusso emorroidale coi rimedj più dolci indicati a quest' effetto all' articolo delle moroidi. Frattanto si rimedierà col salasso alla pletora; all' inspessimento ed all' acrimonia del sangue, col siero di latte e coi regolamenti sotto le lettere B. e G.

Se la soppressione delle orine, e gli altri sintomi suddetti indicassero grumi di sangue fibroso innicchiati nello sfintere, o nell' imboccatura dell' uretra, si applicherà al più presto un pajo dei lavativi

---

(r) Serve ancora l' impiastro fatto collo sperma di rane coll' allume, o col zucchero di Saturno, ed un po' di canfora: oppure la chiara d' uovo sbattuta coll' allume, e soffreda da applicarsi alla regione del pube: *Il Tr.*



N.º 108., ed immediatamente dopo molti fomicupj domestici tiepidi, iniettando spesso dell' acqua di linseme nella vescica; e negl' intervalli fra i bagni si applicherà sul pube il cataplasma ammolliente N.º 15., beendo l' ammalato ogni ora una tazza d' infusione di linseme raddolcita col siroppo d' altea. S' egli fosse debolissimo, prenderà la mistura cordiale N.º 124.; e se coll' ajuto di questi rimedj, il rattenimento delle urine non cessasse, non si tarderà ad introdurre il catetere, colle precauzioni raccomandate all' articolo della soppressione delle urine.

Se l' emorragia delle reni o della vescica fosse l' effetto del calcolo, dell' esulcerazione o di un' altra causa meccanica, si cercherà di sollevare il malato coi rimedj indicati per simili casi. Ma l' ammalato non potrà guarire che dopo essere stato liberato dalla cagione; e per questo effetto, si consulteranno gli articoli, nei quali si parla del calcolo, delle ulcere alle reni, ec.

Il pischio sanguinolento senz' altro sintoma, che nasce nelle persone riscaldate, per lunghe corse, ec. proviene per lo più dalla dilatazione dei vasi capillari delle reni, e più spesso egli è senza conseguenza.

Il pischio di sangue che succede dopo l' uso esterno od interno delle canterelle, si guarisce coll' uso abbondante d' orzata, di latte d' amandole, della tisana arabica N.º 207., od in sua mancanza col latte di vacca.

Alcune emorragie per le vie dell' orina, ribelli, sono state guarite più di una volta coll' uso delle acque minerali acidette, unite ad un terzo di latte; ed elleno faranno anche salutari per prevenire la recidiva.

Il pischio di sangue dell' uretra dipende sovente dai reliquati venerei, da caruncole, da ulcere, ec. In questi casi bisogna ricorrere alla cagione, e consultare l' articolo dei mali venerei.

## DEI VELENI IN GENERALE .

**I** veleni producono i loro funesti effetti, quando si trangugiano, o s'inspirano in forma di vapore, • s'insinuano nel corpo coll' applicazione delle materie avvelenate .

### *Sintomi del veleno trangugiato .*

Allorchè, senza cagione manifesta, si trova un malato , che dapprima era in buon essere , interamente indebolito, travagliato da voglie di vomitare, da ansamenti, da soffocazioni, da ardori ed irritazioni alla gola, ed allo stomaco, e che crescono precipitosamente, avvi luogo a credere, ch'egli avrà trangugiato qualche veleno . Se ne accerterà maggiormente, se questi sintomi sono seguiti da violenti vomiti, o da vivi dolori colici, da movimenti convulsivi, da singhiozzo, da svenimenti, da palpitazioni di cuore, da subitanea gonfiezza del ventre, da raffreddamento alle estremità, da sudore freddo, specialmente alla testa, da ardore nell' orinare, o da rattenimento d' orine, da lividezza delle unghie, e qualche volta da delirio. Questi sintomi più o meno combinati sono ancora accompagnati da particolari accidenti dipendenti dalla specie del veleno. Ben presto la morte seguirà, se non si porgono prontamente al malato i convenienti soccorsi .

### *Sintomi del veleno inspirato .*

Il veleno inspirato in forma di vapore, assalisce immediatamente il petto, e produce una subitanea soffocazione, alla quale succedono vertigini, le quali fanno vacillare i malati, e ben presto essi ca-

dono soffocati e senza cognizione: qualche volta ancora i suddetti accidenti sono seguiti da alcuni dei sintomi del veleno trangugiato, e che variano secondo la natura del vapore mefitico inspirato. I principali veleni, ai quali noi siamo esposti, sono quelli del carbone, del mosto delle uve, o degli altri liquori, che sono nella forza della prima loro fermentazione, ed il di cui gas (a) estingue il lume, e soffoca l'uomo. I vapori delle cloache, delle miniere, e d'altri luoghi sotterranei, la cui aria non è giammai rinnovata, o che è avvelenata da esalazioni arsenicali, ec., producono pure questi funesti effetti.

*Sintomi del veleno esternamente applicato .*

Il veleno esternamente applicato produce più o meno subitamente i suoi funesti effetti, secondo la sua particolare natura. Il ragno, lo scorpione, il rospo, l'aspide, la vipera, i cani, od altri animali arrabbiati, ci pongono spessissimo nel caso di provarne la diversità. La parte sopra cui il veleno di questi animali s'insinua, si trova più o men presto insupidita, a cui succede un dolore più o meno acuto, ardente o piccante al luogo della morficatura, quasi sempre divenuta gonfia. I dintorni del tumore acquistano una rossezza che volge al livido, ed il veleno spandendosi prontamente nel tessuto cellulare, ed insinuandosi nella massa degli umori, produce alcuni dei sintomi che si manifestano dopo il trangugiamento del veleno. Quelli del rospo e della vipera eccitano tante volte la spasmodica itterizia, ed un generale gonfiamento; la morficatura del cane arrabbiato genera l'orrore dell'acqua, chiamato

---

(a) Gas, o vapore elastico, od aria fissa: *Il Tr.*



idrofobia: gl' insetti che pungono, quando si scacciano, o si schiaccino, ritirando subitamente il pungiglione, fanno piccole lacerazioni: il pungiglione si rompe e rimane nella pelle, per cui si gonfia e s'infiamma, ec.

*Cura generale dei veleni trangugiati.*

Se s'incorre nella disgrazia di trangugiare qualche veleno qualunque desso sia, cercasi di evacuarlo presto dallo stomaco e dal canale degl' intestini, rintuzzando ed indebolendo, ciò che è rimasto nel condotto cibario; e determinando per le vie del sudore le particelle, insinuate nella massa umorale. A questo effetto bea immediatamente il malato molte scodelle di acqua tiepida carica di butirro fresco o di olio non rancido: solletichi la gola, o la irriti colla lanugine di una piuma, affine di eccitare vomiti replicati, procurando subito di dare un pajo delle prese d'ipecacuana N.º 192., delle quali una se non produce un effetto sufficiente per espellere il veleno, ne prenda l'altra un' ora dopo, in una tazza di acqua tiepida, beendo per ciascun vomito un pajo di tazze d'acqua egualmente tiepida,

Per estrarre dagl' intestini ciò che vi potesse essere insinuato di velenoso, non si tarderà di dargli molti lavativi di acqua di linseme, con tre o quattro cucchiaj d'olio d'olivo; mantenendo quest'evacuazioni, fino a che lo stomaco ed il basso ventre siano più che sia possibile sbarazzati dal veleno. Allorchè la cessazione delle nausee, e della colica dinota che non avvi più veleno nelle prime vie, si esibisca la triaca alla grossezza di una noce, soprabbeendo un buon brodo, dandogli da poi ogni due ore in quarantott' ore una tazza di latte vaccino tiepido, e ad ogni ventiquattr' ore un cucchiajo

d'olio di mandorle dolci o di quello d'olive fresco . Si replica ogni tre ore il suddetto lavativo , continuando il tutto , se abbisogna , al di là delle quarantott' ore , e fino a che non si manifesta più nissuno dei sintomi dell'azione velenosa nelle prime vie .

Per distruggere ciò che potesse essersi insinuato nel sangue , ed affine di fortificarsi , il malato prenda dopo questi preliminari , ogni tre ore , una tazza della misura bezoartica N.º 121. , soprabbeendo un pajo di tazze d'infusione di scordeo , avvertendo di coprirsì bene , per invitare il sudore , e ciò da continuarsi per tre giorni di seguito . Il cibo farà , per questo tempo , di buoni brodi , e per maggiore precauzione , almeno per otto giorni , solo latte , s' ei può sopportarlo ; se no , gli alimenti più gelatinosi del regolamento sotto la lettera F.

Questa cura generale è egualmente efficace contro tutta specie di veleni trangugiati . Ma se se ne rilevasse la specie , si uniranno gli antidoti specifici indicati in seguito per la cura delle diverse classi di veleno .

#### *Cura generale dei veleni inspirati .*

Si trasporta subito l'ammalato , il quale abbia inspirato un vapore soffocativo , in un' aria pura e fresca , e gli si levano i legacci : gli si getta dell'acqua fresca sul volto , sulla testa e sul petto : gli si pone sotto al naso ed innanzi alla bocca una spugna inzuppata nell'aceto , oltre le fregagioni e le scosse , gli si fa trangugiare una dozzina di gocce d'acqua di lute o di spirito volatile N.º 75. , in un cucchiajo di vino . Se con questi mezzi non rinvenisse in se , gli si apre la vena giugulare , e subito dopo il salasso , il lavativo purgante N.º 111. ; e se questo fosse infruttuoso ancora , quello di fumo di

tabacco, ed in mancanza dello stromento necessario per questo (b), un lavativo del decotto di mezz' oncia di tabacco da replicarsi secondo il bisogno e prontamente.

*Sura generale delle ferite prodotte dalla morficatura degli animali velenosi, per la puntura degli insetti e particolarmente dell' idrofobia.*

Quando il veleno è insinuato colla morficatura di un cane (c), o di un altro animale rabbioso, cioè

F f 3

(b) L' uso della macchina fumigatoria a questo effetto, come anche delle cruie incarcerate, nella passione iliaca, nei sommersi, ec. è stata conosciuta fino ai tempi di *Tommaso* BARTOLINO, corretta da *Federico* DEKERS, professore di medicina a Leida; *Andrea* GISSERO, medico d' Amburgo ne propose dei miglioramenti nell' anno 1686.; fu in seguito migliorata da MUSCHENBROECK e da ISNARD; più comoda la rese GAUBIO nei suoi *Adversarij* pubblicati nel 1771., e finalmente in questi ultimi anni furono immaginate nuove correzioni dal Sig. PIA; ed il Sig. GARDANE medico di Parigi fece eseguire la macchina inglese di BARTOLINO, con qualche diversità, come si vede nel suo libretto stampato in Modena nel 1775., trasportato dal francese col titolo di *Avvisi al popolo sopra le asfissie o morti apparenti e improvvise, contenenti i mezzi di prevenirle e di rimediarvi, colla descrizione di una nuova cassetta fumigatoria portatile*. Checchè però ne sia del merito di questa macchina e delle altre inventate a quest' effetto, per facilitarne l' uso in qualunque luogo e tempo, possono bastare due pippe usuali da tabacco, introducendo la cannetta di una dentro dell' ano dell' annegato; poi sopra l' orlo del camminetto acceso di questa porre l' orlo di un' altra egualmente accesa, e tenute ben unite, soffiare con forza nel cancello della seconda.

Gli esperti pratici consigliano però tutt' altro mezzo, anche negli altri casi, nei quali si vuole profittevole l' uso del fumo di tabacco, perchè più sicuro nell' effetto e scevro da molti inconvenienti.

Vedasi a questo proposito l' erudito libro del Sig. *Antonio Giuseppe* TESTA, *sulla morte apparente degli annegati* Firenze 1770.: *Il Tr.*

(c) Dassi ancora la idrofobia spontanea, la quale per lo più è sintoma di malattia acuta. SELLE domanda, se questa specie d' idrofobia è di natura eguale alla spontanea, e medesima anche la cura. Non è sufficientemente deciso dagli autori, a quale partito debbasi appigliare: *Il Tr.*



che si può fare di meglio , e ciò che ha salvato gli uomini stati morficati dal medesimo animale , per cui altri miserabilmente morirono , egli è di correre al più presto a doccia , per un pajo d' ore , la piaga sotto una doccia di fontana , da dove l' acqua zampilla naturalmente a grossi soffj , o sotto una tromba : si mantiene la piaga molto dilatata fino al suo fondo con piccole bacchette di legno ; allora l' acqua per la forza della caduta penetra , lava , e trasporta interamente il veleno . Ciò fatto , si lava diligentemente la piaga coll' aceto caldo , prendendo una doppia presa della mestura N.º 121. , oppure una o due dramme di triaca , soprabbeendo l' infusione di scordeo in sufficiente quantità per sudare abbondantemente . Si mantiene la suppurazione della piaga coll' unguento basilico unito ad un quarto di unguento egiziaco , prendendo internamente una tazza di acqua tiepida per tre giorni di seguito mattina e sera , con tre grani di foglie di bella donna polverata , e dieci grani di zucchero ; osservando per un mese il regolamento B. ; e non beendo che una grande quantità di decotto di radice di valeriana silvestre a ragione di un' oncia per ogni libbra di decotto , da colarsi per pannolino .

Se questi mezzi fossero stati trascurati , siccome le conseguenze della morficatura di animale rabbioso sono le più spaventevoli , non è mai inutile praticare tutto ciò , che può preservare ; e bisogna a tutto costo impedire , che il veleno non si diffonda . Se la piaga fosse in una falange , si amputerà il dito sul momento ; così se è praticabile , si faranno al più presto possibile , le incisioni fino sul vivo , in tutto il contorno della piaga e nel fondo ; oppure profonde scarificazioni ; e sì nell' un caso che nell' altro si applicheranno incessantemente ventose secche sulla piaga , fino a che elleno non attraggono più nè san-

gue, nè sferosità, bagnando allora generosamente tutto l'interno della piaga colla tintura di cantarelle, e cuoprendola, come anche la sua circonferenza alla larghezza di due dita, coll' impiastro vescicante N.º 63. animato dalla polvere di cantarelle.

Quando il vescicante avrà prodotto il suo effetto, si leva, e lo si rimette sulla circonferenza; medicando la piaga, mattina e sera coll' unguento basilico, unito ad un quarto d' unguento egiziaco, cercando di mantenere una copiosa suppurazione per una ventina di giorni. Il malato prenda nel medesimo tempo, ogni due ore un cucchiajo grande di aceto bezoartico (d), od in sua mancanza quello dei quattro ladri, soprabbeendo nella giornata per ciascuna presa una tazza del suddetto decotto di valeriana, ed al suo svegliarsi, come ancora nel coricarsi, la infusione di scordeo, in sufficiente quantità per eccitare l'umidore, da mantenersi stando a letto. Dopo quindici giorni dall' uso di questi rimedj, si dà per tre giorni consecutivi, la polvere di bella donna sopra descritta, accelerandone l' uso, se l'ammalato divenisse triste, e se fosse sorpreso da brivido, freddo alle estremità, ansamenti, piccole convulsioni, mali di testa accompagnati da strettezze ed ardore nella gola; e soprattutto se nel medesimo tempo comincia a rifiutare ed a temere le bevande prese dapprima senza difficoltà. In allora si deve invigilare attentamente, e starle dattorno colla più

Ff 4

---

(d) L'aceto bezoartico si fa con sei dramme per forte di radici d'angelica, di enola, d'imperatoria, di vincetossico, e di zedoaria; un' oncia per forte delle erbe di scordeo, di ruta e di salvia; mezz' oncia di bacche di ginepro, sei dramme di scorza di cedro. Il tutto minutamente tagliuzzato s' infonde in trentasei once d'ottimo aceto, e dopo alcuni giorni si esprima e si filtri l'aceto, e si conservi in vaso esattamente chiuso: *Il Tr.*

grande precauzione. Si prolunga l'uso della polvere di bella donna, accrescendo la dose di un grano per giorno, e se ciò fosse infruttuoso, si tenta la polvere della radice di bella donna a mezza dose, acquietando le agitazioni crudeli e spesso furiose, colle gocce anodine N.º 89., e queste sempre più a ragione del bisogno. I cibi sianò i più leggieri del regolamento B.; e frattanto ch'è può bere, si preferisca il decotto di valeriana.

Se questi rimedj riescissero inutili, e che il malato fosse in istato di prestarli alle frizioni mercuriali, si cerca di fargliele e di amministrarle secondo il prescritto per i mali venerei.

La sorte spaventevole di questi infelici è conosciuta: il quadro è orribile, ed è inutile di abbozzarlo. Importa però di avvertire, che l'uso di ammazzare sul momento gli animali domestici, che si sospettano arrabbiati, produce cattivissimi effetti. Il primo è, che la guarigione delle persone state morificate da una bestia cattiva ed ammalata, senz' avere la rabbia, sono per loro sicurezza condannate alla cura di chi è stato morso da animale rabbioso; se si omette di farla, un male molto fastidioso che ne nasce, si è la crudele inquietudine di coloro, che sono stati morficati, che altronde avrebbero risparmiata, se l'animale fosse stato assicurato, verificandosi con ciò che non era rabbioso.

Siccome vi resta della schiuma degli animali rabbiosi negli abiti stracciati, la quale è a temere, ancorchè la pelle non sia stata intaccata, si gettano immediatamente, o non se ne servi che dopo averli fatti passare più volte per lissivio (e).

---

(e) Vedi le mie osservazioni medico-pratiche sulla cura della rabbia, inserite nel giornale medico di Venezia, tom. IV., dove si trova fatalmente provata l'inutilità dei vantati specifici contro la idrofobia: *Il Tr.*



La morficatura della vipera non esige che sole embrocazioni coll'olio tiepido sulla piaga e su i suoi contorni, e per preferenza l'unzione col grasso di vipera, se ve n'è a portata; ed internamente per ventiquattr'ore, ogni tre ore, dieci grani di sale di vipera in un cucchiajo d'acqua tiepida, soprabbeendo infusione di scordeo, tanto che basti per sudare.

Il veleno del rospo si guarisce coll'embrocazione suddetta, ed internamente colla mestura bezoartica N.º 121. per un pajo di giorni mattina e sera, colla suddetta infusione.

Rispetto alla puntura degl'insetti, applicandovi sul momento un pezzetto di zolla di terra con erba appena svelta; questa terra umida applicata replicatamente sulla pelle previene l'infiammazione. L'olio produce lo stesso effetto salutare, come ancora le compresse inzuppate nel vino caldo. Ma se si fosse stato mal concio da uno sciame di vespe, di api, o di grossi moscherini; e che l'enfiagione fosse considerevole e resipelatosa, si salassa, e si rilascia la pelle col cataplasma ammolliente N.º 15., preferendo però il fomento risolvente ed anodino N.º 82., s'egli avesse vivi dolori.

La leggiera morficatura dell'ape, della vespa e del ragno non esige che una compressa inzuppata nell'aceto caldo. Rispetto agli antidoti per le diverse specie di veleno, che si trangugiano, siccome importa di celare al pubblico i nomi e la natura loro, basta il dire, ch'elleno sono distribuite in cinque classi. La prima comprende i veleni meccanici, i quali operano i loro funesti effetti a motivo di loro figura. Gli acidi minerali concentrati, formano la seconda classe. La terza è quella degli alcalini caustici tratti dai vegetabili e dagli animali; la quarta gli astringenti, gli ostruenti, i vischiosi

e terrestri; e la quinta finalmente comprende i narcotici (f).

(f) Fra il numero degli animali velenosi, i primi sono i serpenti: quello della vipera è riputato capace di ammazzare sul fatto. Egli è mirabile, che il veleno dei serpenti trangugiato riesce innocente, ed eternamente introdotto per ferita, è micidiale come cauto LUCANO

*Noxia serpentum est admixto sanguine pestis  
Morsu virus habent & futurum dente minantur  
Pocula morte carent .*

Fra gli animali velenosi è la tarantola, che è come specie di ragno, della Puglia, la quale al dire di molti autori, e specialmente di BAGLIVIO, produce grandissimi sintomi. Subito dopo la morsicatura, il luogo morficato si gonfia, s'illividisce, s'infiamma; ne segue difficoltà di respiro, lipotimia, stupidità dei sensi, aspetto triste, voce lamentevole, e l'ammalato col dito indica il petto quasi per mostrare, che il cuore è ammalato. Allo strepito musicale, ad un qualunque stromento, gli ammalati, apoplefici, ed avviliti, cominciano a muovere le mani ed i piedi; poi si alzano, e ballano e saltano per alcune ore, con oscene agitazioni del corpo, e particolari movimenti, con alienazione della mente: La musica è per loro il più sicuro rimedio; in fatti dopo questi strani movimenti si pongono a letto, perchè possino sudare. Dopo qualche tempo si replica la stessa scena, e ciò per tre o quattro volte. Se la musica non è pronta, la morte ne segue prestissimo. *Vedi opuscoli scelti, tom. II. ann. 1779., pag. 222. e 336.*

Le cantarelle ancora sono state in ogni tempo riconosciute velenose. COSSINO cavaliere romano morì da una bevanda di cantarelle. BOERHAAVE dice che i sintomi di questo veleno sono una erosione dalla bocca fino alla vescica, un alito con sentore di resina di cedro o di altra simile sostanza; le urine vengono o con bruciore violento, od a goccia a goccia, rosse, poi sanguinolente, con incomodissimo priapismo; nasce una violentissima febbre, ed uscite di corpo quali di persona disenterica: le cantarelle nuociono tanto internamente quanto eternamente.

Anche la salamandra, animale freddissimo, comune in Italia, è velenosa, producendo vomito, tumidezza della lingua, con torminosi deiezioni.

Fra i veleni animali puossi riferire le uova del pesce balbo e del luccio, soliti a produrre mortale collera.

Le uova di gallina ancora putrefatte non lasciano di essere destrepure velenose al dire di BOERHAAVE, producendo nausea, vomito, sete, febbre, tormini, diarrea, ed un alito ributtante di vero nuovo infracidato.

Finalmente fra i veleni degli animali si comprende anche quello del sangue menstuo, il quale per asserzione degli antichi, bevuto dai cani porta loro la rabbia, per cui mordono con insanabile veleno. Si dice ancora che l'uomo dopo avere trangugiato questo sangue subitanamente muoja, o tale almeno è l'asserzione di ERODOTO, di STRABONE, e di DIODORO.

*Cura dei veleni meccanici.*

Quelli sono dichiarati incurabili, se dopo avere inghiottito un pajo di libbre d'olio, non possono con un vomitivo rimetterli sul momento, innanzi che si siano insinuati nelle membrane e piegature dello stomaco e degl'intestini. Ciò è, che si deve prevenire tanto più sollecitamente, quanto che la loro materia sarà più compatta, più dura e più lacerante. Perso questo momento non rimane che sollevare i malati; ed in questa triste circostanza, deggiono bere molto latte, e molti cucchiaj d'olio; sostenerli con cibi grassi, oleosi, e con pappe di latte: affine di renderli meno sensibili al dolore si esibiscono, più o meno a ragguaglio della forza della spasmodia, una doppia o triplice dose delle gocce anodine N.º 89., le quali riescendo poco efficaci, si danno alla sera due grani di laudano.

---

Rispetto al veleno della vipera è stato detto, che l'olio d'ulivo applicato sulla parte morsa, era il suo pronto specifico; ma il fatto sta, che nè in Francia nè in Italia fu riconosciuta abbastanza valevole questa sua virtù; che per altro ne dica a suo favore il celebre chirurgo di Lione POUTEAU. Più sicuro rimedio contro il morso della vipera è l'acqua di Luce presa a qualche goccia in adattato liquore e con essa pure lavando la ferita, in cui mancanza si sostituisce lo spirito volatile di sale ammoniaco, di corno di cervo, il sal volatile di vipera, ec.: ottimissimo espediente per impedire l'insinuazione del veleno, è quello della legatura, fatta al di sopra della ferita, qualora la parte ne sia suscettibile: legatura che non dev'essere nè troppo leggiera nè troppo violenta; nel primo caso divenendo inutile; nel secondo potendo enfiare ed infiammare il braccio, come fu avvertito dal latinissimo CELSO. *Suor vulnus id membrum deligandum est, ne tamen nimium, ne vehementer torpeat.* Più della legatura si reputa giovevole la scarificazione delle ferite, le sopraposte coppette, ed il fuoco subito dopo la occorsa disgrazia: *Il Tr.*



*Cura dei veleni acidi.*

I veleni acidi producono principalmente ardori crudeli allo stomaco, cardialgia e vomiti di una materia acida e caustica, con susseguente singhiozzo, motti convulsivi, infiammazione e cangrena allo stomaco.

Per indebolire più prontamente questa specie di veleno, si uniscono gli alcalini ai rimedj generali proposti per i veleni inghiottiti. Il malato bea incessantemente molte giare d'acqua tiepida con stemperato un pezzo di sapone al volume di una noce moscata sopra una mezza libbra d'acqua; ed ogni quarto d'ora, sei grani di sale d'assenzo alcalino o di sale di tartaro in un brodo, non prendendo nè latte, nè aceto, nè mistura bezoartica; e per calmare i dolori colici, convengono ogni ora i lavativi d'acqua di linseme, colla giunta di una mezza dozzina di cucchiaj d'olio d'ulivo.

Cessato il vomito, si dà ogni ora la polvere assorbente N.º 169. in una tazza d'acqua tiepida, purgando al più presto possibile con due once di manna, ed altrettanto di olio di mandorle dolci, diluiti in una tazza di brodo. Finito l'effetto della purga, si porge un po' di triaca, del volume di una fava; e l'nominato lassativo si replica un pajo di volte, di tre in tre giorni, e nella medesima maniera.

*Cura dei veleni alcalini.*

I veleni alcalini producono immediatamente ardore in gola e nello stomaco, e calor grande nelle viscere con inestinguibil sete e febbre ardente. Oltre i rimedj indicati per i veleni inghiottiti in genera-

le, questo caso esige, che per rintuzzare i sali alcalini, si diluisca in ciascun bicchiere d'acqua tiepida, che 'l malato berà per facilitare i vomiti, un cucchiajo d'ossimele semplice, prendendo inoltre molto osicrato, latte spanato, od acqua d'orzo sensibilmente inacidita con sugo di cedro, aceto, spirito di vitriuolo, o di zolfo, non omissi i lavativi come sopra; ed il tutto essendo acquietato, l'infermo prenderà il siero di latte tamarindato N.° 148.

*Cura dei veleni viscidì, terrestri ed astringenti.*

Questa specie di veleno opera lentamente: produce languore, sensi quasi permanenti di colica, affezioni paralitiche, ec. Se colla polvere emetico-lassativa N.° 165., più volte replicata, non che con il lungo uso dell'elisire attenuante N.° 56., e di sapone bianco in pillole, da prendersene venti grani ogni due ore, non si prevengono questi effetti, in tutti i casi di ostinatezza, converranno le acque termali fondenti, saponacee, e purgative N.° 3.

*Cura dei veleni narcotici .*

I veleni narcotici, dopo avere instupidito l'ammalato, ordinariamente producono nausea ed anfastimenti; poco dopo il sopore interrotto da particolare delirio, per cui ride, canta, danza. A questi sintomi succedono il furore, le convulsioni ed una tragica morte, che non pare presumibile essere l'effetto di una droga, la quale presa ad una certa dose, acquieta i dolori più crudeli. Se avvi luogo a sospettare, vi sia tuttora una porzione di narcotico nello stomaco, e negl'intestini, si purga tosto colla polvere emetico-lassativa N.° 165.; nel caso contrario si salassa, beendo in seguito ogni quarto

d'ora una tazza di osirato caldo , od un pajo di cucchiaj di sugo di cedro, unito ad una doppia dose di acqua , non lasciando di scuotere l'ammalato , d'inumidire interrottamente le tempia ed i polsi coll' aceto ; e s' ei fosse inclinato alla diarrea , di dare molto siero di latte tamarindato N.° 148.

La mistura contro la rabbia N.° 157. aveva acquistata molta riputazione tanto per guarire gli uomini , che gli animali morsicati da bestie rabbiose . Ma questo rimedio, siccome il cinorrodon degli antichi , non che molti altri pubblici o secreti, sono caduti nell' oblio , senza dubbio per non essersi sostenuti alle prove .

## DEI SOMMERSI .

**N**Ei paesi, dove vi sono laghi e fiumi , nasce frequentemente per naufragio o per altro accidente , che alcuni disgraziati si affogano , e sono cavati dall' acqua senza dare alcun segno di vita . Molti si sono riavuti facendo immediatamente, quanto si dirà in appresso .

Si trasporteranno questi infelici in una camera calda avvicinati ad un buon fuoco , nudi e coricati sul dorso sopra materasso riscaldato , girandoli e rigirandoli per presentare tutta la superficie all' ardore del fuoco, e fregando incessantemente con panilini ben riscaldati , le estremità dal basso in alto . Uomini forti faranno passare , bocca a bocca , o per un cannello il loro alito caldo nel polmone dell' annegato : di tempo in tempo introdurranno nella sua gola un cucchiajo di vin caldo od anche di acquavita . Si terranno tutte le parti del corpo, il petto ed il basso ventre soprattutto , ravvolte in coperture replicatamente riscaldate al fuoco , lavando le tempia ed i polsi con acque spiritose , e ponendo



a fiutare qualche spirito volatile, siccome quello N.º 75., di cui cercheràssi di fargliene trangugiare qualche cucchiajo da caffè.

Ma siccome lo stato fisico dei sommersi ha molta relazione con quello dei soffocati dai veleni inspirati, si applicheranno molti lavativi di fumo di tabacco; od in mancanza degli stromenti necessarij si faranno reiterate iniezioni nell' ano del decotto di tabacco, come per il veleno inspirato; ed introducendo nel podice il becco di un soffietto, riempito, dilatandolo di fumo caldo di tabacco abbruciato sulla bragia, da usarsi un momento dopo ciascun lavativo di decotto di tabacco, per così dilatare gl' intestini, e mettere in movimento il diaframma.

Dacchè si rileverà il più piccolo movimento nel respiro, si raddoppieranno tutte queste cautele: il polso comincerà ben presto a battere, e l' annegato ritornare in vita. Allora si salasserà dal braccio, e si continuerà a fregarlo, riscaldarlo, ed eccitarlo fino a che abbia ripreso cognizione, rianimandolo con qualche sorso di vino caldo, e poco dopo con un brodo. A questo modo si sono risvegliati molti sommersi, stati per più ore senza il menomo segno di vita; e questo medesimo metodo servirà per coloro, nei quali il freddo non avrà ancora agghiacciato la massa del sangue.

### DELLE MALATTIE CUTANEE.

**L**E malattie della pelle inquietano e rendono impazienti: si vuole guarire a tutto costo, e con questo precipizio, si espone a gravissimi mali, ond' è che non bisogna sdegnare di farne menzione.

*Ribollimenti .*

Si chiamano ribollimenti, i bottoni le macchie cutanee, che appajono subitamente senz' altro sintoma alla superficie del corpo, rassomiglievoli alla morsicatura del pulce, dei moscherini, non che delle vescichette che si alzano pel contatto delle ortiche. Questi ribollimenti appajono o su tutta la superficie del corpo o sopra alcune parti soltanto; durano poco; si dissipano senza o con pizzicore; ritornano facilmente, e non gettano nè sierosità, nè materie.

Questa malattia non elige altre cautele, se non quella di starsene tranquillo in un luogo temperato e di favorire la traspirazione, cuoprendosi a dovere, e beendo di tempo in tempo qualche tazza di fiori di sambuco. Se non pertanto si facesse famigliare, i pletorici si faranno salassare, e tutti prenderanno una diecina di bagni domestici tiepidi, e dopo essersi purgati colla bevanda minorativa N.º 168., per quindici giorni, il siero di latte, e nel primo bicchiere un cucchiajo di siroppo di summosterno.

*Prurito .*

Il prurito è cagionato qualche volta dall' acrimonia della massa linfatica, e più soventi perchè le materie della perspirazione, soggiornando negli emontorj della pelle, s' inagriscono e producono, colla rarefazione cagionata dal calore del letto, e quando si riscalda, pungimenti e pizzicori, che frizzano ed inquietano, tanto che non si può lasciare di fregare la parte affetta (a). Allora soltanto nasce un  
tra-

---

(a) Il prurito è benissimo definito essere una cosa mista di diletto

trasudamento linfatico fra la pelle, e negl' intervalli, non vi si osserva nè rossore nè bottone. Questo male, quando è inveterato, è dei più ribelli.

Il prurito generale, che è ancora recente, si guarisce col salasso, coi bagni, e col siero di latte, indicati per la precedente malattia, da continuarsi lungamente. Al sortire dal bagno, si prende, essendo a letto, trenta gocce di zolfo dorato d'antimonio liquido, soprabbeendo sufficiente quantità d'infusione di scorza di sassafrasso, per eccitare e mantenere una dolce traspirazione per un pajo d'ore, fregandosi dopo con una salvietta profumata di zolfo.

Se per lo contrario il prurito fosse invecchiato, i malati prenderanno, dopo il salasso, ed una quindicina di bagni domestici, per quindici giorni il decotto lassativo dei legni N.º 24., in dose sufficiente per iscaricare tre o quattro volte in venti-quattr' ore, e nel medesimo tempo, nel coricarsi, mezza dramma dell' elettuario correttivo del sangue N.º 53. Se al fine di una quindicina di giorni, il prurito fosse molto cessato, continueranno questi rimedj fino a perfetta guarigione, prendendo in seguito per un pajo di settimane, il latte di capra per assicurare la guarigione; si farà scorrere sulla pelle, mattina e sera, una spugna inzuppata nell' acqua vegeto-minerale tiepida di Goulard. Le persone nelle quali il prurito incomoda soltanto una piccola parte del corpo, la ugheranno, mattina e sera colla pomata di Saturno di Goulard.

Quantunque di rado accada, che il prurito generale dipenda chiaramente e puramente dall' una •

Tom. I.

G g

---

letto e di consumamento: il celebre LORRY riferisce il prurito alle leggieri infiammazioni; e dice che trae tante volte origine dalla quantità cruda degli alimenti. *De morbis cutaneis: Il Tr.*



dall'altra acrimonia del sangue summentovate , ciò nulla ostante, avanti di praticare i suddetti rimedj , si prenderanno i lumi necessarj su questo proposito per regolarli conseguentemente.

La prurigine al perineo assale ordinariamente le borse , e si fissa ostinatissima al podice : dipende comunemente dal sangue emoroidale intercettato . Ella è comune nelle persone di una bile acrimoniosissima , ed è non solo la più fastidiosa , ma anche la più ostinata . Applicherassi nel primo caso, prima di prendere i suddetti rimedj , le mignatte ; e nel secondo, si rimedierà all'acrimonia biliosa, cogli' insegnamenti dati a questo proposito ; e nell'uno e nell'altro di questi casi , si prenderà in seguito, per più mesi , mattina e sera , il decotto della seconda scorza di olmo, in proporzione di un'oncia e mezzo per una libbra di decotto (b) .

Il prudore dei fanciulli si guarisce , dopo la purga replicata di manna , colla polvere N.º 181. , di cui ne prenderanno una presa mattina e sera , per otto giorni .

Quello dei vecchi , e delle persone decrepite , richiede le secche frizioni , gli alimenti ristoranti , ed i sudoriferi cordiali , siccome il sale di vipera alla dose di venti grani , soprabbeendo l'infusione di scorza di sassafrasso .

Nell'itterizia , il prurito non cessa, se non quando la bile riprende il suo corso naturale ; e non vi sono che i bagni tiepidi , che lo diminuiscono .

Se dopo l'uso dei rimedj indicati , il prurito non fosse che calmato, si porteranno per molto tem-

(b) La scorza del' olmo era usata dagli antichi applicata verde sulle ferite . FALOPPIO se ne serviva per riunire le carni : in oggi si costuma per fare decotto nella scabbia, nello scorbutto, nell'idrope ascite , ec. : *Il Tr.*

po le camisce lavate in un decotto di zolfo, e perfumate ancora con zolfo, oltre l'uso interno ed esterno delle acque termali sulfuree.

*Ruidezza, escoriazione, e ragadi.*

La ruidezza, l'escoriazione, e le ragadi o crepacci della pelle si conoscono facilmente. Questi mali quando sono recenti, si guariscono coll'unzione sulle parti affette della pomata raddolcente N.º 161., o coll'olio di cera rettificato, da rinnovarsi mattina e sera. Se a questi vizj della pelle si unisce un trasudamento d'umori, si usa, alla sera, la pomata rossa N.º 162.

Allorchè questi mali sono inveterati, la pelle diviene callosa, ed allora bisogna cominciare dall'ammolirla col vapore d'acqua bollita con molta crusca, da replicarsi più volte al giorno, per lo spazio di un quarto d'ora, ricevendo questo vapore più caldo che sarà possibile. Negl'intervalli si applicherà il cataplasma ammolliente N.º 15., e dissipate le callosità, si useranno i rimedj sopra descritti.

*Lentigini (c).*

Allorchè questo vizio della pelle sarà recente, guarirassi coll'applicare sulla faccia, durante la notte, e per più giorni e sere, di seguito, la chiara d'uovo, con un pezzo d'allume, riunito assieme sopra un

Gg 2

---

(c) La lentigine o lintigine che si voglia dire, è una macchia simile alle lenti, che si diffonde particolarmente sul viso. Persistono queste macchie anche nei cadaveri. Sembrano dipendere da un muco tenace concreto. LORRY dice essere impossibile la cura delle lentigini; e che, se ne sono suscettibili, si deve ripetere dagli ammollenti. AVICENA voleva che si curassero coi rimedj interni: *Il Tr.*

piatto di majolica, fino a che sia ridotto spumoso, e lavandosi all'indomani coll'acqua stillata di sperma di rane, o di fiori di fave.

Ma se questo vizio fosse inveterato, si fragheranno le lentigini, nel coricarsi, coll'unguento cosmetico N.º 134., lavandosi all'indomani, come si è detto più sopra; e se coll'uso di questi rimedj continuati per quindici giorni, le lentigini non cominciassero a sparire, se ne abbandonerà la risoluzione, innanzi che arrischiare altri rimedj egualmente incerti che pericolosi. Migliore precauzione per indebolirle, farà di guerentirsi dal sole e di fumigare il volto, nel portarsi a letto, col vapore di parti eguali di acqua e di aceto bollenti. Si possono ancora fregare dolcemente le lentigini con una fetta di cedro sucofo.

#### *Macchie epatiche (d).*

Le macchie epatiche sono superficiali e di un giallo molto fosco. Elleno appajono sul petto, sul collo, sul dorso, e sono spesso più grosse che il palmo della mano. Si cuoprono di una farina sottile, ed accagionano il prurito.

Se si vuole sbarazzarsene, si avrà la precauzione di farsi salassare in primavera, ed in autunno, purgandosi in seguito un pajo di volte, ogni otto giorni, col decotto lassativo N.º 30., ed unguendo le macchie, mattina e sera, assai leggermente, colla pomata rossa N.º 162., locche non riuscendo, prenderassi per alcune settimane i brodi antiscorbutici N.º 9.

---

(d) Chiamate anche efelidi epatiche, proprie tante volte delle fanciulle difficilmente menstruant, delle persone emoroidarie, e di coloro, che soffrono mali di fegato. PLENCK. *Doctrina de morb. cutaneis*: Il Tr.



*Efelidi.*

Le efelidi sono macchie somiglievoli alle precedenti: elleno sono proprie al sesso, e più particolarmente alle donne incinte, ed alle figlie opilate: invadono per lo più la faccia. Queste macchie non sono farinose, nè pruriginose. Si dissipano come le lentigini, e se ne liberano le figlie opilate, guarendo dall'opilazione, col modo insegnato, parlando delle malattie del sesso.

*Vitiligini.*

Si chiamano vitiligini tutte le macchie della pelle con poca o nissuna sensazione, ordinariamente frammezzate da strisce di colore naturale della pelle. Quando queste macchie sono bianche, la pelle essendo alcun poco rilevata, e coperta di piccole scaglie, che cadono difficilmente colla fregagione e che rinascono in seguito, si chiamano *albos* o *morfea bianca* (e); se sono fosche o nere, portano prurito, quando si riscalda, e chiamansi *morfea nera* o *mela*. La quarta specie comprende quelle macchie, che sono un po' rialzate insensibili, e di colore azzurrognolo.

Se queste diverse specie di macchie sono recenti, si dissipano col decotto dei legni lassativo N.º 24., e coll' elettuario correttivo del sangue N.º 53., preso come si è detto per il prurito, e continuati per quindici giorni, conducendo nel medesimo tempo mattina e sera su queste macchie il vapore di parti eguali d' acqua e di aceto bollenti: dopo ciascuna

Gg 3

---

(e) *Lepra maculosa alba*. VOGEL: *dissert. de vitiligine*: Il Tr.

fumigazione, si ugnono quelle macchie elevate, leg-  
giermente colla pomata rossa N.º 162., e le altre  
coll' unguento cosmetico N.º 134.

### *Leuce (f).*

Il leuce fa una macchia bianca infossata, per-  
fettamente insensibile, e che non tramanda sangue,  
anche forata con un ago: le sue radici sono assai  
profonde, non cangia colore anche sotto forte fre-  
gagione, e vi nascono sopra peli bianchi simili  
alla lana.

Si guarisce difficilmente dal leuce (g). Se si vuole  
tentarne la guarigione, si cerca immediatamente di  
ristabilire il circolo, e la sensibilità della parte af-  
fetta, applicandovi un vescicante: in seguito tentasi  
di consumare il leuce, toccandolo un pajo di vol-  
te al giorno coll' olio di tartaro per deliquio, op-  
pure colla suddetta pomata rossa, locche non bastan-  
do, non vi farà altro espediente per levarlo, che la  
pietra infernale usata da capace chirurgo; e quando  
questi differenti topici portassero irritazione, si ab-  
bandoneranno.

### *Gotta rosacea (b).*

Quando la gotta rosacea del volto è recente, si  
toglie col salasso, con una diecina di bagni dome-

(f) Il leuce è malattia fra noi rarissima; di essa non ne par-  
lano che gli antichi scrittori; e Paolo d'EGINA ed AEZIO l'hanno di-  
chiarata col nome di varice: ella riconosce le stesse cagioni, epperò  
i medesimi medicamenti della lepra; ed in fatti quand'è trascurata,  
degenera in lepra. GRUNER. *Antiquitates morborum*, p. 157.: *Il Tr.*

(g) *Leuce vix, vixque remediis tollitur: ad ossa usque afficit.*  
WEBER, *de causis, & signis morborum*: *Il Tr.*

(b) La gotta rosacea si conosce dalle macchie rosse della faccia,  
a forma di goccioline, poco prominenti od aspre, ed ostinate: *Il Tr.*

fici , e col latte tamarindato preso per alcune settimane , lavandosi la faccia mattina e sera , coll' acqua di sperma di rane con un sesto d' aceto distillato .

Se vi fossero delle pustole fra la gotta rosacea , si ugneranno alla sera colla pomata di Saturno di Goulard , o molto leggiermente colla pomata rossa , quando i bordi delle pustole faranno duri e come callosi . Questi mezzi non riuscendo , si beranno le acque minerali rinfrescanti : in estate si osserverà il regolamento rinfrescante della lettera D. , e nelle altre stagioni quello della lettera F. , evitando tutto ciò , che riscalda ed agita il sangue , siccome il caffè , i liquori , ed annacquando molto il vino .

### *Zaffiri .*

I zaffiri sono tubercoli della grossezza del seme di canape . Restano assai lungo tempo rossi e duri , ed imbianchiscono sulla cima . Questi bottoni suppurano lentamente ; ed invadono per lo più il naso , la faccia ed il collo .

Se ne toglie la cagione col salasso , coi bagni e col siero di latte tamarindato indicati per la gotta rosacea . Si previene l' alzata di queste pustole , fregandole subito dapprincipio , un pajo di volte al giorno con una fetta sucosa di cedro ; e se il bottoncino fosse di già formato , bisogna farlo suppurare coll' impiastro diaquilone colle gomme . Per prevenire i ritorni di queste pustole , si lava mattina e sera la faccia coll' acqua fredda , avvalorata da un dodicesimo d' aceto distillato .



*Erpeti (i) .*

Gli erpeti sono volanti , o permanenti , secchi , o corrosivi . La prima specie forma una macchia secca , bianca o rossiccia , pertugiata di piccoli grani , qualche volta appena percettibili . Queste macchie cagionano prurito , e fregandole ne trapela un po' di umore acre . Questa specie non si estende molto ; svanisce e ritorna in altro luogo .

L'erpete secco rassomiglia molto al volante , ed è meno rossiccio ; si estende dippiù , ed i grani alzati si seccano prontamente ; diventano farinosi , cadono in scaglie piccole , ed a misura che i primi grani spariscono , altri ne spuntano . Questa specie è accompagnata da accessi di prurito , che involontariamente obbligano a graffiarsi ; ed allora ne trapela un po' di sferosità , molto mordace , densa , che forma prontamente delle pellicole , sotto le quali la pelle s'infiamma con facilità .

L'erpete rossicchiante od esedente è spesso la conseguenza dell'erpete secco . Si distingue da piccole ulcere superficiali , ineguali , e pertugiate di piccoli fori , dai quali ne stilla molta sanie , o limpida o di un giallo fosco o rossiccio . Egli è accompagnato da leggieri infiammazioni alla pelle . La circonferenza è quasi sempre livida , e rossicchia la pelle al segno , che degenera in ulceri , i quali si estendono con superficie livida e con labbri callosi (k).

(i) Gli erpeti sono volgarmente chiamati , fals , derbie , o zerbite : *Il Tr.*

(k) Gli erpeti , principalmente quegli umidi esedenti sono contagiosi , ed i fanciulli più facilmente si comunicano questo male , co' baci , o strofinamenti , ec.: *Il Tr.*

*Cura degli erpeti volanti.*

L' erpete volante nasce per lo più alla faccia ed alle mani . Si diffipa facilmente, se è nato di fresco , e sia piuttosto un vizio della pelle che del sangue, umettandola coll' aceto di litargirio, od in sua vece con inchiostro o sugo di cedro (1). Se invece l' erpete fosse invescchiato , o che dopo essere stato distrutto, ne nascesse un altro altrove, bisogna esplorare il vizio dominante negli umori, che ordinariamente farà l' acrimonia biliosa, scorbutica, od un residuo di celtico veleno imperfettamente distrutto. Nel primo caso si rimedia secondo l' indicato all' articolo dei vizj e delle acrimonie del sangue, e nel secondo, cogli specifici per la cura delle malattie veneree.

Nel caso che non si trovasse vizio dominante negli umori, l' ammalato, dopo la purga colla pozione lassativa N.º 166., prenda alla mattina per un mese, due libbre di siero di latte, e sempre nel primo bicchiere, quattr' once di sugo depurato di fumo sterco. Nel caso della inutilità di questi rimedj, dopo il salasso e le ventose scarificate, poste d' intorno alle circonferenze serpiginose, l' ammalato prenda una diecina di bagni domestici tiepidi, la cui acqua sia riscaldata con decotto fatto con una libbra di radice di lapazio, e mezza dozzina di manipoli di foglie della medesima pianta, usando in

---

(1) Quando l' erpete non è che un vizio della pelle, basta le tante volte bagnarlo colla propria saliva, come già suggerì Q. SERENO ne' seguenti versi

*Si vero est vitium, quod ducit ab impete nomen,  
Hoc manulina poteris exhibere saliva.*

seguito per quindici giorni il decotto lassativo N.º 24. e l'elettuario N.º 53., stando ai regolamenti descritti sotto le lettere B. ed F.; ungere leggiermente l'erpete, per due giorni di seguito, mattina e sera colla pomata rossa N.º 162.; eppoi con quella di Saturno del Goulard; disseccato finalmente, tenerlo coperto con pannolino profumato di zolfo.

*Cura degli erpeti secchi.*

L'erpete secco invade spesso il perineo, lo scroto, le braccia e le cosce: convengono le medesime perquisizioni sopra nominate, per iscoprire il vizio dominante del sangue; e dopo avervi rimediato, persistendo ancora la malattia, si fa, quanto fu ordinato per l'erpete volante inveterato; locche riuscendo affatto inutile, conviene il decotto di scorza d'olmo, annunciato per il prurito, e nella state i bagni d'acque termali, la cui efficacia è assicurata dalla sperienza: tali sono i bagni di Schinznach nel cantone di Berna e le acque di Loesch in Valais. Siccome egli è pericoloso di ripercuotere l'umore erpetico, conviene limitarsi ad inumidire spesso le serpighi coll'acqua di solatro strigio (*m*) distillata, e richiedendolo la mordacità od il gonfiamento, i fomenti risolventi ed anodini N.º 82.

L'erpete rosicchiante porta il medesimo esame e gli stessi rimedj generali che il precedente, da continuarsi, quanto più il male sarà inoltrato o considerevole. Rispetto alle applicazioni esterne, vogliono essere variate giusta lo stato dell'erpete: La durezza dei labbri esige di ammolirla col cataplasmo

---

(*m*) Volgarmente chiamato erba morella, ossia *Solatrium Sulcatum* del LINNEO: *Il Tr.*



ammollitivo N.º 15., e di applicare sulle ulcere callose piুমacciuoli investiti dalla pomata rossa N.º 162., servendo essa ad attenuare le materie glutinose e tenaci; ed il cataplasmo di mollica di pane bianco, ed acqua vegeto-minerale del Goulard canforata, calmerà l'infiammazione, e dissiperà le congestioni serpiginose.

Quando si potrà credere distrutto il vizio erpetico, fomentasi l'erpete, fra 'l giorno, coll'acqua vegeto-minerale, tiepida, e la sera si unge coll'unguento di Saturno del Goulard, fino che la pelle sia bene ristabilita, e abbia preso il suo colore naturale.

Gli erpeti entrano nel numero degli scogli della medicina. Non si guariscono tante volte, appunto perchè si trascura di ricercare e di correggere l'acrimonia del sangue; e quand'essi sono molto invecchiati, distruggono siffattamente il tessuto della pelle, che sussistono ancora dopo la correzione degli umori.

L'esperienza ha provato, che affezioni serpiginose, bottorute, ed erpeti farinosi con trasudamento, refrattarj a tutti i rimedj usati, sono qualche volta stati distrutti col lungo uso dello spirito dolcificato di vitriuolo, preso giornalmente dalle persone adulte, in diverse bevande, a ragione di due dramme, in due libbre d'acqua comune, raddolcito collo sciollo di lampone, o di aranci, accrescendo appoco appoco la dose dello spirito e dell'acqua, alla quantità che l'ammalato possa sopportare, presa in parte prima ed in parte dopo i pasti a stomaco vuoto.

Se nella cura degli erpeti, non si fa precedere ai rimedj esterni quegli interni convenienti per correggere la massa degli umori, si rinchiude, per così dire il lupo nell'ovile, e ne risultano cattivi accidenti.

Se gli erpeti si fissano sulla faccia o sulle mani,

cercaſi immediatamente , per prevenire , che non ſi diſtrugga il teſſuto della pelle , ed i cattivi effetti che ne ſeguirebbero , di attrarre l'umore al braccio con un veſcicante , che ſuppurì lungamente . In allora ſi poſſono eſſiccare queſti erpeti , uſando inceſſantemente il già preſcritto per diſtruggere l'umore erpetico .

Le perſone incomodate dagli erpeti già da gran tempo , faranno bene , dopo eſſerſene liberate , di farſi fare un cauterio ; e quando ſi ſaprà che riſcono in certe ſtagioni , ſe ne preverà la recidiva col ſalaffo , con alcuni bagni domeſtici , e per otto giorni col decotto di legni laſſativo e coll'elettuario ſopra enunciato .

Il latte d'aſina , ed i brodi di teſtuggine , per le perſone deboli , e ſpogliate di ciò che ſi chiama baſſamo del ſangue ; i brodi di vipera nella decrepitezza , e per le perſone di coſtituzione ſecca ; l'uſo continuato del ſiero vaccino , ſolo od unito a parte eguale di tiſana di china dolce , raddolciranno e diminuiranno l'umore erpetico .

Si ſono diſſipati erpeti oſtinati con una lunga febbre quartana , o con altre malattie , le quali avevano obbligato l'infermo ad uno ſtretto modo di vivere , o che erano ſtate accompagnate da copioſe evacuazioni e principalmente dal ſudore .

I biſolchi ſvizzeri , i quali nell'inverno vivono di cacio , e di carni affumicate e ſalate , comunemente verſo la primavera ſono preſi dagli erpeti . Sulla montagna il ſiero vaccino è la loro bevanda ordinaria , ed il latte il loro principale nutrimento . Queſto metodo e l'aria pura alpina diſſipano i loro erpeti ; e ſiccome ſarebbe facile di unire a queſto regolamento , i bagni di ſiero di latte , egli è probabile , che a queſto modo ſi guarirebbero radicalmente le perſone affette da erpeti non venerici .

*Scabbia in generale .*

La specie di rogna meno incomoda e più facile a guarire , è chiamata benigna , e quella di opposto carattere , è conosciuta sotto nome di scabbia ferina (n) . Avvi una specie di scabbia , la quale è sicuramente prodotta da visibili insetti , che i bagni delle acque sulfuree , e le frizioni coll' unguento grigio distruggono , senza che abbia bisogno di altri medicamenti (o) .

---

(n) Questa è una distinzione già fatta da CELSO , il quale distingue la scabbia , in scabbia semplice e l'altra in feroce , ossia con termine greco *aypiar* : *Il Tr.*

(o) Io credo , si possa benissimo dividere la scabbia in esterna ed interna . La scabbia esterna sia quella distinta dal REDI una morficatura o rosicchiatura pruriginosa , e continua fatta nella cute de' nostri corpi „ da certi pellicelli o bacolini “ onde per le minime aperture di essa cute trasudando qualche porzione di siero , o di linfa , vengono a farsi le bollicelle acquajole , dentro le quali , continuando quei bacolini la solita rosicchiatura , son forzati gli uomini a grattarsi , e nel grattarsi avanzandosi lo struggimento , ed il prurito rinforzano la fastidiosaggine dell' opera , e rompono non solamente le bollicelle acquajole , ma ancora la cute stessa , e qualche minutissimo canaluccio di sangue ; il perchè ne avvengono pustule , e scorticature crostose , ed altri simili fastidj . Ciò premesso viene a proposito ciò che lo stesso illustre scrittore propone , che la vera regola si è di rimediarvi subito nel bel principio per via di lavande rannose , di bagni , di unzioni composte con sali , zolfi , vitriuoli , mercurj semplici , precipitati , e solimati , e con altre robe di questa fatta corrosive e penetranti , perchè esse vagliono infallibilmente ad ammazzare i pellicelli intanati anche nelle più riposte loro grottecelle , e laboranti della cute . Ma non si può dire lo stesso della scabbia interna , la quale dipende da un vizio negli umori , quantunque non si possa sino ad ora decidere in che consista questa cagione prossima della rogna , chiamandola il celebre LORRY un veleno *sui generis* , ed il de MEZA uno specifico miasma forse di natura acida ; e che veramente la scabbia qualche volta vizia gli umori , e sia malattia interna , si deduce dai mali pertinaci svaniti , coll' avere richiamata la scabbia , perchè appunto nati dall' essere stata con forzosi rimedj intempestivamente distrutta , e retrocessa : quante volte la scabbia non riconosce per sua principal cagione una cacochimia scorbutica , o venerea ? Quante volte non è cessata l' epilessia , l' atiritide , ec. , coll' apparizione della scabbia ? Ottima diviso-



*Scabbia benigna.*

La scabbia benigna è umida o secca, e quest'ultima è comunemente più incomoda e più ostinata che la prima. L'una e l'altra specie di scabbia benigna si manifesta dapprincipio quasi sempre alle mani ed agli interstizj delle dita, e di là si spande per tutto il corpo. Si nell'un caso che nell'altro le pustole sono separate, e per lo più assai lontane le une dalle altre. Nella scabbia umida, elleno si alzano assai prontamente alla grossezza circa di un pisello, e dopo essere suppurate, scoppiano e si vestono di una crosta gialla circondata da un bordo rosso o livido.

Nella scabbia secca, le pustole che si vedono in quella umida, sono sostituite da piccoli bottoni duri e molto rossi, stillanti solamente un po' di sanie per lo più colorata di rosso. Le croste che succedono, sono del medesimo colore; e questa specie di scabbia è accompagnata da ardore e prurito, altrettanto più fastidiosi, quanto le pustole sono piccole e secche.

In ambo i casi conviene purgare l'ammalato

ne è quella ancora di PLENCK (*doctrina de morb. cutan.*) 1. in scabbia acquisita: cioè a dire contratta per contatto, o per concubito, ec.: 2. in spontanea; ossia prodotta da sporcizia, dall'abitare luoghi umidi, dal cibarsi di cose acide, false, pingui: 3. in critica; cioè spontaneamente nata nelle malattie acute, o croniche: a questa classe appartiene la scabbia menstruale (*scabies catamenialis*), che nasce ogni mese invece della menstruazione.

Errore poi del volgo è quello, che la scabbia preservi dal vaiuolo, e dai morbilli. *Fallaci ratiocinio nititur communis traditio, quod pueros a variolis, & morbillis præservet scabies, non vera experientia, quæ nobis multa in contrarium suppeditavit exempla puero-rum, scabie infectorum, qui, turpi hac larva vix deposita, personam alteram illam induerunt, ac in castris variolosorum militarunt.* HAL-EER: *Hist. morbor.* Vratislav: Il Tr.

ogni cinque giorni colle pillole N.° 155. ; e nello svegliarsi, nell' intervallo delle purghe , i bagni domestici N.° 2. , e verso le quattro ore dopo il mezzo giorno , e nel coricarsi , dare venti grani di etiope minerale con dieci grani di fiori di zolfo , soprabbeendo una tazza di decotto di radice di bardana , fatto con un' oncia di questa radice , ed una dramma di liquirizia per due libbre di decotto , salassando o ventosando l' ammalato, se fosse pletorico prima della purga. Se dopo otto giorni dall' uso di codesti rimedj , la scabbia non fosse dissipata , prenderà una diecina dei bagni prescritti per l' erpete volante , portando in questo tempo camisce lavate nel decotto di zolfo , o perfumate col zolfo : s' egli non fosse in situazione di prendere i bagni , userà soltanto le camisce suddette , e la fregagione mattina e sera ai polsi delle mani , alle giunture delle braccia e delle ginocchia coll' unguento contro la scabbia N.° 137. , da continuarsi sino alla guarigione.

Se la scabbia fosse ostinata , si porteranno le cinture raccomandate , dopo il suddetto unguento , stando al regolamento B. ed F. ; fare uso delle cinture ; bisogna guardarsi dal freddo ; purgarsi inoltre ogni otto giorni colle suddette pillole , e bere molto decotto di bardana , o quello di china dolce N.° 35.

*Scabbia feroce o maligna .*

La scabbia feroce invade principalmente le braccia , le cosce , e le gambe . Dappprincipio appare sotto forma di pustole rosse e separate , confluenti , e formanti croste interrotte , la cui superficie è per lo più ineguale , ed il giro distinto da una traccia livida . Allorchè si graffia , le croste cadono scagliese , e ne trapela tenace umore , che prontamente si

rappiglia e forma poco dopo una nuova crosta bianca. Quando levasi una crosta intiera al vivo, si osserva al fondo della piaga delle schegge, che gettano sangue. Questa specie di scabbia feroce è chiamata particolarmente lichene od impetigGINE. Un'altra specie, le cui croste sono nere, è conosciuta sotto nome di psora. In questa le croste sono più grosse, più dure, e divengono così secche, che scalfiscono la pelle, corrode, pizzica, e si estende più che l'erpete. La scabbia feroce in generale è ostinatissima.

L'ammalato, s'egli è pletorico, si faccia immediatamente salassare o ventosare; prenda in seguito otto bagni circa, come si è detto per gli erpeti, con un quarto di libbra di sapone, ed in seguito per un mese, ogni tre dì, il decotto lassativo dei legni N.º 24., e nell'intervallo mattina e sera, l'elettuario N.º 53., del volume di una noce moscata, replicando al fine di questo tempo i bagni suddetti, e dappoi l'uso delle camisce e dell'unguento raccomandati per la scabbia benigna.

S'egli non guarisce nello spazio di quindici giorni, si abbandonino questi rimedj esterni, e si prendano per sei settimane le polveri composte di mille piedi N.º 174., purgandosi contemporaneamente ogni sei giorni colle suddette pillole, e fomentando nel medesimo tempo le parti più viziate coll'acqua fagedenica tiepida (p). Se questa cura

rie-

(p) L'acqua fagedenica del LEMERY, ossia liquore mercuriale della *farmacopea austriaco-provinciale*, è fatta con mezza dramma di mercurio sublimato disciolto in dodici once d'acqua di calce viva.

Le unzioni per i piccoli bambini, riguardo alla grande delicatezza delle carni, vogliono essere gentilissime, dice il REDI, come sarebbe il balsamo di Saturno fatto fresco, ovvero unguento di litargio

rio



riescisse inutile , conviene adattarsi alla prima cura indicata per la lue . Durante l'uso di questi diversi rimedj mercuriali , bisogna evitare il freddo ed il vino ; nutrirsi cogli alimenti più dolci delle lettere B. ed F. ; e nel caso d'indebolimento o per la malattia o per i rimedj , per il primo mese di convalescenza , stare alla dieta lattea descritta sotto la lettera G. (q).

I bagni delle acque termali sulfuree sono un rimedio sovrano per questa malattia (r) .

Tom. I.

H h

rio fresco , con unguento rosato fatto senza cera , ugual porzione : Io ho trovato più volte efficacissima negli adulti una soluzione di mezza dramma di sollimato in ventiquattr' once d' acqua distillata , da bagnarli ora una parte , ora l' altra , come propone WOELTGE : *observat. medicar. fasciculus* . Gotting. 1783. : *Il Tr.*

(q) Trovasi negli Atti dell' Accad. R. di Parigi , tom. III. , pag. 162. , e seg. un rimedio esterno , valcvolissimo a guarire la scabbia senza pericolo di retrocessione . La base di questo rimedio è la dentellaria , volgarmente chiamata piombaggine , o plombaggine , ed anche erba S. Antonio , ossia *Plumbago europæa* del LINNEO .

Si prendono due o tre manipoli di radice di dentellaria ( e più se fosse d' inverno ) : si pestano in mortaio di marmo , versandovi sopra una libbra d' olio d' ulivo bollente , mescolando il tutto per tre o quattro minuti : si passa per tela con forte spremitura : il residuo si lascia nel panno , che si lega , e nell' atto del bisogno , s' immolla questo panno così legato nell' olio bollente , gitando il sedimento deposto sul fondo del vase : con esso si frega tutta la superficie del corpo ; fregazione che si ripete ogni dodici ore fino a perfetta distruzione delle pustole . Dappprincipio il rimedio promove una maggiore sortita di pustole , con incomodo prudere ; poi si cessano , ed interamente svaniscono .

In mancanza della dentellaria , puossi sostituire la elematite , o vitalba , come più volgare : *Il Tr.*

### Pellagra .

(r) Importa troppo in un trattato , il quale comprende l' enumerazione delle malattie più frequenti , di unirvi anche un capitolo riguardante la pellagra , la quale , siccome malattia nuova , e che fatalmente si va estendendo con forza , è bene ne sia conosciuto il suo carattere , perchè sieno invitati i professori dell' arte a ritrovare un rimedio curativo , dopo i molti fino ad ora inutilmente tentati .

La pellagrà è una malattia della pelle , la quale ordinariamente

## Tigna'.

La tigna è una specie di scabbia, che infetta

suole comparire verso la primavera, e terminare nell' inoltrarsi della state.

I sintomi precursori sono un senso di maleffere accompagnato da melancolia e da ipofitezza: dopo essere stato esposto ai primi raggi del sole del marzo o dell'aprile, sentesi sul dorso delle mani e de' piedi un senso di stiramento più o meno dolente con prurito e bruciore, che si converte poi in una dichiarata risipola, che finisce fra pochi giorni con squamazione, lasciando la sottoposta pelle di color fosco, e tenerissima: questa alterazione della pelle in taluno si rinnova molte volte, in altri una sola volta: il capo duole e gira: questo è lo stato primo e leggiero della pellagra.

Il secondo stato si conosce dalla maggiore povertà di forze, più profonda melancolia, e delirio ora maniaco, ora melancolico: gli occhi sono foschi, nebbiosi, alterati per modo di vedere doppj gli oggetti o per metà: l'appetito svanisce: si perde il sonno: il polso s'impiccolisce e scade affatto: il vizio della pelle è più sensibile e per lo stiramento e per il bruciore: la bocca tutta duole, s'infiamma, si esculcera, e lascia piovere abbondante falso umore: il corpo, si scioglie in diarrea; o diviene pertinacemente costipato: vi sono continui borbotti e ruggiti del ventre inferiore, non che venti, che dallo stomaco si alzano, e si cacciano fuori per la bocca, nominati volgarmente *rutti*.

Il terzo ed ultimo grado della pellagra è, allorquando l'animalato non può in verun modo reggersi sulle gambe, ed è obbligato invincibilmente al letto: che la diarrea è profusa ed inavvertentemente scorrevole: che le urine sono poche, torbide e rosseggianti: che gli occhi restano fissi, immobili, rossi, minacciosi: la testa è vertiginosa con tacito e confuso delirio: che i polsi sono piccolissimi e febbrili: che il calore della pelle è nrente.

La pellagra pare sino adesso essere malattia propria soltanto de' contadini: non contagiosa: non ereditaria: ella invade indistintamente ogni età e sesso. Non è riferibile a nessuna delle malattie cutanee descritte dagli autori, ed appena si uniforma allo scorbutto alpino descritto dal Sig. ODOARDI (*di una specie particolare di scorbutto*; *diff. recitata nell' Accademia della città di Belluno li 18. Luglio 1786.*), ed alla lebbra delle Asturie, di cui parla THIERY. (Vedi *Reçueil periodique par Mr. VANDERMONDE*: ann 1755.)

Il primo grado della pellagra è suscettibile di sicura guarigione; difficile a guarire è quella di secondo grado; impossibile quella del terzo: Vi soggiacciono più facilmente e con più gravi sintomi que' contadini, che abitano paesi asciutti, o che vivono nella estrema indigenza, e che hanno un abito di corpo secco, ed un temperamento melancolico bilioso: se la pellagra è complicata con altre malattie, e tali specialmente, per le quali non si possa far uso dei bagni,

la cotena del capo: altra è umida; altra è secca.  
H h 2

---

di rado li guarisce: è pure difficile la cura, quando nelle donne si sospende la menSTRUAZIONE, ed in sua vece trabocca abbondante flusso bianco o giallastro; siccome pure è difficile, se il pellagroso è affetto da ostruzioni di ventre, da scorbutto, da idrope, da febbre quartana inveterata, da cachettismo.

Egli pare dopo le più attente riflessioni fatte sulle cagioni della pellaera, ch'essa dipenda dalla rea qualità de' cibi e delle bevande, che usualmente praticano i contadini. La natura delle biade e dei legumi più famigliari ai campagnuoli sono il frumento di Turchia, la segala, il miglio, il panico, la mellica rossa, i piselli, i fagioli, le lenticchie, la fava; egli non è già che coteste specie siano tutte per se d'indole malfaciente, e contraria allo stomaco; la sola cattiva qualità consiste soltanto nell'essere difficili a smaltirsi dallo stomaco, e convertirsi in nutritiva chificazione; ma ciò può solo addivenire per que' tali di temperatura debole, e non esercitati in gravose fatiche; per lo contrario è cibo assai proprio e forse il solo conveniente per i contadini, sempre esercitati nei loro campestri esercizi e dotati di attivissime forze digerenti. Tutto il male nasce da che nelle campagne si suole panizzare malamente; imperocchè oltre al cattivo impasto, è viz o ordinario di lasciare o niente o troppo l'evitare la pasta, di formare pagnotte dure, pesanti, maleotte, soggette facilmente ad inagrire. Preseindo dall'annoverare le cattive venefiche zizzanie che le più volte entrano imbuondato nei cereali, de' quali si servono i contadini per panizzare, dalle quali zizzanie ne nascono per se sole molti e fatali sintomi, siccome sono il travaglio e la gravezza di stomaco, l'affanno, il tremore, la vertigine, le ostruzioni, ec.; le biade poi ed i legumi se sono depravati, come pur troppo frequentemente avviene, che mangino i contadini, possono, come le carni putrefatte, produrre orribili malori.

Vizio poi quasi ingenito in tutt' i villici campagnuoli è quello di condire le loro robe con soverchia quantità di sale, e ne sono proprio così ghiotti che ne fanno scialacqua; e da ciò ne nascono tutti que' micidiali effetti che sogliono essere compagni indivisibili dell'acrimonia muriatica, e specialmente i sintomi scorbutici, che ancor per questa cagione attaccano non di rado i contadini, come pur troppo ognuno se ne può accertare, dal vedere, che quasi tutti hanno perduti i loro denti o deformati guasti.

Costumano pure la persone di campagna di ridurre la farina di grano turco in focacce, che pongono a cuocere in forno o sotto le brage, tante volte ripiene di frutta o di grassume, le quali non potendo essere ben lavorate e digerite, forza è che generino gravissime infermità, specialmente ne' fanciulli, i quali ne sono più ghiotti e ne usano più famigliarmente.

Il contadino è sforzato a dissetarsi di sola acqua; anzi sono alcuni così poco gelosi della loro salute, od altri sono coltretti dalla sola necessità a bere acque torbide itagnanti, e non di rado eziandio puzzolenti. Ora fissatta qualità d'acque, come benissimo av-



La prima comune nei fanciulli, comincia da grosse

verte l' erudito anonimo del *Saggio sopra le malattie più comuni alla gente di campagna*, per via della notevole alterazione e guastamento delle sostanze di diversa natura, eh' esse contengono, e mediante ancora la considerabile quantità di terra calcarea, di cui esse sono assai più cariche, che le acque delle fontane e dei fiumi, quinci sono attissime a sconcertare, a sciogliere la tanto necessaria unione delle particelle componenti gli umori, e generare eziandio putride malattie.

Premesse queste brevi cognizioni sul cattivo alimento de' contadini, facilmente si deduce la origine della pellagra; mentre constatando per l'autorità di uomini ammirabili per l'altezza d'ingegno, e per la profondità delle loro dottrine, che la superficie del nostro corpo soggiace a malattie provenienti in gran parte dalla rea qualità dei cibi introdotti nello stomaco, così pure nei contadini l'annunciato pesante, e cattivo cibo deve necessariamente ingenerare un malumore, il quale di mano in mano diffondendosi per le vie della vita, si sconvolge tutta l'economia animale, onde quel poco che pur deve andare in sussidio del sangue, lo infeccia, e sparge conseguentemente il cattivo seme da per tutto, arrivando perfino a condensare la materia della insensibile traspirazione, divenendo conseguentemente acre pungente ed alterante più o meno la superficie del corpo, dove meno resistente sarà per effetto di esterna cagione, siccome può essere la insolazione, la quale facendo, che le parti, dov' essa più fissamente vi perviene, si rarefino di più, si agitino gli stivati umori, o si determinino al suo sviluppo; e ciò principalmente in primavera, che in altra stagione, per la generale rarefazione degli umori che in tal tempo in tutti avviene; onde li può determinare a buona ragione, che il cibo proprio de' contadini sia quello, che forma la cagione procaciarica della pellagra; l'acrimonia generata costituisca la causa prossima; e la determinante sia la insolazione.

La cura della pellagra, altra è preservativa, altra eradicativa: la prima consiste nell'impedire le cause che danno origine, e fomentano la malattia, che è quanto dire, insegnando ed accordando ai contadini i convenienti materiali per una buona e salubre panizzazione, quindi una vita meno angustiosa e meno indigente; una bevanda se non quotidiana, ma di tempo in tempo spiritosa, e corroborante; un vino piccolo ed annacquato, per modo di esempio, ma tale che sentisse sapor di vino, converrebbe alla loro complessione, al loro modo di vivere, ed alla speciale indole de' loro alimenti; che se poi è forza e mera necessità, che i villici si debbano servire di acque immonde e pesanti, bisogna insegnar loro ad emendare alquanto la loro dannosa qualità. E' noto per reiterate esperienze, eh' esse si rendono assai meno insalubri, qualora si uniscano con poco spirito di vitruolo, o vi si mescoli dell'aceto, o vi s'immerga un ferro rovente; anzi se il tempo e le circostanze permettono ai contadini di cingere le acque impure, questo è il migliore e più sicuro rimedio per correggere la loro nociva efficacia. *Anonimo: l. c.* Bisogna raccomandare soprattutto la pulitezza e la lavanda delle parti principalmente esposte all'immediato contatto dell'aria.

puscole, che diventano confluenti, e formano delle piastre, dalle quali sorte una materia purulenta con ardore e prurito della parte affetta (f).

Hh 3

Il metodo curativo della pellagra consiste nell'uso dei fieri alterati colle erbe antiscorbutiche, dei decotti sudoriferi, dei blandi purgativi acidulati, massime quando si conosce faburra o vizio di bile. Per sollevare la testa o vertiginosa o dolente od alterata da delirio, giovano i senapismi, le ventose a taglio ed a vento, i vescicanti: le cacciate di sangue si debbono evitare più che sia possibile, ridondando queste in notabile detrimento de' pellagrosi. Localmente sulle parti viziate dalla malattia, ottimo cosmetico è l'acqua di vite distillata, il sugo del semprevivo maggiore, l'aglio pesto ed unito a molta dose di mele. Nella malattia più avanzata sono necessarii i bagni, od in loro vece le fomentazioni mollitive sulle parti viziate, le leggiere soluzioni di tamarindi, la tintura acquosa di rabarbaro, la chinachina, la valeriana, il licore di corno di cervo succinato, il decotto di foglie d'aranci. Se la diarrea è profusa, conviene la simaruba, come che quella la quale constando di parti gommoso-resinose-balsamiche, vaglia a sedare e corroborare lo stonato intestino: in seguito se rimane ostinato il flusso di corpo, si daranno l'etiope vegetale, la triaca, il decotto di radice di colombo, l'oppio, i lavativi calibeati, i lavativi narcotici, facendovi bollire dei capi di papaveri. Il vitto deve consistere in brodi fatti colle parti gelatinose degli animali, i quali brodi non solo in questo caso servono come alimenti, ma anche come rimedj; minestre brodose; uova cotte da bore; il decotto di salep, ed in sua vece dell'orchis notale; quello delle ghiande torrefatte; minestre di tagliolini, offizii fatti con mollica di pane e uova, e soprattutto qualche cucchiajata di vino nero generoso. Che se la malattia fosse arrivata al suo ultimo grado, siccome pare in allora degenerata in uno stato di alcalina putrescenza, conviene l'uso de' vegetabili antiscorbutici, le infusate, la limonata minerale, l'aceto, il vino, il licore anodino dell' HOFFMANN. *Il Tr.*

(f) E' chiamata dai Latini, *porrige*, *furfurago*. Il primo a chiamare questo male col nome di *tinea* fu STEFANO, quello che tradusse dall'arabo in latino il libro d' HALY ABATE.

Si distingue la tigna dalla crosta lattea, dice il celebre BERTRANDI, perchè le ulcere sono in quella più secche, le croste cenericce, o verdi, che gemono pochissimo umore, ma producono un grandissimo prurito, che obbliga a grattare, d'onde ne cadono squame furfuracee: le ulcere della crosta lattea sono sordide, più umide, che stillano copioso umore poco fetente, con minore prurito: la crosta lattea offende solo i fanciulli lattanti, e la tigna accade nell'infanzia e nella prima giovinezza: questa non occupa mai altra parte fuori che la capillata; quella si dilata sulla faccia, e sulle altre parti del corpo: *Il Tr.*

*Cura della tigna dei fanciulli.*

Si purgheranno i fanciulli ogni quattro giorni con sufficiente quantità di siroppo di cicoria col rabarbaro, o di fiori di persica, aggiugnendo a ciascuna dose, secondo la loro età, mezzo grano od un grano di mercurio dolce, ed il decotto di china N.° 35. con un quarto di latte, per bevanda ordinaria: negl' intervalli delle purghe, prenderanno mattina e sera, in un cucchiajo di questo decotto, sei gocce di zolfo dorato d'antimonio liquido, mantenendo la testa più propria che sarà possibile. Se dopo quindici giorni dall' uso di questi rimedj, la tigna non fosse considerevolmente diminuita, si taglieranno i capelli, applicando sulle parti affette le foglie di biettola leggermente macerate con un po' di butirro fresco. Finalmente se non ostante questo, la tigna non si dissipasse appoco appoco, si laverà la testa mattina e sera con una forte decozione tiepida delle foglie di lapazio, e dopo averla ben asciugata, vi si applicherà fra due pannolini una foglia fresca di questa pianta alcun poco riscaldata, perseverando pazientemente a questo modo fino alla perfetta guarigione. Tutte le volte che la tigna sarà secchissima, si ugnerà coll' olio di mandorle dolci, oppure s' investirà la foglia di lapazio con un po' di butirro fresco, o crema di latte da applicarsi in allora senza invoglio (t).

---

(t) I purganti mercuriali replicati, e la cicuta internamente ed esternamente adoperata, hanno moltissime volte giovato: *Il Tr.*



*Cura della tigna nelle persone adulte .*

Quando la tigna invade le persone adulte, ella distrugge i capelli per modo che più non crescono, ed a misura ch' ella prende radice, trafora profondamente e penetra qualche volta fino al cranio . Per guarirla si useranno i rimedj interni indicati per l' erpete volante, ed esternamente, se la tigna è recente, tutto ciò che è raccomandato per quella dei fanciulli .

Ma se la tigna fosse inveterata, si taglieranno i capelli presso la testa, ed anche si raderanno col rasojo, lavandola in seguito mattina e sera con una forte decozione di radice di bardana: dopo ciascuna lozione si ugnerà leggermente colla pomata rossa N.º 162., unita con il sesto di più di butirro fresco; e se la tigna avesse scavato profondamente, si medicheranno le ulcere secondo l' arte da un abile chirurgo .

Si distingue la tigna secca dall' umida, dalla durezza e secchezza delle croste, che cadono a piccole scaglie, e rinascono ben presto con molto prurito. La specie più cattiva è quella, in cui si vedono sotto le croste scagliose, piccoli grani somiglievoli a quelli dei fichi .

Questa tigna, come la porrigine, la quale consiste in piccole scaglie farinose, invade principalmente la parte capelluta e le sopracciglia; e questa si cura come l' erpete secco. Si sono viste tigne trascurate ed invecchiate così aderenti, che si è stato sforzato di staccarle con un berrettino di pece e resina (u).

Hh 4

## Lebbra.

La lebbra degli Arabi consiste in una scabbia secca, la quale invade le quattro estremità, di modo che sono coperte di scaglie, bianche o giallastre, e facili ad aprirsi, dalle quali ne trapela una sanie molto acre, e gli ammalati hanno le unghie ritorte ed allungate in modo che rassomigliano piuttosto agli artigli (x).

Quando al contrario la pelle è aggrinzata, ripiegata sopra se medesima, ruidà, insudiciata di scaglie con radici profonde, ed interposte da macchie, da ulcere, da tubercoli rossicci gialli o neri, ciò forma la lebbra dei Greci. Questi lebbrosi hanno l'estremità gonfie e la faccia spaventevole.

L'Europa è già da molto tempo liberata da quest'orrida malattia; e la prima specie di lebbra è

*de medendi tinea capitis ratione paralipomena*, Gotting. 1782., in cui fra le altre cose condanna il berrettino di pece, come inutile, e come rimedio troppo crudele. Vuole l'autore che sia una malattia semplicemente locale, sanabile coi rimedj esterni topici. Pensa, che la vera sede della tigna consista nei follicoli così detti pinguedinosi, o nello stesso tessuto cellulare, ed anche nel muscolo malpighiano. Nominati i principali rimedj interni proposti per la cura della tigna, confida preferentemente nell'uso dei rimedj purganti, *quae ipsa tam revellendo, quam colluviem primarum viarum, quae in morbos tantum non omnes imperium exercet, subtrahendo huud mediocrem efficaciam praestant*: due sono i metodi praticati dall'autore, l'uno per la tigna squamosa, il quale consiste nell'unzione d'unguento rosato col precipitato bianco, in proporzione di una dramma per ogni oncia d'unguento: dapprincipio si adopera tanto unguento come un grosso pisello da ungere i luoghi più infetti dalla tigna, alla sera per una o due settimane; ed ostinandosi il male, anche alla mattina, fino ad intera distruzione del male, non ometti i purganti di gialappa con qualche sal medio. Nella tigna favosa dà l'estratto di cicuta, cominciando dai due grani, fino allo scropolo, tre volte al giorno, unitamente al decotto di radice di lapazio, lavando la testa due volte al giorno col decotto della stessa cicuta mescolato col latte, frapposti di tempo in tempo i purganti: *Il Tr.*

(x) *Ubi vetus est morbus, digiti in manibus, pedibusque sub tegmine conduntur*. CELSUS lib. III.: *Il Tr.*

in oggi molto rara. Si cura la lebbra come la scabbia feroce, e si ungono, quattro volte al giorno, le parti affette con butirro fresco intimamente unito con un dodicesimo di mercurio precipitato rosso.

Se queste diverse scabbie sono ribelli ai rimedj indicati, sarà indizio, che l'ammalato è scorbutico, od infranciosato, e ne sarà curato conseguentemente.

I rimedj esterni ripercussivi sono sempre pericolosi, se non si rimedia primamente alla cagione coi rimedj interni.

I bagni delle acque termali sulfuree sono efficacissimi (*γ*) per la guarigione della maggior parte delle affezioni cutanee, e la prima cura raccomandata per il vajuolo sarà pure profittevole.

Siccome la maggior parte delle affezioni cutanee si comunica per contatto, è uopo avvertire di evitarne l'infezione (*z*); e se le persone altronde sane avessero la disgrazia di contrarre la scabbia, abbrevieranno tanto più l'uso dei rimedj interni, quanto sarà recente questo incomodo.

Gli accidenti e le malattie gravi che produce la scabbia ripercossa, si guariscono colla inoculazione della scabbia fatta come quella del vajuolo, o facendo portare a nudo il vestimento di uno scabbioso.

Nelle malattie della pelle e nei vizj degli umori ribelli a tutt' i rimedj, sono stati salutari a molti malati un lungo soggiorno nei paesi meridionali marittimi, la dieta lattea, i bagni, e nel medesimo tempo la bevanda moderata delle acque del mare (*αα*).

---

(*γ*) Sappiamo dalle sacre carte, che ELISEO sanò NAAMANNO colla lozione dell'acqua del Giordano, appunto perchè sulfurea, ed in oggi riputata vaevolissima ancora per guarire dalla lebbra, come ne testimoniano gli scrittori dei viaggi: *Il Tr.*

(*z*) Molto si è disputato, se sia, o nò contagiosa la lebbra, come puossi leggere, fra gli altri, in WEBER, l. c.; MEAD *medica sacra*; LORRY, l. c.: *Il Tr.*

(*αα*) Fra i rimedj raccomandati per la cura della lebbra sono



## Verruche (bb) .

Le verruche che sono attaccate alla pelle con un picciuolo sottile, come pure quelle rotonde, ed affilate con base, poco larga, poco profonda, e che conservano il colore della pelle, si guariscono facilmente, le prime colla legatura di un filo di seta, e toccando la radice, dopo la loro caduta con un pennello inzuppato nell'olio di tartaro per deliquio, o colla pietra infernale. Quelle di base larga, si freggeranno spesso con un pezzo di cedro sucoso, ed applicandovi negl' intervalli, il bianco della scorza di cedro, macerata per qualche tempo nell' aceto forte, i quali mezzi riescendo inutili, si consume-

la cicuta, i mercuriali, l'etiope, e soprattutto, specialmente dagli antichi scrittori, le varie preparazioni della vipera non che la carne medesima molto tempo mangiata. GALEOTTI, nella sua *dissertazione sopra le malattie, che si curano nel regio spedale di S. Eusebio con i rimedj soliti usarsi nel medesimo*, Firenze 1771., dice, che i lebbrosi ordinariamente non si curano se non col seguente unguento. Prendete lardo, e grasso di majale, ana libbre due e mezzo: trementina, once quattordici: cera bianca, once sei: si fanno sciogliere a fuoco lento; poi vi si aggiugne un'oncia di mercurio precipitato rosso: due once per forte di sal comune secco, e mercurio sollimato corrosivo: fugo di limone, e spirito d'aceto, quanto basta per fare unguento: *Il Tr.*

(bb) La verruca, altrimenti porro, è una escrescenza cutanea, dura, irregolare, per lo più insensibile, conica, fosca, rosseggiante, solitaria, moltiplice, o universale, pendola, o ferma, con base larga o sottile, con o senza prurito.

Quest' escrescenza acquista differenti nomi secondo la varia sua figura, ed indole. Allora quando ha la base stretta, ed attaccata alla cute, come per un filo, si chiama *acrochordon*, o *verruca pen- sile*: se è rosseggiante, e versa facilmente sangue ad ogni piccol urto, od irritamento, si chiama *timion*: quando è larga, ed abbarbicata alla cute con ferme radici, si dice *mimercia*: se ha la superficie ineguale, e come spaccata in varie parti, ritiene il nome di *porro*: allorchè s'erge verticalmente in alto per alcune linee in figura di cono, e con durezza grande, si chiama *corno*. Tale è la definizione data delle verruche dall' illustre professore di Pavia, il Sig. NESSI nelle più volte citate eruditissime *istituzioni di chirurgia*, tom. II.: *Il Tr.*

ranno come le radici delle prime, e colla precauzione di circondarne esattamente la base, con un po' d'impiaastro di diapalma, il quale avrà un pertugio adattato per lasciare escire il corpo della verruca, e che guerentisca la sua circonferenza dall'impressione dei corrosivi.

Si tolgono ancora coll'impiaastro N.º 60. raccomandato qui appresso per i calli dei piedi. Al contrario si deve scansare di toccare i porri, che sono molli, rossi, lividi, di profonda radice, o situati presso le labbra, od in vicinanza del naso o degli occhi; dappoichè i rimedj irritanti li rendono tante volte carcinomatosi.

Le persone, le quali avranno molte verruche alle mani, se ne possono liberare, lavandosi spesso e lungamente, e fregando ancora i porri sotto la grondaja di un tetto.

Coloro che non faranno in situazione di usare la pietra infernale, sostituiranno, colle precauzioni sopra enunciate, il latte di esula (titimalio), cominciando dal bagnare la cima, ed appoco appoco tutto il corpo del porro fino alla sua base (cc).

### Calli .

Per prevenire i dolori e gl'incomodi che cagionano i calli, non avvi di meglio, che di bagnare i piedi per una mezz'ora, due volte la settimana, nell'acqua-crusca tiepida, e di tagliare in seguito i calli, e la pelle callosa che li circonda, fino al livello della pelle sana (dd). Oltre questi bagni

---

(cc) Tutte le specie di titimali contengono un sugo o latte molto acrimonioso, il quale serve appunto a distruggere i porri e le carni fungose. Anche la polvere di titimalio, aspersa sulle ossa, ne promuove la esfoliazione: *Il Tr.*

(dd) Suggesta il scl. BERTRANDI, che i calli si debbano

lungo tempo continuati, serve ancora per liberarsene dai calli, applicarvi nell' intervallo di un bagno all' altro, l' impiastro di mucilaggine o di diaquilone colle gomme, avvertendo di portare scarpe larghe e comode (ee), e tenendo costantemente fra le dita dei piedi, dove vi sono dei calli, un po' di carta indiana, o pannolino finissimo. Ma nel caso che questi presidj strascinassero in lungo, se ne può sbarazzare coll' impiastro contro i calli N.<sup>o</sup> 60., il quale però non conviene nei calli aderenti ai tendini, o che le loro radici fossero innicchiate fra le articolazioni dei diti (ff).

---

tagliare col gambante bene affilato, portandone di piatto, ed orizzontalmente il tagliente da un lato all' altro del callo; s' incominciano a tagliare gli strati superiori, quindi adagio adagio si tagliano gli altri, usando molta cautela, per non offendere le parti vive soggette, e nel condurre lo stromento guardandosi che non scappi a tagliare le prossime. Tostochè si è giunto alle parti vive, il che si conosce dal trasudamento di una certa acqua limpida, si cessa dal tagliare più oltre; e, se si può, mai non si tagli così profondamente fino all' efusione del sangue; poichè allora facilmente le parti s' infiammano, alla quale infiammazione qualche volta succede una lunghissima suppurazione: *Il Tr.*

(ee) Veggasi a questo proposito il Trattato delle scarpe, dei mali da esse cagionati, e loro ripari, del Sig. D. Pietro CAMPER prof. d' anat. Milano 1787., e ROUSSELOT, *Toilette des pieds*. Paris 1778.: *Il Tr.*

(ff) Suole il volgo ignorante usare per distruggere i calli il sangue menstruo, o locchiale, credendo, come pur troppo imaginò lo stesso PLINIO, abbia questo umore tanta malignità od acrimonia per efficace i calli. Siccome a vero dire non si riconoscono in questi sgravj uterini cotali principj, ed altronde essendo rimedio dispiacevole da usarsi, si potrà in sua vece ricorrere all' applicazione delle foglie verdi di porcellana, di semprevivo maggiore, del fico d' India, od al sugo acre della celidonia maggiore, dell' aro, dell' acetosa, ed acetosella; oppure all' olio di tartaro per deliquio, all' acqua piovana infracidata, al sugo di fabina e dell' aglio, avvalorato con un poco di vitriuolo di Cipro. BERTRANDI *opere anatomiche e chirurgiche*. NESSI *istituzioni chirurgiche*: *Il Tr.*



*Pidocchi, Piattole (gg).*

Si distruggono i pidocchi, le piattole, e gli altri insetti, che si appiattano fra i peli dell'anguinaja, e del pettignone, o nei capelli, ec., colla nettezza, e col bagnare spesso le parti col sotto di tabacco, o con acquavita fortemente canforata. Se ciò non bastasse, si fregheranno le parti affette, per un paio di volte, coll'unguento grigio; e per i pidocchi, con quello volgarmente usato, e che si vende dagli speziali per questo effetto (*bb*).

Dopo queste malattie cutanee si parlerà di quelle che viziano la cute e le carni, per potere ad un bisogno supplire da se, in mancanza di un chirurgo, quando si tratterà soltanto di una piaga semplice, di una contusione, di una scottatura, di pedignoni e di ulcere semplici.

(*gg*) Oltre le piattole ed i pidocchi della testa vi sono anche i pidocchi di vita, la cui cagione ordinaria non solo deriva da sudiciume, ma ancora da vizio di umori. Questo genere di malattia è chiamata Tiriali o morbo pedicolare, famoso per le persone illustri, regi e sapienti morti da sì brutto male, siccome per modo di esempio sono ANTIOCO, EPIFANE, re dell'Asia, ERODE ascalonita, ENNIO poeta, SILLA il Dittatore, FILIPPO II. re delle Spagne, ec.

Per rimediare a cotesti mali non solo convengono i rimedj esterni, ma bisogna pure avvertire di correggere coi rimedj interni i vizj degli umori, variando la cura secondo la cagione che ha guastati gli umori. Ampla, ed erudita notizia intorno al morbo pedicolare trovasi nelle *lettere fisico-mediche* del dottissimo VALLISNERI, stampate a Padova nel 1726. : *Il Tr.*

(*bb*) L'unguento grigio così nominato dall'autore, anche in altro luogo, intendesi l'unguento mercuriale. L'altro poi vendibile dagli speziali, dev' essere l'unguento di strasulagria, di cui se ne adopera una dramma per unzione, avvertendo però bene nell'uso di uno come nell'altro unguento ai loro effetti, per essere un composto di mercurio vivo, il quale vi entra quasi per metà: *Il Tr.*

Delle cose più notabili .

<b>D</b> Ei temperamenti in generale .	Pag.	2
Della complessione temperata .		4
Del temperamento , in cui il caldo chiaramente predomina .		ivi
Del temperamento , nel quale domina evidentemente il freddo .		5
Del temperamento , in cui l' umido predomina evidentemente .		6
Del temperamento , in cui il secco predomina evidentemente .		7
Dei quattro temperamenti misti , che formano la seconda classe .		8
Della costituzione eccessivamente forte .		10
Della costituzione delicata .		11
Della costituzione magra .		13
Della costituzione inclinante all' obesità .		ivi
Delle indisposizioni primitive , alle quali il temperamento dispone , ec.		14
Delle differenti savorre delle prime strade .	15 e seg.	
Dei vizj generali dei solidi .		19
del sangue .	22 e seg.	
Dell' acrimonia fredda , inerte .		33
calda biliosa .		34
muriatica , o salsa .		36
scorbutica .		37
Dei vizj generali della linfa .	40 e seg.	
Della cachessia .		46
Della febbre in generale .		49
Dei sintomi generali della febbre .	50 e seg.	
Della diminuzione , o soppressione delle naturali escrezioni , ec.		63

<i>Delle varie evacuazioni spontanee , ec.</i>	Pag.	65
<i>Crisi cosa sia , e come si produce , nota d.</i>		66
<i>Della diarrea .</i>		71
<i>Del sudore .</i>		74
<i>Del flusso delle orine .</i>		76
<i>Cremori di riso , o d' orzo , ec. , nota h.</i>		ivi.
<i>Dell' eruzioni , ec.</i>		78
<i>Delle afte .</i>		83
<i>Della metastasi , e come succeda .</i>		85
<i>Delle scalfitture , e delle piaghe .</i>		88
<i>Dei segni favorevoli nella febbre .</i>		89
<i>svantaggiosi , cattivi e mortali .</i>		90
<i>Regola da osservarsi nel principio delle febbri in generale .</i>		92
<i>Delle febbri d' accesso , od intermittenti .</i>		94
<i>Uso degli emetici nelle febbri intermittenti , nota a.</i>		98
<i>Febrifughi succedanei alla chinachina , nota b.</i>		101
<i>Delle febbri continue , o continue non remittenti .</i>		102
<i>Febbre efimera .</i>		ivi
<i>Febbri continenti .</i>	103 e	104
<i>Febbre intestinale , o gastrica .</i>		108
<i>Febbre putrida benigna .</i>		110
<i>Delle febbri continue remittenti .</i>		ivi
<i>Febbre continua catarrale .</i>		111
<i>biliosa .</i>		115
<i>Della febbre verminosa .</i>		119
<i>Olio ricino , nota c.</i>		121
<i>Della febbre ardente .</i>		ivi
<i>Delle febbri endemiche in generale .</i>		124
<i>epidemiche in generale .</i>		125
<i>Della febbre scarlatina , o febbre rossa .</i>		127
<i>Della febbre petecchiale , o porporina .</i>		131
<i>Della febbre migliare .</i>		132
<i>Vajuolo .</i>		133
<i>Rosolia .</i>		151
<i>Febbri maligne .</i>		154



<i>Innesto della rosolia , nota c.</i>	Pag. 154
<i>Febbre putrido-maligna .</i>	161
<i>Febbre lenta .</i>	164
<i>Consumzione .</i>	171
<i>Marasmo .</i>	173
<i>Delle ostruzioni in generale .</i>	174
<i>Palla marziale cosa sia , nota a.</i>	178
<i>Le ostruzioni delle viscere addominali non sempre dipendono da stagnazione degli umori , ec. , nota b.</i>	179
<i>Delle congestioni catarrali .</i>	ivi
<i>Rauceàine , e reuma di petto . .</i>	184
<i>Loc bianco di Parigi come si compone , nota e.</i>	185
<i>Punch , e bischop cosa siano , nota d.</i>	187
<i>Latte di gallina cosa sia , nota e.</i>	ivi
<i>Peripneumonia catarrale .</i>	189
<i>Valore degli emetici nei mali di petto , nota e.</i>	190
<i>Delle congestioni reumatiche .</i>	191
<i>Sciatica nervosa , nota c.</i>	198
<i>Gotta . . .</i>	200
<i>Varie quistioni sulla gotta , e varj rimedj propo- sti , ec. , nota a.</i>	206 e seg.
<i>Virtù dubbie della pareira brava , nota c.</i>	209
<i>Degl' ingorgamenti o tumori glandolosi .</i>	210
<i>Agli scrofolosi dourebb' essere ) vietato il matrimonio . )</i>	
<i>Definizione delle scrofole . ) nota d.</i>	213. e seg.
<i>Varj rimedj , proposti per la ) cura delle scrofole . )</i>	
<i>Spugna preparata , nota g.</i>	218
<i>Rimedj per il gozzo , nota h.</i>	219
<i>Ingorgamenti delle glandole intestinali , e mesente- riche .</i>	ivi
<i>Ingorgamento e scirro del pancreas .</i>	221
<i>Inceppata circolazione del sangue nei vasi della vena porta .</i>	222
	In-

<i>Ingorgamento della milza .</i>	Pag. 224
<i>Ingorgamento del fegato .</i>	228
<i>Itterizia in generale .</i>	231
<i>spasmodica , nota b.</i>	ivi
<i>Pillole di Brera , nota f.</i>	235
<i>Diversi rimedj per la cura dell' itterizia , nota g.</i>	237
<i>Male ipocondriaco .</i>	240
<i>Infiammazioni in generale .</i>	246
<i>Teoria della infiammazione nota a.</i>	ivi e seg.
<i>Cura generale delle infiammazioni esterne .</i>	252
<i>Carcinoma, o cancro : diversi rimedj, ec., nota n.</i>	258 e seg.
<i>Cancrena : sua divisione in umida e secca , nota p.</i>	261
<i>Vantaggio della china nella cancrena , nota q.</i>	262
<i>Quistione sopra l' amputazione , nota r.</i>	263
<i>Cura delle infiammazioni interne in generale .</i>	264
<i>Diversi sentimenti sopra il salasso , nota t.</i>	266
<i>Risipola .</i>	269
<i>Flemmone .</i>	275
<i>Sua risoluzione benigna , o metastica , nota aa.</i>	ivi
<i>Si deve procurare la risoluzione , nota bb.</i>	276
<i>Panno .</i>	ivi
<i>Panereccio .</i>	278
<i>Sue divisioni, e diversi metodi di cura , nota ff.</i>	ivi e seg.
<i>Fima .</i>	281
<i>Furoncolo , o ciccione .</i>	282
<i>Tereminto .</i>	283
<i>Carbonechio .</i>	ivi
<i>Sua etimologia , e divisione , nota kk.</i>	ivi e seg.
<i>Epinittide .</i>	286
<i>Chemosi .</i>	ivi
<i>Vantaggio del salasso locale nelle infiammazioni ,     nota nn.</i>	287
<i>Otalgia .</i>	289
<i>Infiammazione delle mammelle .</i>	291
<i>dei testicoli non venerea .</i>	293
<i>dell' ano , e moroidi esterne .</i>	294

<i>Frenitide vera .</i>	Pag. 296
<i>Sue diverse cagioni, e difficile diagnosi, nota b.</i>	ivi e seg.
<i>Frenitide falsa .</i>	300
<i>Squinanzia .</i>	303
<i>Operazione delle amigdale , nota l.</i>	307 e seg.
<i>Squintanzia cancerosa</i> )	nota m.
<i>Glossitide</i> )	
	308
<i>Peripneumonia .</i>	310
<i>Utilità del salasso dalla giugulare nella peripneumonia , nota q.</i>	312
<i>Empiema: sua descrizione , diagnosi , e rimedj , nota t.</i>	316 e seg.
<i>Pleuritide .</i>	319
<i>Quistioni sopra la sede della pleuritide , nota y.</i>	320
<i>Rimedj varj della pleuritide , nota bb.</i>	324
<i>Efficacia dell' opio nella pleuritide , nota cc.</i>	325. e seg.
<i>Epatitide .</i>	326
<i>Utilità del vescicante applicato al luogo dolente , nota ff.</i>	329
<i>del salasso locale , nota bb.</i>	ivi e seg.
<i>Ascessi del fegato dopo le ferite di testa , nota ii.</i>	330 e seg.
<i>Splenitide .</i>	332
<i>Mesenteritide .</i>	333
<i>Gastritide .</i>	334
<i>Enteritide .</i>	338
<i>Nefritide .</i>	341
<i>Cistitide .</i>	344
<i>Metritide .</i>	346
<i>Enfisema .</i>	347
<i>Timpanitide .</i>	349
<i>Diagnosi , nota b.</i>	ivi
<i>Distinzione dalla intestinale all' addominale , nota c.</i>	350
<i>Difficile a guarire , nota d.</i>	ivi
<i>Edema .</i>	353
<i>Leucoflecmazia , ed anasarca .</i>	356



<i>Idrope cistica, ed idatidi.</i>	Pag. 360
<i>Se le idatidi sieno animali viventi, nota d. ivi e seg.</i>	
<i>Sospetti del idrope delle ovaje</i>	} nota e. 361 e seg.
<i>Idropisia del peritoneo</i>	
<i>Idrope ascite.</i>	363
<i>Idrope del petto.</i>	378
<i>Suo segno patognomonico secondo Pisone, nota p.</i>	379
<i>Idrocefalo.</i>	383
<i>Idropisia del cervello, nota cc.</i>	384 e seg.
<i>Idrocele.</i>	385
<i>Idrorachite, nota dd.</i>	386. e seg.
<i>Delle affezioni convulsive, spasmodiche, e paralitiche.</i>	387
<i>Ballo di S. Vito.</i>	392
<i>Epilessia.</i>	394
<i>Polvere di goteta: sua preparazione, nota c.</i>	397
<i>Epilessia: suoi rimedj specifici, nota u.</i>	399
<i>Dello spasmo in generale.</i>	ivi
<i>Granchio dello stomaco, e suoi rimedj, nota c.</i>	400
<i>Catalessia.</i>	402
<i>Delle affezioni spasmodiche, e convulsive interne.</i>	404
<i>Catafora.</i>	407
<i>Letargo.</i>	408
<i>Apoplessia sierosa.</i>	412
<i>Caro.</i>	413
<i>Apoplessia sanguigna.</i>	417
<i>Emiplegia.</i>	421
<i>Paralisi della palpebra.</i>	425
<i>Gotta serena.</i>	426
<i>Paralisi della lingua.</i>	427
<i>dell' esofago, vescica, ed intestino retto.</i>	428
<i>del braccio, e scorbutica.</i>	429
<i>Affidderazione.</i>	430
<i>Tremore.</i>	431
<i>Emorragia in generale.</i>	ivi
<i>nasale.</i>	436
<i>dello stomaco.</i>	438







